

**อิมาทินิบ 100 มิลลิกรัม ชนิดเม็ด**  
**อิมาทินิบ 400 มิลลิกรัม ชนิดเม็ด**

**อาการคำ TINIBAT 100 (ทีนิแบท 100)**  
**และ TINIBAT 400 (ทีนิแบท 400)**

**1. ยานี้คืออะไร**

**1.1 ยานี้มีชื่อสามัญว่าอะไร**

ยานี้มีชื่อสามัญว่า อิมาทินิบ เมสิลเลท (Imatinib mesilate) เป็นยาในกลุ่มยาต้านมะเร็ง

**1.2 ยานี้ใช้เพื่ออะไร**

- ยานี้ใช้รักษามะเร็งเม็ดเลือดขาว มะเร็งกระเพาะอาหาร และลำไส้ และที่เกี่ยวข้องอื่นๆที่แพทย์ตรวจแล้วเหมาะสมที่จะใช้ยานี้

**2. ข้อควรระวังก่อนใช้ยา**

**2.1 ห้ามใช้ยานี้เมื่อไร**

- ห้ามใช้ยานี้หากเคยแพ้ยานี้หรือส่วนประกอบอื่นๆในยานี้

**2.2 ข้อควรระวังเมื่อใช้ยานี้**

- หากท่านมีภาวะต่อไปนี้ ให้ปรึกษาแพทย์ก่อนใช้ยา เพราะอาจทำให้โรครุนแรงขึ้น หรือเกิดอันตรายจากการใช้ยา
  - โรคตับ ไต หัวใจ
  - โรคไตรอยด่างที่ได้รับการรักษาด้วยยาเลโวไทรอกซิน
  - โรคตับอักเสบบี หรือเคยเป็นโรคตับอักเสบบี
- แจ้งแพทย์หากท่านกำลังตั้งครรภ์ วางแผนจะตั้งครรภ์ หรืออยู่ในระยะให้นมบุตร เพราะอาจทำให้เกิดอันตรายต่อทารกได้

**3. วิธีใช้ยา**

**3.1 ขนาดและวิธีใช้**

- ควรใช้ยาตามคำแนะนำของแพทย์หรือเภสัชกรเท่านั้น
- กินยาทั้งเม็ดพร้อมอาหารหรือหลังอาหารทันทีและดื่มน้ำตามมากๆ เพื่อลดการระคายเคืองของกระเพาะและลำไส้
- หากไม่สามารถกลืนยาได้ ให้ปฏิบัติดังนี้
  - อิมาทินิบ 400 มิลลิกรัม 1 เม็ด ควรใช้น้ำเปล่าหรือน้ำแอปเปิ้ล ปริมาตร 200 มิลลิลิตร (น้ำ 1 แก้ว) ในการละลายยา และใช้ช้อนคนยาจนกระทั่งยาละลายหมด จากนั้นให้ดื่มทันทีจนหมดแก้ว

- อิมาทินิบ 100 มิลลิกรัม 1 เม็ด ควรใช้น้ำเปล่าหรือน้ำแอปเปิ้ล ปริมาตร 50 มิลลิลิตร (เกือบครึ่งแก้ว) ในการละลายยา และใช้ช้อนคนยาจนกระทั่งยาละลายหมด จากนั้นให้ดื่มทันทีจนหมดแก้ว

**3.2 หากลืมกินยาควรทำอย่างไร**

- ให้กินยาทันทีที่นึกได้ แต่หากใกล้ถึงมือถัดไป ให้รอกินยาของมือต่อไป และห้ามกินยาเพิ่มเป็น 2 เท่า

**3.3 ถ้ากินยานี้เกินขนาดที่แนะนำ ควรทำอย่างไร**

- ให้สังเกตอาการอย่างใกล้ชิด หากมีอาการผิดปกติที่รุนแรงให้รีบนำส่งโรงพยาบาลทันที และนำยาไปด้วย

**4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างการใช้อย่าง**

- ระมัดระวังการขับขี่ยานยนต์หรือทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักรกล หรือทำงานที่เสี่ยงต่อการพลัดตกจากที่สูง ห้ามกินยานี้ในขนาดสูงกว่าที่แพทย์หรือเภสัชกรแนะนำ
- ห้ามปรับขนาดยาหรือหยุดยาเอง และให้กินยานี้อย่างต่อเนื่องตามคำแนะนำของแพทย์หรือเภสัชกร
- พบแพทย์ตามนัดอย่างสม่ำเสมอ เพื่อติดตามผลการรักษาและอันตรายที่อาจเกิดจากยา

**5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา**

**5.1 อาการที่ต้องหยุดยา แล้วรีบไปพบแพทย์ทันที**

- ปวดท้องอย่างรุนแรง อาเจียน บั๊สสาวะและอุจจาระมีเลือดปนหรืออุจจาระมีสีดำ
- ปวดตา มีเลือดออกที่ตา ไม่ค่อยได้ยินเสียงหรือสูญเสียการได้ยิน
- ปวดหัวอย่างรุนแรง กล้ามเนื้อแขนทั้งสองและไบหน้าอ่อนแรง มีอาการปวดลำบาก เป็นลม
- บวมที่ไบหน้า เปลือกตา ริมฝีปาก ลมพิษ
- หน้ามืด เป็นลม แขนหน้าอก หายใจลำบาก
- ตุ่มแดง ตุ่มพอง ผิวหนังหลุดลอก มีฝ้าตามผิวหนัง หรือเลือดออกผิดปกติ
- ไอ เจ็บหน้าอก หายใจลำบาก หรือรู้สึกเจ็บขณะหายใจ
- อาการภาวะหัวใจล้มเหลว เช่น เหนื่อยขณะออกกำลังกายหรือขณะนอนราบ หัวใจเต้นเร็ว ตัวบวม

**5.2 อาการที่ไม่จำเป็นต้องหยุดยา แต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์ทันที**

- รู้สึกป่วย ปวดหัว อ่อนเพลีย
- คลื่นไส้ท้องผูก ท้องเสีย ท้องอืดท้องเฟ้อ อาหารไม่ย่อย
- ตะคริว ปวดกระดูก
- มีอาการบวมหรือปวดที่ข้อเท้า ตา
- หน้ามืด เวียนศีรษะ นอนไม่หลับ

- ผมร่วงมากผิดปกติ ปากแห้ง ตาแห้ง ผิวแห้ง
- ปวดกล้ามเนื้อ ตะคริว เป็นผื่นแดง
- บวมหน้า นำหนักขึ้น

**6. ควรเก็บยานี้อย่างไร**

- เก็บยาไว้ในภาชนะบรรจุเดิมตามที่ได้รับมา
- เก็บในที่แห้ง อย่าให้โดนแสงโดยตรง โดยทั่วไปควรเก็บที่อุณหภูมิไม่เกิน 30 องศาเซลเซียส ไม่เก็บยาในที่ร้อนหรือชื้น เช่น ในรถยนต์ ห้องน้ำ ห้องครัว เป็นต้น
- เก็บยาให้พ้นมือเด็ก

**7. ลักษณะและส่วนประกอบของยานี้**

**7.1 ลักษณะยา**

- **ทีนิแบท 100** เป็นยาเม็ดกลมปลายมนทั้งสองด้าน เคลือบฟิล์มสีน้ำตาลอมส้ม เรียบทั้งสองด้าน
- **ทีนิแบท 400** เป็นยาเม็ดรูปยาวนูนปลายมนทั้งสองด้าน เคลือบฟิล์มสีน้ำตาลอมส้ม เรียบทั้งสองด้าน

**7.2 ส่วนประกอบอื่นๆของยา**

- ยานี้มีส่วนประกอบของ lactose monohydrate, hypromellose, microcrystalline cellulose, crospovidone, silica colloidal anhydrous, magnesium stearate, talc, polyethylene glycol และสีจาก iron oxide

ผลิตโดย บริษัท ริไลแอนซ์ ไลฟ์ไซน์ซ์ พีวีที จำกัด อินเดีย  
 ตรวจปล่อยยาโดย บริษัท ชินดาน ฟาร์มา เอสอาร์แอล ประเทศโรมาเนีย

นำเข้าโดย : บริษัท สีลมการแพทย์ จำกัด กรุงเทพมหานคร  
 จัดจำหน่ายโดย : บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด, กรุงเทพมหานคร  
 เอกสารนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ พฤศจิกายน 2561

**เอกสารนี้เป็นข้อมูลโดยย่อ หากมีข้อสงสัย  
 ให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร**