

เอกสารกำกับยาภาษาไทยสำหรับผู้ป่วย

อินวีگا ทรินซา™

ยาน้ำแขวนตะกอนชนิดออกฤทธิ์นาน สำหรับฉีดเข้ากล้ามเนื้อ

พาลีเพอริโดน พาลมิเตท

เอกสารกำกับยาฉบับนี้ประกอบด้วยอะไรบ้าง

ในเอกสารกำกับยาฉบับนี้จะตอบคำถามทั่วไปเกี่ยวกับอินวีกา ทรินซา ในเอกสารกำกับยาจะไม่ประกอบด้วยข้อมูลทั้งหมดที่มีอยู่ และเอกสารกำกับยาไม่สามารถแทนที่การพูดคุยกับแพทย์หรือเภสัชกรได้

ถ้าคุณมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้อินวีกา ทรินซา โปรดสอบถามแพทย์หรือเภสัชกร

แพทย์และเภสัชกรของคุณจะมีข้อมูลมากกว่า

ให้เก็บข้อมูลนี้ไว้ใกล้มือ

คุณสามารถดูมันได้ในภายหลังถ้าคุณมีข้อสงสัยอื่น ๆ

อินวีกา ทรินซา ใช้สำหรับอะไร

อินวีกา ทรินซา ถูกจัดอยู่ในกลุ่มยาต้านโรคจิต (antipsychotic agents) ซึ่งช่วยทำให้อาการของความเจ็บป่วยทางจิตบางประเภทดีขึ้น

ยานี้ใช้ในการรักษาอาการของโรคจิตเภท (schizophrenia) ซึ่งเป็นโรคทางจิตที่มีความผิดปกติด้านความคิด ความรู้สึก หรือพฤติกรรม อินวีกา ทรินซา ช่วยในการแก้ไขความไม่สมดุลของสารเคมีในสมองที่เกี่ยวข้องกับสภาวะนี้

ยานี้ยังสามารถใช้เพื่อลดโอกาสในการกลับมามีอาการของโรคจิตเภทซ้ำ

อาการทั่วไปที่พบบ่อยที่สุดของโรคจิตเภท ประกอบด้วย:

- การมองเห็น การได้ยิน หรือการสัมผัสสิ่งต่าง ๆ ที่ไม่มีอยู่จริง (อาการประสาทหลอน (hallucinations))
- มีความเชื่อที่ผิดหรือการตัดสินใจที่ผิดพลาด ในบางครั้งมีความสัมพันธ์กับอาการประสาทหลอน มีความเชื่อมั่นในสิ่งที่แม้ว่ามีหลักฐานตรงกันข้าม (อาการหลงผิด (delusions))
- ไม่เชื่อใจคนอื่นและมีความรู้สึกระแวงสงสัยมาก (อาการหวาดระแวง (paranoia))
- หลีกเลี้ยงครอบครัวและเพื่อน และมีความต้องการอยู่คนเดียว

อาจต้องใช้เวลาสักพักก่อนที่อาการของโรคจิตเภทจะเริ่มดีขึ้น โปรดจำไว้ว่าอินวีก้า ทรินซา เป็นแค่ส่วนหนึ่งของแผนการรักษาทั้งหมดของคุณ เป็นสิ่งสำคัญในการไปพบแพทย์ตามนัดทุกครั้งเพื่อที่คุณจะสามารถได้รับการรักษาตรงเวลาและแพทย์สามารถประเมินอาการของคุณได้

อย่างไรก็ตาม แพทย์ของคุณอาจจะทำการส่งจ่ายอินวีก้า ทรินซา เพื่อใช้ในสาเหตุอื่น โปรดสอบถามแพทย์ถ้าคุณมีข้อสงสัยถึงเหตุผลในการที่แพทย์ส่งจ่ายยาตัวนี้ให้กับคุณ

ก่อนที่คุณจะใช้ยา

เมื่อไรที่ห้ามคุณใช้ยานี้

ห้ามใช้อินวีก้า ทรินซา ถ้าคุณทราบว่าคุณมีการแพ้ต่อส่วนผสมอื่น ๆ ที่ระบุไว้ที่ส่วนท้ายของเอกสารกำกับยาฉบับนี้ หรือยาที่ประกอบด้วย พาลิเพอริโดน (เช่น อินวีก้า) หรือริสเพอริโดน (เช่น ริสเพอดาล)

อาการของการแพ้ ประกอบด้วย ผื่นผิวหนัง หายใจหอบ และ/หรือ มีอาการบวมบริเวณใบหน้า

ห้ามใช้ยาภายหลังจากวันหมดอายุ ที่ได้มีการระบุไว้บนบรรจุภัณฑ์

ถ้าคุณใช้ยาภายหลังจากวันหมดอายุ ยาอาจจะไม่มีฤทธิ์เช่นกัน

ห้ามใช้ยาถ้าบรรจุภัณฑ์มีลักษณะฉีกขาดหรือมีการปลอมแปลง

ห้ามใช้ยาในการรักษาอาการอื่น ๆ ยกเว้นแพทย์จะเป็นคนบอกว่าสามารถใช้ได้อย่างปลอดภัย

ก่อนที่คุณจะเริ่มใช้ยา

ควรใช้อินวีก้า ทรินซา อย่างระมัดระวังในผู้ป่วยบางราย

แจ้งแพทย์ถ้าคุณมีหรือเคยมีอาการ:

- โรคหัวใจหรือหลอดเลือด ประกอบด้วย ความดันโลหิตต่ำหรือสูง
- ภาวะขาดน้ำ
- โรคลมชัก อาการชัก
- ความคิดฆ่าตัวตาย
- พยายามฆ่าตัวตาย
- ม่านต่าย้วยโป่งทะลุแผลผ่าตัด (intraoperative floppy iris syndrome - IFIS) (อาการข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างการผ่าตัดต้อกระจก)
- โรคเกี่ยวกับต่อมพิทูอิทารี
- การอักเสบของปอดเนื่องจากการหายใจ (การหายใจนำอนุภาคอาหารหรือของเหลวเข้าไปในปอด)

- มีปัญหาทางไตหรือตับ
- ภาวะสมองเสื่อม หรือภาวะสมองเสื่อมที่มี Lewy Bodies
- โรคพาร์กินสัน
- หัวใจเต้นผิดปกติ
- Neuroleptic Malignant Syndrome (ปฏิกิริยารุนแรงต่อยาบางตัวที่จะทำให้มีอุณหภูมิร่างกายสูงขึ้นอย่างกะทันหัน ความดันโลหิตสูงมาก และมีอาการชักอย่างรุนแรง)
- Tardive dyskinesia (ปฏิกิริยาต่อยาบางตัวที่จะทำให้มีการเคลื่อนไหวนอกเหนืออำนาจจิตใจบริเวณลิ้น ใบหน้า ปาก ขากรรไกร แขน ขา หรือลำตัว)
- โรคเบาหวาน

ถ้าคุณเป็นโรคเบาหวานอยู่แล้ว หรือมีความเสี่ยง ได้แก่ น้ำหนักตัวเกิน หรือมีประวัติคนในครอบครัวเป็นโรคเบาหวาน ควรทำการตรวจระดับน้ำตาลในเลือดเมื่อเริ่มต้นและในระหว่างการรักษา อาการข้างเคียงของโรคเบาหวานสามารถมีความรุนแรงและคุกคามต่อชีวิตได้
- โรคเกี่ยวกับหลอดเลือดในสมอง ได้แก่ โรคหลอดเลือดสมอง (stroke)
- ภาวะองคชาตแข็งค้าง (องคชาตแข็งตัวอย่างต่อเนื่อง) และ/หรือ เจ็บปวดเมื่อองคชาตแข็งตัว
- ภาวะลิ่มเลือดอุดตัน

แจ้งแพทย์ถ้าคุณหรือคนอื่นในครอบครัวของคุณมีประวัติการเกิดภาวะลิ่มเลือดอุดตัน เคยมีการพบภาวะลิ่มเลือดอุดตันที่ปอดหรือขาในผู้ป่วยที่ได้รับอินวิกา ทรินซา ภาวะลิ่มเลือดอุดตันที่ปอดสามารถเป็นอันตรายถึงชีวิตได้
- จำนวนเม็ดเลือดขาวต่ำ

เนื่องจากการลดลงอย่างร้ายแรงของจำนวนเม็ดเลือดขาวบางประเภทที่มีความจำเป็นในการต่อสู้กับการติดเชื้อในเลือด เคยมีการพบน้อยมากในผู้ป่วยที่ได้รับอินวิกา ทรินซา แพทย์อาจทำการตรวจสอบจำนวนเม็ดเลือดขาว แจ้งแพทย์ถ้าคุณทราบว่าเคยมีจำนวนเม็ดเลือดขาวต่ำในอดีต (ซึ่งอาจจะมีหรือไม่มีสาเหตุมาจากยาตัวอื่น)

แจ้งแพทย์ถ้า:

- คุณกำลังตั้งครรรภ์หรือวางแผนที่จะตั้งครรรภ์ แพทย์จะเป็นคนแนะนำว่าคุณควรหรือไม่ควรใช้อินวิกา ทรินซา

อาการสั่น กล้ามเนื้อแข็งเกร็ง และ/หรือ อ่อนแรง มีอาการง่วงนอน ภาวะกายใจไม่สงบ มีปัญหาด้านการหายใจ และมีความลำบากในการกินอาหาร อาจเกิดขึ้นในทารกแรกเกิด ถ้าคุณใช้อินวิกา ทรินซาในระหว่างการตั้งครรรภ์ไตรมาสสุดท้าย

- คุณกำลังอยู่ในช่วงให้นมบุตร อินวีก้า ทรินซาถูกขับออกมาในน้ำนมได้ แนะนำไม่ให้คุณให้นมบุตร ในระหว่างที่คุณใช้อินวีก้า ทรินซา

กำลังใช้ยาตัวอื่นอยู่

แจ้งแพทย์หรือเภสัชกรถ้าคุณกำลังใช้ยาตัวอื่นอยู่ ซึ่งรวมถึงยาที่คุณสามารถซื้อได้โดยปราศจากใบสั่งแพทย์จากร้านขายยา ซูเปอร์มาร์เก็ต หรือร้านขายผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพ

แจ้งแพทย์ของคุณถ้าคุณกำลังใช้:

- ยานอนหลับ ยาคลายกังวล ยาระงับปวด ยาต้านฮิสตามีน
- ยาที่ใช้ในการรักษาโรคซึมเศร้า โรคตื่นตระหนก โรควิตกกังวล หรือโรคย้ำคิดย้ำทำ
- ยาสำหรับโรคหัวใจหรือความดันโลหิต
- ยาอื่น ๆ ที่ใช้ในการรักษาความเจ็บป่วยทางจิต หรือโรคจิต

ใช้ยาอย่างไร

การใช้ยาครั้งแรก

แพทย์จะไม่เริ่มให้การรักษาด้วยอินวีก้า ทรินซา จนกว่าจะทราบว่า คุณเคยได้รับการรักษาด้วยอินวีก้า ซัสเทนนาแล้วเป็นเวลาอย่างน้อย 4 เดือน

ที่จุดเริ่มต้นของการรักษา คุณอาจมีความดันโลหิตตกที่ทำให้คุณรู้สึกวิงเวียนเมื่อยืนขึ้น หรือหัวใจของคุณเต้นเร็วขึ้น อาการเหล่านี้จะหายไปในเวลาไม่กี่วัน

แจ้งแพทย์ถ้าอาการเหล่านี้เกิดขึ้นต่อเนื่องหรือทำให้คุณกังวล

ใช้ยาขนาดเท่าไร

แพทย์จะเป็นคนตัดสินใจขนาดยาที่เหมาะสมสำหรับคุณ

บริหารยาอย่างไร

อินวีก้า ทรินซา เป็นยาในรูปแบบที่มีการปรับปรุงการปลดปล่อยยา ที่บุคลากรทางการแพทย์จะบริหารยาให้กับคุณโดยการฉีด นั่นหมายความว่ายานี้จะค่อย ๆ ปลดปล่อยสู่ร่างกายของคุณ และคุณไม่จำเป็นต้องฉีดยาทุกวัน

อินวีก้า ทรินซา เป็นผลิตภัณฑ์ที่ออกฤทธิ์นานโดยที่คุณจะได้รับยาเพียงแค่ 1 ครั้งในทุก 3 เดือน

แพทย์และบุคลากรทางการแพทย์จะบริหารยาโดยการฉีดเข้าที่บริเวณต้นแขนหรือ สะโพก คุณอาจมีความรู้สึกปวดหรือไม่สบายตัว แต่อาการจะดีขึ้นเมื่อเวลาผ่านไป

ใช้ยาบ่อยแค่ไหน

หลังจากคุณได้รับยาในครั้งแรก แนะนำว่าให้อินวีก้า ทรินซา 1 ครั้ง ในทุก 3 เดือน แพทย์อาจเปลี่ยนแปลงขนาดยาโดยขึ้นอยู่กับอาการตอบสนองของร่างกายของคุณต่อยา

คุณมีความจำเป็นต้องได้รับยาฉีดจำนวนเท่าไร

อินวีก้า ทรินซา ช่วยในการควบคุมสถานะของคุณ แต่ไม่ได้ช่วยให้หายขาดจากโรค ดังนั้น คุณมีความจำเป็นในการได้รับการฉีดยาอย่างสม่ำเสมอ อย่าหยุดยาเอง แม้ว่า คุณจะรู้สึกดีขึ้นก็ตาม

จะเกิดอะไรขึ้นถ้าคุณพลาดการฉีดยา

เป็นสิ่งสำคัญมากในการไปพบแพทย์ตามนัดทุกครั้งเพื่อที่คุณจะสามารถได้รับยาตรงเวลา รับผิดชอบแพทย์โดยเร็วที่สุดเท่าที่คุณสามารถทำได้ ถ้าคุณคิดว่าคุณกำลังจะหรือไม่ได้ไปพบแพทย์ตามนัด

แพทย์จะเป็นคนตัดสินใจว่าคุณควรจะต้องทำอะไรต่อไป

สำหรับผู้ป่วยสูงอายุ

โดยทั่วไป แพทย์จะสั่งจ่ายยาขนาดเดียวกับผู้ป่วยผู้ใหญ่ แต่แพทย์อาจจะปรับขนาดยาถ้าคุณมีภาวะการทำงานไตบกพร่อง

สำหรับผู้ป่วยที่มีภาวะการทำงานของไตบกพร่อง

สำหรับผู้ป่วยที่มีภาวะการทำงานของไตบกพร่องเล็กน้อย ขนาดยาสูงสุดที่แนะนำคือ 350 มิลลิกรัม ไม่แนะนำการใช้อินวีก้า ทรินซา ในผู้ป่วยที่มีภาวะการทำงานของไตบกพร่องปานกลางหรือรุนแรง

ไม่สามารถแนะนำการใช้อินวีก้า ทรินซา ในเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปีที่เป็นโรคจิตเภท ได้ ณ ปัจจุบัน เนื่องจากว่ามีประสบการณ์การใช้ผลิตภัณฑ์นี้ในคนไข้กุ่มนี้้น้อย

การได้รับยาเกินขนาด

เนื่องจากคุณจะได้รับอินวีก้า ทรินซา ภายใต้ความดูแลของแพทย์ จึงมีความเป็นไปได้น้อยมากในการที่คุณจะได้รับยาเกินขนาด

อย่างไรก็ตาม ถ้าคุณเกิดอาการข้างเคียงใด ๆ หลังจากได้รับอินวีก้า ทรินซา ให้รีบแจ้งแพทย์โดยทันที หรือไปที่แผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉินที่โรงพยาบาลที่ใกล้คุณที่สุด

คุณอาจจำเป็นต้องได้รับการดูแลทางการแพทย์อย่างฉุกเฉิน

ในระหว่างที่คุณกำลังใช้ยา

สิ่งที่คุณต้องทำ

ปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์อย่างเคร่งครัด ห้ามพลาดหรือหยุดการรักษาโดยไม่ได้ทำการปรึกษากับแพทย์ก่อน

แพทย์มีความยินดีที่จะมีการพูดคุยปรึกษากับคุณถึงข้อสงสัยที่คุณมีเกี่ยวกับการรักษา

แจ้งแพทย์ถ้าคุณตั้งครรภ์หรือกำลังวางแผนที่จะตั้งครรภ์

รีบแจ้งแพทย์โดยทันทีถ้าคุณสังเกตพบว่าการเคลื่อนไหวแบบบิดไปมา (**worm-like movements**) ของลิ้น หรือมีการเคลื่อนไหวที่ควบคุมไม่ได้แบบอื่น ๆ ของลิ้น ปาก แก้ม หรือขากรรไกร ซึ่งอาจเกิดขึ้นที่แขนและขา

อาการเหล่านี้เป็นกลุ่มอาการที่เรียกว่า tardive dyskinesia ซึ่งสามารถเกิดขึ้นได้ในผู้ที่ใช้กลุ่มยาต้านโรคจิต ซึ่งรวมถึงอินวีก้า ทรินซา อาการนี้มักจะเกิดขึ้นในระหว่างที่มีการรักษาด้วยอินวีก้า ทรินซา ในระยะยาว อาการนี้อาจเกิดขึ้นอย่างถาวรได้แต่พบในกรณีที่น้อยมาก อย่างไรก็ตาม ถ้าสามารถตรวจพบได้เร็ว อาการเหล่านี้ส่วนมากสามารถหายเป็นปกติได้

ถ้าคุณกำลังวางแผนที่จะทำการผ่าตัดดวงตา ให้แน่ใจว่าได้แจ้งจักษุแพทย์แล้วว่าคุณกำลังใช้ยาตัวนี้อยู่ แจ้งแพทย์คนอื่น ๆ ทันตแพทย์ และเภสัชกรผู้ที่ให้การรักษาว่าคุณกำลังใช้อินวีก้า ทรินซาอยู่

สิ่งที่คุณห้ามทำ

ห้ามพลาดการฉีดยาหรือไม่ไปพบแพทย์ตามนัด

ห้ามดื่มแอลกอฮอล์

อินวีก้า ทรินซา สามารถเพิ่มฤทธิ์ของแอลกอฮอล์ได้

สิ่งที่ต้องระมัดระวัง

สอบถามแพทย์หรือเภสัชกรก่อนใช้ยาตัวอื่น

ซึ่งรวมถึงยาสมุนไพรและยาอื่น ๆ ที่ซื้อจากร้านขายยาหรือซูเปอร์มาร์เก็ต

ให้ระมัดระวังในการขับขี่หรือใช้เครื่องจักร จนกว่าคุณจะทราบว่าอินวีก้า ทรินซา ส่งผลอย่างไรกับคุณ

อินวีก้า ทรินซา อาจส่งผลให้มีอาการเวียนศีรษะ ซึม หรือวิงเวียนคล้ายจะเป็นลม ในบางคน ให้แน่ใจว่าคุณทราบว่าอินวีก้า ทรินซา ส่งผลอย่างไรกับคุณ ก่อนที่คุณจะขับรถ ใช้เครื่องจักร หรือกระทำการอื่นที่อาจ

เป็นอันตรายได้ถ้าคุณมีอาการเวียนศีรษะ หรือวิงเวียนคล้ายจะเป็นลม ถ้าอาการนี้เกิดขึ้นห้ามขับขี่หรือใช้เครื่องจักร

ถ้ายาทำให้คุณรู้สึกวิงเวียนคล้ายจะเป็นลม เวียนศีรษะ หรือเป็นลม ให้ระมัดระวังเมื่อคุณมีการลุกขึ้นยืนจากที่นั่งหรือนอน

การลุกขึ้นยืนอย่างช้า ๆ สามารถช่วยได้

อาการข้างเคียง

ยาทุกตัวอาจมีอาการไม่พึงประสงค์บางอย่าง ในบางครั้งอาการไม่พึงประสงค์จะมีความรุนแรง แต่ส่วนใหญ่แล้วอาการที่เกิดขึ้นมักจะไม่ค่อยรุนแรงเท่าไร แพทย์จะเป็นคนพิจารณาระหว่างความเสี่ยงจากการใช้ยากับผลดีที่คาดว่าจะมีต่อคุณ

ยาทุกตัวสามารถทำให้เกิดอาการข้างเคียงได้ คุณอาจจำเป็นต้องได้รับการรักษาทางการแพทย์ถ้าคุณเกิดมีอาการข้างเคียงบางอย่าง

ให้สอบถามแพทย์หรือเภสัชกรในข้อสงสัยที่คุณมี

รีบแจ้งแพทย์หรือเภสัชกรโดยเร็วที่สุดเท่าที่ทำได้ถ้าคุณรู้สึกไม่ดีในระหว่างที่ใช้อินวิกา ทรินซา

ยาจะช่วยผู้ป่วยส่วนใหญ่ในอาการของโรคจิตเภท แต่สามารถเกิดอาการไม่พึงประสงค์ได้ในผู้ป่วยจำนวนน้อยราย

แจ้งแพทย์ถ้าคุณมีอาการเหล่านี้เกิดขึ้นหรือทำให้คุณกังวล:

มีความลำบากในการคิดหรือทำงานเนื่องมาจาก:

- นอนหลับหรือคงการนอนหลับยาก
- ปวดศีรษะ
- มีอาการสั่น
- ซึม เหนื่อย ยากในการใช้สมาธิ
- ปวดที่บริเวณที่ฉีดยา

การเปลี่ยนแปลงด้านพฤติกรรม ได้แก่:

- ภาวะกายใจไม่สงบ
- รู้สึกกระวนกระวายใจ

การเปลี่ยนแปลงด้านอื่น ๆ ได้แก่:

- กล้ามเนื้อแข็งเกร็งหรือปวด มีอาการปวดกระดูกหรือกล้ามเนื้อ
- ข้อต่อฝืดหรือบวม

- ติดเชื้อ
- โรคปอดบวม
- อาการไข้หวัด
- อาการคล้ายไข้หวัดใหญ่
- ติดเชื้อระบบทางเดินปัสสาวะ
- มองเห็นภาพมัว อาการตากลอก
- ปวดฟัน
- ปากแห้ง
- กระจายน้ำมากผิดปกติ (สิ่งนี้อาจเป็นอาการแสดงว่าคุณเป็นโรคเบาหวาน)
- ภาวะขาดอารมณ์
- ซึมเศร้า
- สีว
- ผิวหนังแห้ง
- ผิวหนังแข็ง
- อารมณ์ร้ายแรง
- อาการเวียนศีรษะบ้านหมุน
- เลือดกำเดาไหล
- น้ำหนักตัวเพิ่มหรือลด
- เพิ่มหรือลดความอยากอาหาร
- ไม่สามารถถ่ายปัสสาวะได้หรือมีอาการเจ็บปวดในระหว่างปัสสาวะ
- การย่อยอาหารไม่ดี คลื่นไส้ ปวดท้อง
- ท้องเสีย
- ท้องผูก
- อาเจียน
- การหลั่งน้ำนมผิดปกติ
- เต้านมบวม
- ประจำเดือนขาดหรือผิดปกติ
- มีความลำบากในการเริ่มหรือคงการแข็งตัวขององคชาติ; หรือมีการแข็งตัวขององคชาติอย่างต่อเนื่อง และ/หรือ เจ็บปวดเมื่อองคชาติแข็งตัว ภาวะองคชาติแข็งค้าง (องคชาติแข็งตัวยาวนาน)

- อาการเหล่านี้เป็นอาการข้างเคียงที่ไม่รุนแรงของอินวีگا ทรินซา แต่อาจต้องได้รับการดูแลทางการแพทย์

รีบแจ้งแพทย์โดยทันที หรือไปที่แผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉินที่โรงพยาบาลที่ใกล้คุณที่สุด ถ้าคุณมีอาการต่อไปนี้:

ปัญหาเกี่ยวกับหัวใจหรือความดันโลหิต ได้แก่:

- ความดันโลหิตตก โดยเฉพาะเวลาขึ้น สิ่งนี้จะปรากฏต่อคุณในอาการวิงเวียนคล้ายจะเป็นลม หรืออาการเวียนศีรษะที่จะหายไปเมื่อเวลาผ่านไปไม่กี่วินาทีหรือหลังจากนั่งลงอีกครั้ง
- อัตราการเต้นของหัวใจเร็ว อัตราการเต้นของหัวใจช้า หัวใจเต้นผิดปกติ

อาการของโรคเบาหวาน ได้แก่:

- อาการแสดงของการมีระดับน้ำตาลในเลือดสูงหรือโรคเบาหวาน ได้แก่ รู้สึกหิวน้ำตลอดเวลา มีการถ่ายปัสสาวะ หรือ “ฉี่” บ่อยกว่าปกติ หรือรู้สึกอ่อนแรงหรือหิว

มีการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของร่างกาย ได้แก่:

- ไข้
- อุณหภูมิของร่างกายสูงผิดปกติ

อาการเหล่านี้อาจเป็นอาการข้างเคียงที่รุนแรงจากอินวีกา ทรินซา คุณอาจจำเป็นต้องได้รับการดูแลทางการแพทย์อย่างเร่งด่วน

อาการข้างเคียงที่รุนแรงสามารถพบได้ไม่บ่อย

ถ้ามีอาการใด ๆ เหล่านี้เกิดขึ้น ให้หยุดใช้อินวีกา ทรินซาและรีบแจ้งแพทย์โดยทันที หรือไปที่แผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉินที่โรงพยาบาลที่ใกล้คุณที่สุด:

- ผื่นผิวหนัง คัน หรือลมพิษบนผิวหนัง; หายใจหอบ หายใจมีเสียงหวีด หรือมีความลำบากในการหายใจ; มีอาการบวมบริเวณใบหน้าริมฝีปาก ลิ้น หรือส่วนอื่น ๆ ของร่างกาย ถ้าคุณมีอาการเหล่านี้ คุณอาจเกิดปฏิกิริยาการแพ้อย่างรุนแรงต่ออินวีกา ทรินซา
- มีอาการอ่อนแรงกระแทกหัน หรือขาบริเวณใบหน้า แขน หรือขา โดยเฉพาะเกิดขึ้นบนร่างกายซีกเดียว หรือกรณีมีอาการพูดหรือออกเสียงไม่ชัด (slurred speech) (อาการเหล่านี้ เรียกว่า สมองขาดเลือดชั่วคราว (mini-strokes))
- การเคลื่อนไหวนอกเหนืออำนาจจิตใจบริเวณลิ้น ใบหน้า ปาก ขากรรไกร แขน ขา หรือลำตัวสามารถเกิดขึ้นได้หลังจากได้รับอินวีกา ทรินซา หรือยาต้านโรคจิตตัวอื่นเป็นระยะเวลาสั้น ถ้าเกิดอาการนี้ขึ้นให้ติดต่อแพทย์

อาการเหล่านี้คืออาการข้างเคียงที่รุนแรงมาก คุณอาจจำเป็นต้องได้รับการดูแลทางการแพทย์อย่างเร่งด่วน หรือเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาล

แจ้งแพทย์ถ้าคุณสังเกตพบอาการข้างเคียงอื่น ๆ ที่ทำให้คุณรู้สึกไม่ดี
 อาการข้างเคียงอื่น ๆ ที่ไม่ได้ระบุในรายการด้านบนอาจเกิดขึ้นได้ในคนบางคน
โปรดอย่าลังเลที่จะรายงานอาการข้างเคียงใด ๆ ต่อแพทย์หรือเภสัชกร
โปรดอย่าตื่นตระหนกกับรายการของอาการข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้นได้
 คุณอาจจะไม่เกิดอาการเหล่านี้ขึ้นก็ได้

หลังจากใช้ยา

การเก็บยารักษา

อินวีก้า ทรินซา จะถูกจัดเก็บโดยแพทย์หรือเภสัชกร ยาจะถูกเก็บในที่แห้ง ป้องกันจากแสง ห้ามเก็บที่อุณหภูมิมากกว่า 30 องศาเซลเซียส เก็บยาให้พ้นจากสายตาและมือเด็ก
แพทย์หรือเภสัชกรจะไม่ใช้ยาภายหลังจากวันหมดอายุ ที่ได้มีการระบุไว้บนบรรจุภัณฑ์
 ไม่สามารถเก็บยาไว้ใช้ได้โดยไม่มีการกำหนดได้ แม้ว่าจะมีการจัดเก็บยาเป็นอย่างดีก็ตาม

คำอธิบายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์

ยาหน้าตาเป็นอย่างไร

อินวีก้า ทรินซา อยู่ในรูปแบบหลอดบรรจุยาพร้อมฉีดยา ซึ่งประกอบด้วยปริมาณของพาลีเพอริโดน (ในรูป พาลมิเตท) ที่แตกต่างกัน ในบรรจุภัณฑ์ยังประกอบด้วยเข็มฉีดยา (safety needle)

ส่วนประกอบของยา

ตัวยาสําคัญใน อินวีก้า ทรินซา คือ พาลีเพอริโดน (ในรูป พาลมิเตท)
 ในหลอดบรรจุยาพร้อมฉีดยาประกอบด้วยยาพาลีเพอริโดนขนาด 175 263 350 และ 525 มิลลิกรัม (ในรูป พาลีเพอริโดน พาลมิเตทขนาด 273 410 546 และ 819 มิลลิกรัม ตามลำดับ)
 สารที่ไม่มีฤทธิ์ในยา คือ กรดซिटริกโมโนไฮเดรต โพลีเอธิลีนไกลคอล 4000 โพลีซอร์เบต 20 โซเดียมไดไฮโดรเจนฟอสเฟตโมโนไฮเดรต โซเดียมไฮดรอกไซด์ น้ำสำหรับยาฉีด (water for injection)

เอกสารกำกับยานี้ถูกจัดเตรียมเมื่อ ตุลาคม 2559

ผลิตโดย

Janssen Pharmaceutica NV
Beerse, Belgium (ประเทศเบลเยียม)

เลขทะเบียนตำรับยา

1C 53/60 (NC)

วันที่ได้รับอนุมัติทะเบียนตำรับยา

3 สิงหาคม 2560

นำเข้าโดย

บริษัท แจนเซน-ซีแลก จำกัด
106 หมู่ 4 นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง
ถนนฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง
กรุงเทพฯ 10520
โทรศัพท์: 02-792-7200
โทรสาร: 02-792-7222

โปรดอ่านเอกสารกำกับยาสำหรับแพทย์ฉบับเต็มได้ทางเว็บไซต์ <http://ndi.fda.moph.go.th/>