

เอแนสโตรโซล
ความแรง 1 มิลลิกรัม
ชนิดเม็ด
ชื่อการค้า
ANASTROZOLE 1 EURODRUG
(เอแนสโตรโซล 1 ยูโรดรัก)

1. ยานี้คืออะไร

1.1 ยานี้มีชื่อว่าอะไร

- ยานี้มีชื่อว่า ยานี้ มีชื่อว่า เอแนสโตรโซล (ANASTROZOLE) มีตัวยา 1 มิลลิกรัม เป็นยารักษามะเร็ง

1.2 ยานี้ใช้เพื่ออะไร

- ยานี้ใช้รักษาโรคมะเร็งเต้านมระยะลุกลามในผู้หญิงวัยหมดประจำเดือน

2. ข้อควรระวังก่อนใช้ยา

2.1 ห้ามใช้ยานี้เมื่อไร

- ⊗ เคยแพ้ยานี้ หรือส่วนประกอบอื่นในยานี้
- ⊗ เมื่อตั้งท้อง หรือวางแผนจะตั้งท้อง
- ⊗ เมื่ออยู่ในระยะให้นมลูก เพราะทำให้เกิดอันตรายร้ายแรงต่อลูก

2.2 ข้อควรระวังเมื่อใช้ยานี้

- ให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร ในกรณีต่อไปนี้
 - ยังไม่เข้าสู่วัยหมดประจำเดือน
 - เคยมีประวัติเกี่ยวกับโรคหัวใจ ตับ ไต และกระดูก
 - มีไขมันในเลือดสูง
 - ไม่ควรใช้ยานี้ร่วมกับยา อาหาร สมุนไพร หรือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบางชนิด เพราะอาจมีผลต่อการรักษาหรือเกิดอันตรายได้ เช่น ยารักษากระดูกบางชนิด หรือยาที่มีส่วนประกอบของฮอร์โมนเอสโตรเจน

3. วิธีใช้ยา

3.1 ขนาดและวิธีใช้

- ควรใช้ยาตามคำแนะนำของแพทย์หรือเภสัชกรเท่านั้น เพราะขนาดและระยะเวลาในการใช้ยานี้ ขึ้นกับชนิดและความรุนแรงของโรค
- ควรกินยาให้ตรงเวลา
- ยานี้กินวันละครั้ง ก่อนหรือหลังอาหาร
- ให้กลืนยาทั้งเม็ดพร้อมน้ำเปล่า ห้ามแบ่ง เคี้ยว หรือบดเม็ดยา

3.2 หากลืมกินยาควรทำอย่างไร

- ให้รอกินยาของมื้อถัดไป และห้ามกินยาเพิ่มเป็น 2 เท่า

3.3 ถ้ากินยานี้เกินขนาดที่แนะนำ ควรทำอย่างไร

- ให้สังเกตอาการอย่างใกล้ชิด หากมีอาการผิดปกติที่รุนแรง เช่น ท้องเสีย อ่อนเพลีย ปวดข้อ ให้รีบนำส่งโรงพยาบาลทันที

4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างใช้ยา

- พบแพทย์ตามนัดอย่างสม่ำเสมอ
 - เพื่อติดตามผลการรักษา หรืออันตรายจากยา
 - เพื่อตรวจติดตามระดับฮอร์โมนเอสโตรเจนและมวลกระดูก
- ห้ามหยุดยาเอง และให้กินยาอย่างต่อเนื่องตามคำแนะนำของแพทย์ หรือเภสัชกร
- ระมัดระวังการขับขี่ยานยนต์ หรือทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักรกล หรือทำงานที่เสี่ยงต่อการพลัดตกจากที่สูง

5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา

5.1 อาการที่ต้องหยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที

- ลมพิษ บวมที่ใบหน้า เปลือกตา ริมฝีปาก
 - หน้ามืด เป็นลม แน่นหน้าอก หายใจลำบาก
 - ผื่นแดง ตุ่มพอง ผื่นหนังหลุดลอก มีจุดตามผิวหนังหรือเลือดออกผิดปกติ
 - มีเลือดออกทางช่องคลอดติดต่อกันหลายวัน
 - ปวดหน้าอก หรือหายใจถี่ เพราะอาจเป็นอาการของโรคหัวใจ
 - ตัวเหลืองหรือตาขาว รู้สึกไม่สบายตัว ปวดท้องด้านขวา เพราะอาจเป็นอาการของโรคตับ
- “ให้หยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที”**

5.2 อาการที่ไม่จำเป็นต้องหยุดยา แต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์

- ปวดข้อ ข้อติด ปวดกระดูก
- ท้องเสีย คลื่นไส้ อาเจียน
- ปวดหัว อ่อนเพลีย ผม่วง
- ช่องคลอดแห้ง
- ร้อนวูบวาบ อารมณ์แปรปรวน
- นอนไม่หลับ
- ความดันโลหิตสูง

“ไม่จำเป็นต้องหยุดยา แต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์”

6. ควรเก็บยานี้อย่างไร

- เก็บไว้ในบรรจุภัณฑ์เดิมตามที่ได้รับมา
- เก็บยาในที่แห้ง อบอุ่น โดยตรง โดยทั่วไปควรเก็บที่อุณหภูมิไม่เกิน 30 องศาเซลเซียส ไม่เก็บยาในที่ร้อนหรือชื้น เช่น ในรถ ห้องน้ำ ห้องครัว
- ควรแกะยามือกินในแต่ละครั้งเท่านั้น ห้ามแกะยาออกจากแผงก่อน เพราะยาอาจเสียได้
- เก็บยาให้พ้นมือเด็ก

7. ลักษณะและส่วนประกอบของยานี้

- ลักษณะยา เป็นยาเม็ดกลมมนทั้ง 2 ด้าน เคลือบฟิล์มสีขาว
- **ตัวยาสําคัญ** เอแนสโตรโซล 1 มิลลิกรัม
- **ส่วนประกอบอื่นๆ** ได้แก่ แคลคิตริโมโนไฮเดรต, สเตาซ, โพรโตน, ไมโครคริสตัลไลน์ เซลลูโลส, โซเดียม สเตาซ ไกลโคเลท, คอลลอยดอล ซิลิคอนไดออกไซด์, แมกนีเซียม สเตียเรท, ทาล, ไฮโปรมेलโลส, โพลีเอทิลีน ไกลคอล 400, ไททานเนียม ไดออกไซด์

ผู้ผลิต : Remedica Ltd ประเทศไอร์แลนด์

ผู้รับอนุญาต : บริษัท แมซิฟิค เฮลท์แคร์ (ไทยแลนด์) จำกัด
1011 อาคารศุภาลัย แกรนด์ ทาวเวอร์ ห้อง 01 ชั้น 29 ถนน
พระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120

เอกสารนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ 15 ตุลาคม 2564

ศึกษาข้อมูลยาเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ของ อย.

- <http://www.fda.moph.go.th/sites/oss/Pages/Main.aspx>
- <http://ndi.fda.moph.go.th/>

คำเตือน ยานี้อาจทำให้เกิดอันตรายร้ายแรงได้
ต้องใช้อย่างใต้การควบคุมของแพทย์เท่านั้น

เอกสารนี้เป็นข้อมูลโดยย่อ
หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร