

โรพิวาเคนไฮโดรคลอไรด์
ความแรง 2 มิลลิกรัม ต่อ 1 มิลลิลิตร
สารละลายสำหรับฉีด/หยดเข้าทาง
หลอดเลือดดำ
ชื่อการค้า Ropivacaine B. Braun
2 mg/ml (โรพิวาเคน บี. บราวน์
2 มก./มล.)

1. ยานี้คืออะไร

1.1 ยานี้มีชื่อว่าอะไร

ยานี้มีชื่อว่า โรพิวาเคนไฮโดรคลอไรด์ (Ropivacaine Hydrochloride) 2 มิลลิกรัม ต่อ 1 มิลลิลิตร เป็นยาในกลุ่มยาชาเฉพาะที่

1.2 ยานี้ใช้เพื่ออะไร

ยานี้ใช้เพื่อบรรเทาอาการปวดเฉียบพลันในเด็กและผู้ใหญ่ โดยทำให้ร่างกายชา เช่น หลังการผ่าตัด

2. ข้อควรระวังก่อนใช้ยา

2.1 ห้ามใช้ยานี้เมื่อไร

- ⊗ เคยแพ้ยานี้หรือส่วนประกอบของยานี้
- ⊗ เคยแพ้ยาชาเฉพาะที่ในกลุ่มเดียวกัน เช่น ยา利多เคนหรือยาบูพิวาเคน
- ⊗ ฉีดเข้าเส้นเลือด
- ⊗ ฉีดเข้ามดลูกเพื่อบรรเทาปวดในระหว่างคลอดบุตร
- ⊗ มีปริมาณเลือดน้อย (Hypovolaemia)

2.2 ข้อควรระวังเมื่อใช้ยานี้

- ให้ปรึกษาแพทย์ในกรณีต่อไปนี้
 - มีปัญหาเกี่ยวกับหัวใจ ตับ หรือไต
 - คนในครอบครัวหรือคุณเป็นโรคพอร์ไฟเรีย
 - มีหรือเคยมีโรคประจำตัวอื่น ๆ
 - มีแผนตั้งครรภ์ กำลังตั้งครรภ์ หรือกำลังให้นมบุตร
 - กำลังใช้ยาต่อไปนี้ เช่น ยา利多เคน มอร์ฟีน อะมิโอดาโรน เมกซิลีทิน ฟลูโวซามีน อินออกซาซิน เป็นต้น

3. วิธีใช้ยา

3.1 ขนาดและวิธีใช้

แพทย์หรือพยาบาลจะเป็นผู้ฉีดยานี้ให้ท่าน

3.2 ถ้าสงสัยว่าได้รับยาเกินขนาด ควรทำอย่างไร
หากสงสัยว่าได้รับยานี้เกินขนาดแล้วมีอาการมึนงง หน้ามืด ชาที่ริมฝีปากและลิ้น มีปัญหาการได้ยินและการมองเห็น ให้รีบแจ้งแพทย์หรือพยาบาล

4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างใช้ยา

- หลีกเลี่ยงการขับชี่ยานพาหนะ การทำงานกับเครื่องจักรหรืองานที่เสี่ยงต่อการพลัดตกจากที่สูง เพราะยานี้อาจทำให้ดวงซึม

5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา

5.1 อาการที่ต้องแจ้งแพทย์ พยาบาล หรือเภสัชกรทันที

- ลมพิษ บวมที่ใบหน้า เปลือกตา ริมฝีปาก หรือส่วนอื่น ๆ ของร่างกาย
- หน้ามืด เป็นลม แขนงหน้าอก หายใจลำบาก
- ผื่นแดง ตุ่มพอง ผิวหนังหลุดลอก มีจ้ำตามผิวหนังหรือเลือดออกผิดปกติ

5.2 อาการที่อาจเกิดได้และให้รอดอาการ แต่ถ้ามีอาการรุนแรง ให้แจ้งต่อแพทย์ พยาบาล หรือเภสัชกร

- หัวใจเต้นช้าหรือเร็ว หัวใจเต้นผิดปกติ
- เวียนศีรษะ ปวดหัว เกร็ง เจ็บแปลบ
- คลื่นไส้ อาเจียน
- วิดกกังวล
- ปวดหลัง
- ไข้ หนาวสั่น
- ปัสสาวะลำบาก

“ให้รอดอาการ แต่ถ้ามีอาการรุนแรง ให้แจ้งต่อแพทย์ พยาบาล หรือเภสัชกร”

6. ควรเก็บยานี้อย่างไร

ยานี้เก็บไว้ที่โรงพยาบาล ท่านจะไม่ได้รับกลับบ้าน

7. ลักษณะและส่วนประกอบของยานี้

- **ลักษณะยา:** น้ํายาปราศจากเชื้อสำหรับฉีดใส ไม่มีสี
- **ตัวยาสําคัญ:** โรพิวาเคนไฮโดรคลอไรด์ ความแรง 2 มิลลิกรัม ต่อ 1 มิลลิลิตร
- **ส่วนประกอบอื่น ๆ:** โซเดียมคลอไรด์, กรดไฮโดรคลอริก โซเดียมไฮดรอกไซด์ และนํ้าสำหรับยาฉีด

ผู้ผลิต:

บริษัท บี. บราวน์ เมลซุงเกน เอจี เบอร์ลิน ประเทศเยอรมนี

หรือ

บริษัท บี. บราวน์ เมดิคอล เอสเอ รูปี ประเทศสเปน

ผู้นำส่ง:
บริษัท บี. บราวน์ (ประเทศไทย) จำกัด กรุงเทพฯ ประเทศไทย

เอกสารนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ:
DD.MM.YYYY

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ของอย.

- <http://www.fda.moph.go.th/sites/oss/Pages/Main.aspx>
- <http://ndi.fda.moph.go.th/>

เอกสารนี้เป็นข้อมูลโดยย่อ หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร