

อะคาลาบรูทีนิบ
ความแรง 100 มิลลิกรัม
ชนิดแคปซูล
ชื่อการค้า CALQUENCE (แคลควอนซ์)

1. ยานี้คืออะไร

1.1 ยานี้มีชื่อว่าอะไร

- ยานี้มีชื่อว่า อะคาลาบรูทีนิบ (acalabrutinib) มีตัวยา 100 มิลลิกรัม เป็นยาในกลุ่มยาต้านมะเร็ง

1.2 ยานี้ใช้เพื่ออะไร

- ยานี้ใช้เพื่อ รักษาโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวที่แพทย์ตรวจแล้วว่าจำเป็นต้องใช้ยานี้

2. ข้อควรระวังก่อนใช้ยา

2.1 ห้ามใช้ยานี้เมื่อไร

⊗ เคยแพ้ยานี้ หรือส่วนประกอบของยานี้

2.2 ข้อควรระวังเมื่อใช้ยานี้

- ให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร ในกรณีต่อไปนี้
 - เป็นเด็กหรือวัยรุ่นที่มีอายุน้อยกว่า 18 ปี
 - กำลังวางแผนที่จะท้อง
 - มีรอยขีด ฝ้า เลือดตามผิวหนัง ผิดปกติหรือมีเลือดออก
 - เพิ่งได้รับการผ่าตัดหรือกำลังจะต้องผ่าตัด
 - เคยติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบี
 - มีหรือเคยมีภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ
 - กำลังเกิดโรคใหม่หรือมีการเปลี่ยนแปลงลักษณะภายนอกบริเวณผิวหนัง
 - กำลังใช้ยา สมุนไพร หรือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารอื่น ๆ

“หากไม่แน่ใจว่ามีภาวะดังกล่าวให้ปรึกษาแพทย์ หรือเภสัชกร ก่อนเริ่มใช้ยา”

3. วิธีใช้ยา

3.1 ขนาดและวิธีใช้

- ควรใช้ยาตามคำแนะนำของแพทย์หรือ เภสัชกร เท่านั้น เพราะขนาดและระยะเวลาในการใช้ยานี้ ขึ้นกับชนิดและความรุนแรงของโรค

3.2 หากลืมกินยาควรทำอย่างไร

- ให้กินยามื้อถัดไปตามปกติ ห้ามกินยาเป็น 2 เท่า

3.3 ถ้ากินยานี้เกินขนาดที่แนะนำ ควรทำอย่างไร

- ให้สังเกตอาการอย่างใกล้ชิด หากมีอาการผิดปกติที่รุนแรง ให้รีบนำส่งโรงพยาบาลทันทีพร้อมนำยาและเอกสารนี้ไปด้วย

4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างใช้ยา

- ห้ามหยุดยาเองและให้กินยาต่อเนื่องตามคำแนะนำของแพทย์ หรือเภสัชกร
- พบแพทย์ตามนัดอย่างสม่ำเสมอ เพื่อติดตามผลการรักษาหรืออันตรายจากยา
- ผู้หญิงที่กำลังกินยานี้ไม่แนะนำให้ให้นมลูก
- ผู้หญิงควรหลีกเลี่ยงการตั้งครรภ์ในระหว่างกินยานี้
- ระมัดระวังการขับชี่ยานยนต์ หรือทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักรกล หรืองานที่เสี่ยงต่อการพลัดตกจากที่สูง

5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา

5.1 อาการที่ต้องหยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที

- ลมพิษ บวมที่ใบหน้า เปลือกตา ริมฝีปาก
- หน้ามืด เป็นลม แน่นหน้าอก หายใจลำบาก
- ผื่นแดง ตุ่มพอง ผิวหนังหลุดลอก มีจุดตามผิวหนังหรือเลือดออกผิดปกติ
- บัสสาวะหรืออุจจาระเป็นเลือด
- ไข้สูง หายใจสั้น หายใจลำบาก รู้สึกเหนื่อยล้า ผิวซีด หรือหัวใจเต้นเร็ว
- จ้ำเลือด หรือเลือดออกเป็นระยะเวลาานานกว่าปกติ

“ให้หยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที”

5.2 อาการที่ไม่จำเป็นต้องหยุดยา แต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์

- ปวดกล้ามเนื้อ ปวดตามข้อ
- รู้สึกไม่สบายท้อง คลื่นไส้ อาเจียน ปวดท้อง ท้องผูก (อุจจาระไม่บ่อยหรืออุจจาระยาก) ท้องเสีย (อุจจาระบ่อยหรือถ่ายเหลว)
- ปวดหัว รู้สึกกดแน่นที่ตา จมูก หรือบริเวณแก้ม
- เจ็บคอและมีน้ำมูก
- ปวดหรือรู้สึกแสบเวลาบัสสาวะ

“ไม่จำเป็นต้องหยุดยา แต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์”

6. ควรเก็บยานี้อย่างไร

- แกะยาออกจากแผง เมื่อจะกินในแต่ละครั้งเท่านั้น
- เก็บไว้ในบรรจุภัณฑ์เดิมตามที่ได้รับมา

- เก็บยาในที่แห้ง อย่าให้โดนแสงโดยตรง โดยทั่วไปควรเก็บที่ อุณหภูมิต่ำกว่า 30 องศาเซลเซียส ไม่เก็บยาในที่ร้อนหรือชื้น เช่น ในรถ ห้องน้ำ ห้องครัว
- เก็บยาให้พ้นมือเด็ก

7. ลักษณะและส่วนประกอบของยานี้

- ลักษณะยา** ยาแคปซูล ฝาคapsule สีน้ำเงิน ตัวแคปซูลสีเหลือง พิมพ์ตัวอักษร “ACA 100mg” สีดำ ภายในบรรจุผงยาสีขาวหรือเหลือง
- ตัวยาสําคัญ** อะคาลาบรูทีนิบ 100 มิลลิกรัม
- ส่วนประกอบอื่นๆ** ได้แก่ Silicified microcrystalline cellulose (ซิลิซิไฟด์ไมโครคริสตัลไลน์เซลลูโลส) Partially pregelatinized starch (พาร์เซี่ยลสตีพีริเจลาติไนซ์สตรัช) Sodium starch glycolate, Type A (โซเดียมสตรัชไกลโคเลทไทป์เอ) Magnesium stearate (แมกนีเซียมสเตียเรท)
- ส่วนประกอบของเปลือกแคปซูล ได้แก่ Gelatin (เจลาติน) Iron oxide, yellow (ไอรอนออกไซด์เยลโลว) Indigotine – FD&C Blue 2 (อินดิโกทีนเอฟดีแอนด์ซีบลูทู) Titanium dioxide (ไทเทเนียมไดออกไซด์) และ Imprinting ink (หมึกพิมพ์)

ผู้ผลิต: AstraZeneca AB, Gärtnavägen, Södertälje SE-151 85, Sweden

ผู้นำเข้า: บริษัท แอสตราเซนเนกา (ประเทศไทย) จำกัด กรุงเทพมหานคร

ผู้แทนจำหน่าย: บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด กรุงเทพมหานคร

เอกสารนี้ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 11 มิถุนายน 2564

ศึกษาข้อมูลยาเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ของ อย.

- <http://www.fda.moph.go.th/sites/oss/Pages/Main.aspx>
- <http://ndi.fda.moph.go.th/>

เอกสารนี้เป็นข้อมูลโดยย่อ
หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร

คำเตือน:

ยานี้อาจทำให้เกิดอันตรายร้ายแรงได้ ต้องใช้ภายใต้การควบคุมของแพทย์เท่านั้น