

พรีกาบาลินชนิดแคปซูล ความแรง 25, 50, 75, 150 มิลลิกรัม

1. ยานี้คืออะไร

1.1 ยานี้มีชื่อว่าอะไร

- ยานี้มีชื่อว่าพรีกาบาลิน (pregabalin) เป็นยาในกลุ่มที่มีโครงสร้างคล้ายสารสื่อประสาทในสมอง มีชื่อการค้า Pregabalin Teva 25 (พรีกาบาลิน เทวา 25) Pregabalin Teva 50 (พรีกาบาลิน เทวา 50) Pregabalin Teva 75 (พรีกาบาลิน เทวา 75) และ Pregabalin Teva 150 (พรีกาบาลิน เทวา 150)

1.2 ยานี้ใช้เพื่ออะไร

ยานี้ใช้เพื่อรักษาอาการปวดที่เกิดจากความผิดปกติของเส้นประสาท โรคลมชัก โรควิตกกังวลทั่วไป กลุ่มอาการปวดกล้ามเนื้อและเส้นเอ็น

2. ข้อควรระวังก่อนใช้ยา

2.1 ห้ามใช้ยานี้เมื่อไร

- เคยแพ้ยานี้หรือส่วนประกอบของยานี้

2.2 ข้อควรระวังเมื่อใช้ยานี้

- ให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร หากท่านเป็นโรคหัวใจล้มเหลว หรือมีประวัติเป็นโรคหัวใจ
- ปรึกษาแพทย์ ถ้ากำลังตั้งท้องหรือให้นมลูก
- ยานี้อาจเสริมฤทธิ์ของแอลกอฮอล์ และ ยาลดแรงซีแพม ดังนั้นจึงไม่ควรใช้ยานี้ร่วมกัน ไม่ควรกินยานี้ร่วมกับยาออกซีโคโดน เพราะอาจทำให้เกิดอันตรายจากการใช้ยาได้

3. วิธีใช้ยา

3.1 ขนาดและวิธีใช้

- ควรใช้ยาตามคำแนะนำของแพทย์หรือเภสัชกรเท่านั้น เพราะขนาดและระยะเวลาในการใช้ยานี้ขึ้นกับชนิดและความรุนแรงของโรค
- แพทย์อาจให้กินยานี้วันละ 2 หรือ 3 ครั้ง และควรกินยาในเวลาเดียวกันในแต่ละวัน
- กินยานี้ก่อนอาหารหรือกินหลังอาหารก็ได้

3.2 หากลืมกินยา ควรทำอย่างไร

- ให้กินยาทันทีที่นึกได้ แต่ถ้าใกล้เวลาของมื้อต่อไป ให้รอกินยาของมื้อต่อไป และห้ามกินยาเพิ่มเป็น 2 เท่า

3.3 ถ้ากินยานี้เกินขนาดที่แนะนำ ควรทำอย่างไร

- หากมีอาการผิดปกติที่รุนแรง เช่น ง่วงซึม มึนงง กระสับกระส่าย และกระวนกระวาย เป็นต้น ให้รีบนำส่งโรงพยาบาลทันที และนำกล่องยาดิติดตัวไปด้วย

4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างใช้ยา

- หลีกเลี่ยงเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์
- ระมัดระวังการขับชี่ยานยนต์ หรือทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักรกลหรือทำกิจกรรมที่เสี่ยงต่อการผลัดตกจากที่สูงเพราะยานี้อาจทำให้มึนงงหรือง่วงนอนได้
- ผู้ป่วยบางรายที่เป็นเบาหวาน อาจมีน้ำหนักขึ้นระหว่างใช้ยานี้ แนะนำให้พบแพทย์เพื่อปรับขนาดยาเบาหวาน
- ผู้สูงอายุต้องระวังอุบัติเหตุเพราะยานี้อาจทำให้มึนงงหรือง่วงนอนได้
- อย่าหยุดยาเอง เพราะการเลิกกินยากะทันหัน อาจทำให้เกิดอาการชักได้

5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา

5.1 อาการที่ต้องหยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที

- ลมพิษ บวมที่ใบหน้า เปลือกตา ริมฝีปาก
 - หน้ามืด เป็นลม แน่นหน้าอก หายใจลำบาก
 - ผื่นแดง ตุ่มพอง ผิวหนังหลุดลอก มีจ้ำตามผิวหนังหรือเลือดออกผิปกติ
 - สายตามัวชั่วคราว เห็นภาพซ้อน
 - มีความคิดฆ่าตัวตาย
 - เจ็บคอ มีไข้ มีอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่
 - หัวใจเต้นผิดปกติ
 - เลือดออกง่าย มีจ้ำเลือด เลือดไหลแล้วหยุดยาก
- "ให้หยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที"**

5.2 อาการที่ไม่จำเป็นต้องหยุดยา แต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์ทันที

- ปวดหัว มึนงง ง่วงนอนผิดปกติ
- เดินเซ พูดไม่ชัด หลงๆลืมๆ
- ปากแห้ง คลื่นไส้ อาเจียน ไม่สบายท้อง ท้องผูก
- บวมตามแขนขา
- อยากอาหาร และน้ำหนักเพิ่ม

"ไม่จำเป็นต้องหยุดยา แต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์"

6. ควรเก็บยาอย่างไร

- เก็บยาไว้ในภาชนะบรรจุเดิมตามที่ได้รับมา
- เก็บยาในที่แห้ง อย่าให้โดนแสงโดยตรง โดยทั่วไปควรเก็บที่อุณหภูมิต่ำกว่า 30 องศาเซลเซียส ไม่เก็บยาในที่ร้อนหรือชื้น เช่น ในรถ ห้องน้ำ ห้องครัว
- ควรแกะยาเมื่อกินในแต่ละครั้งเท่านั้น ห้ามแกะยาออกจากแผงก่อน เพราะยาอาจเสียได้
- เก็บยาให้พ้นมือเด็ก

7. ลักษณะและส่วนประกอบของยานี้

ยานี้มีตัวยาพริกาบาลิน มี 4 ความแรง ดังนี้

ขนาด 25 มิลลิกรัม เป็นแคปซูลสีขาวนวลขุ่น

พิมพ์เลข 25 สีดำ

ขนาด 50 มิลลิกรัม เป็นแคปซูลสีขาวนวลขุ่น

พิมพ์เลข 50 สีดำ รอบแคปซูลมีเส้นวงแหวนสีดำ

- ขนาด 75 มิลลิกรัม เป็นแคปซูลสีขาวนวล-ชมพู
พิมพ์เลข 75 สีดำ
- ขนาด 150 มิลลิกรัม เป็นแคปซูลสีขาวนวลขุ่น
พิมพ์เลข 150 สีดำ

ส่วนประกอบในตำรับ: แมนนิทอล, พรีเจลาติไนซ์เมซสตาร์ช, ทัลก์, ไททาเนียมไดออกไซด์, เจลาติน, ไอรอนออกไซด์ สีเหลือง, เซลแล็ก, โพรพิลีนไกลคอล, ไอรอนออกไซด์ สีดำ, โปแทสเซียม ไฮดรอกไซด์, ไอรอนออกไซด์ สีแดง (เฉพาะพริกาบาลิน ขนาด 75 มิลลิกรัม)

ผู้ผลิต: PLIVA Croatia Ltd.

Prilaz baruna Filipovića 25, Zagreb, Republic of Croatia

ผู้นำเข้า: บริษัท สීමการแพทย์ จำกัด

กรุงเทพฯ ประเทศไทย

เอกสารนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ: 7 พฤศจิกายน 2562

เอกสารนี้เป็นข้อมูลโดยย่อ
หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร