

เดอรัวาลูแมบ

ความแรง 50 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร

ชนิดฉีด

ชื่อการค้า **IMFINZI (อิมฟินซี)**

1. ยานี้คืออะไร

1.1 ยานี้มีชื่อว่าอะไร

ยานี้มีชื่อว่าเดอรัวาลูแมบ (durvalumab) มีตัวยา 50 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร เป็นยาต้านมะเร็งในกลุ่มภูมิคุ้มกันบำบัด

1.2 ยานี้ใช้เพื่ออะไร

ยานี้ใช้เพื่อรักษาโรคมะเร็งปอดที่แพทย์ตรวจแล้วว่าคุณต้องใชยานี้

การใชยานี้อาจจะทำให้เกิดอันตรายรุนแรงได้จึงต้องสั่งจ่ายโดยแพทย์เท่านั้น

2. ข้อควรระวังก่อนใชยา

2.1 ห้ามใชยานี้เมื่อไร

- เมื่อเคยแพ้ยานี้ หรือส่วนประกอบของยานี้

2.2 ข้อควรระวังเมื่อใชยานี้

- ให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร ในกรณีต่อไปนี้
 - โรคภูมิแพ้ต่อตนเอง เช่น โรคเอสแอลอี
 - โรคลำไส้ใหญ่อักเสบเป็นแผลเรื้อรัง
 - เคยได้รับการปลูกถ่ายอวัยวะ
 - มีความผิดปกติของปอดหรือการหายใจ
 - มีความผิดปกติของตับ
 - หญิงตั้งท้องให้หลีกเลี่ยงการใชยานี้เพราะอาจมีอันตรายต่อทารกในครรภ์ได้ แต่แพทย์อาจพิจารณาการสั่งใชยานี้ หากมีเหตุผลทางการแพทย์
 - หญิงให้นมลูกควรหลีกเลี่ยงการใชยานี้
 - ไม่ควรใชยานี้ร่วมกับยา อาหาร สมุนไพร หรือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบางชนิด เพราะอาจมีผล

ต่อการรักษาหรือเกิดอันตรายได้ เช่น ยากลุ่มสเตียรอยด์ และยากลุ่มกดภูมิคุ้มกัน

3. วิธีใชยา

3.1 ขนาดและวิธีใช้

- ควรใชยาตามคำแนะนำของแพทย์หรือเภสัชกรเท่านั้น เพราะขนาดและระยะเวลาในการใชยานี้ขึ้นกับชนิดและความรุนแรงของโรค
- ยานี้ต้องให้โดยแพทย์, พยาบาล หรือบุคลากรทางการแพทย์

3.2 หากลืมฉีดยาควรทำอย่างไร

- ควรรีบติดต่อแพทย์หรือโรงพยาบาลให้เร็วที่สุด

4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างใชยา

- พบแพทย์ตามนัดอย่างสม่ำเสมอ เพื่อติดตามผลการรักษาหรืออันตรายที่อาจเกิดจากยา
- หลีกเลี่ยงการตั้งครรภ์ ผู้หญิงควรคุมกำเนิดในระหว่างที่ได้รับยานี้ และคุมกำเนิดต่อเนื่องอย่างน้อย 3 เดือนหลังจากได้รับยาค้างสุดท้าย
- ระมัดระวังการขับขี่ยานยนต์ หรือทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักรกล หรือทำงานที่เสี่ยงต่อการผลัดตกจากที่สูง

5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา

5.1 หากใชยาแล้วเกิดอาการ เช่น

- บวมที่ใบหน้า เปลือกตา ริมฝีปาก ลมพิษ
- หน้ามืด เป็นลม แน่นหน้าอก หายใจลำบาก
- ผื่นแดง ตุ่มพอง ผิวหนังหลุดลอก มีฝ้าตามผิวหนังหรือเลือดออกผิบบก
- หายใจสั้น แน่นหน้าอก มีอาการไอ หรือไอรุนแรงขึ้น
- คลื่นไส้หรืออาเจียนรุนแรง ตัวเหลือง หรือตาซีด ปวดท้องด้านขวา ปัสสาวะเป็นสีเข้ม เกิดจ้ำเลือดหรือเลือดออกง่าย ช้ำ
- ท้องเสีย อุจจาระดำ เป็นมูกหรือมีเลือดปน ปวดท้องหรือแน่นท้องรุนแรง

- เป็นลม รู้สึกหนาว อ่อนเพลียรุนแรง หัวใจเต้นเร็ว รู้สึกหิวหรือคอแห้งมากกว่าปกติ น้ำหนักขึ้นหรือน้ำหนักลง ผม่วง
- ปัสสาวะน้อยลง มีเลือดในปัสสาวะ บวมที่ข้อเท้า เบื่ออาหาร ไข้ ปัสสาวะบ่อย แสบเวลาปัสสาวะ หรือมีอาการคล้ายไข้หวัด

"ต้องแจ้งแพทย์หรือพยาบาลทันที"

5.2 หากใชยาแล้วเกิดอาการ เช่น

- ปวดหัว เวียนหัว อ่อนเพลีย ปวดกล้ามเนื้อ ท้องผูก คลื่นไส้ มีอาการไอ

"ให้รอดอาการ แต่ถ้ามีอาการรุนแรงหรือทนไม่ได้ ให้ไปพบแพทย์"

6. ควรเก็บยาได้อย่างไร

- เก็บยาไว้ในภาชนะบรรจุเดิมที่ได้รับมา
- เก็บยาในที่แห้ง อย่าให้โดนแสงโดยตรง เก็บยาในตู้เย็น (อุณหภูมิ 2-8 องศาเซลเซียส) ห้ามแช่แข็ง
- หลังจากผสมยาแล้ว หากไม่ใช้ทันทีสามารถเก็บในตู้เย็นได้ไม่เกิน 24 ชั่วโมง และเก็บที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียสได้ไม่เกิน 4 ชั่วโมง
- ห้ามเขย่าขวดยา
- ห้ามใชยาหากพบว่ายาขุ่น สีเปลี่ยนไป หรือมีฝุ่นผง
- เก็บยาให้พ้นมือเด็ก
- ยานี้เก็บไว้ที่โรงพยาบาล ท่านจะไม่ได้รับกลับบ้าน

7. ลักษณะและส่วนประกอบของยานี้

ยามีลักษณะเป็นของเหลวใส ไม่มีสีถึงสีเหลืองอ่อน ปราศจากอนุภาคที่มองเห็นได้

ส่วนประกอบ

แต่ละ 1 มิลลิลิตรของยา ประกอบด้วยตัวยาเดอรัวาลูแมบ 50 มิลลิกรัม

ส่วนประกอบอื่นๆ ได้แก่

ฮิสติดีน; ฮิสติดีน ไฮโดรคลอไรด์ โมโนไฮเดรต; ทรีฮาโลส ไดไฮเดรต; โพลีซอร์เบต 80; น้ำสำหรับยาฉีด

ผู้ผลิตและบรรจุ: Catalent Indiana, LLC., Indiana,
USA

ผู้นำเข้า: บริษัท แอสตราเซนเนกา (ประเทศไทย)
จำกัด กรุงเทพมหานคร

ผู้แทนจำหน่าย: บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
จำกัด กรุงเทพมหานคร |

เอกสารนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ 23 สิงหาคม 2561 |

เอกสารนี้เป็นข้อมูลโดยย่อ
หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร