

แอซาไซทิดีน ความแรง 100 มิลลิกรัมต่อขวด ชนิดผงแห้งสำหรับฉีด ชื่อการค้า Andason (แอนดาซัน)

1. ยานี้คืออะไร

1.1 ยานี้มีชื่อว่าอะไร

- ยานี้มีชื่อว่า แอซาไซทิดีน (azaticidine) เป็นยาในกลุ่มเคมีบำบัด

1.2 ยานี้ใช้เพื่ออะไร

ยานี้ใช้รักษาโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวเรื้อรังชนิดมัยอีโลโมโนไซติก และโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวเฉียบพลันชนิดมัยอีลอยด์ในผู้ป่วยที่แพทย์พิจารณาแล้วเห็นว่าเหมาะสมที่จะใช้ยานี้

2. ข้อควรระวังก่อนใช้ยา

2.1 ห้ามใช้ยานี้เมื่อไร

- ⊗ เคยแพ้ยานี้ หรือส่วนประกอบของยานี้
- ⊗ เป็นมะเร็งตับระยะลุกลาม
- ⊗ กำลังให้นมลูก

2.2 ข้อควรระวังเมื่อใช้ยานี้

- ให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร ในกรณีต่อไปนี้
 - มีอาการเลือดออกง่าย หรือมีจ้ำเลือด
 - เป็นโรคไต หรือโรคตับ
 - มีประวัติโรคหัวใจหรือโรคปอด
 - เด็กที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี
 - กำลังตั้งท้อง หรือวางแผนที่จะตั้งท้อง
 - มีการใช้ยาอื่นร่วมด้วย

3. วิธีใช้ยา

3.1 ขนาดและวิธีใช้

- ควรใช้ยาตามคำแนะนำของแพทย์หรือเภสัชกรเท่านั้น เพราะขนาดและระยะเวลาในการใช้ยานี้ ขึ้นกับชนิดและความรุนแรงของโรค
- แพทย์หรือพยาบาลจะเป็นผู้ฉีดยานี้ให้กับคุณ โดยฉีดเข้าใต้หนัง

3.2 หากลืมฉีดยาควรทำอย่างไร

- หากลืมมารับยาหรือสงสัยว่าไม่ได้รับยาตามเวลาปกติ ให้แจ้งแพทย์ พยาบาล หรือเภสัชกรทันที

3.3 ถ้าฉีดยานี้เกินขนาดที่แนะนำ ควรทำอย่างไร

- หากสงสัยว่าได้รับยาเกินขนาด ให้สังเกตอาการอย่างใกล้ชิด หากมีอาการผิดปกติที่รุนแรง เช่น ท้องเสีย คลื่นไส้ อาเจียน ให้แจ้งแพทย์ พยาบาล หรือเภสัชกรทันที

4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างใช้ยา

- พบแพทย์ตามนัดอย่างสม่ำเสมอ เพื่อติดตามผลการรักษาหรืออันตรายจากยา
- คุมกำเนิดระหว่างการรักษาด้วยยานี้และหลังจากหยุดใช้ยานี้ไปแล้ว 3 เดือน
- หลีกเลี่ยงการขับรถ การทำงานกับเครื่องจักร หรือการทำงานที่เสี่ยงจากการพลัดตกจากที่สูง เพราะยานี้อาจทำให้เกิดความเหนื่อยง่าย

5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา

5.1 อาการที่ต้องแจ้งแพทย์ พยาบาล หรือเภสัชกรทันที

- ลมพิษ บวมที่ใบหน้า เปลือกตาริมฝีปาก
- หน้ามืด เป็นลม แน่นหน้าอก หายใจลำบาก
- ผื่นแดง ตุ่มพอง ผื่นหนังหลุดลอก มีจ้ำตามผิวหนังหรือเลือดออกผิดปกติ
- ง่วงนอนมากผิดปกติ สิ้น ตัวเหลืองตาเหลือง ท้องบวม และขำง่าย
- บวมที่ขาและเท้า ปวดหลัง ปัสสาวะน้อยลง กระจายหน้า หัวใจเต้นเร็ว เวียนหัว คลื่นไส้ อาเจียน ความอยากอาหารลดลง และรู้สึกสับสน กระสับกระส่ายหรืออ่อนเพลีย
- มีไข้ เจ็บหน้าอกหรือหายใจ
- อุจจาระมีเลือดปน

“หากมีอาการเหล่านี้
ให้แจ้งแพทย์ พยาบาล หรือเภสัชกรทันที”

5.2 อาการที่อาจเกิดได้และให้รอดูอาการ แต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้แจ้งแพทย์หรือพยาบาล

- ถลอก ปวด หรือมีก้อนแข็งบริเวณที่ฉีด
- มีจุดเลือดที่ผิวหนัง คัน
- ปวดข้อ
- ปวดหัว นอนไม่หลับ
- เป็นหวัด

“ให้รอดูอาการ แต่ถ้ามีอาการรุนแรง
ให้แจ้งแพทย์ พยาบาล หรือเภสัชกร”

6. ควรเก็บยานี้อย่างไร

- ยานี้เก็บไว้ที่โรงพยาบาล ท่านจะไม่สามารถกลับบ้าน

7. ลักษณะและส่วนประกอบของยานี้

- ลักษณะยา เป็นยาผงแข็งปราศจากเชื้อบรรจุในขวดแก้วใสขนาด 20 มิลลิลิตร
- ตัวอย่างสำคัญ แอซาไซทิดีน 100 มิลลิกรัมต่อขวด
- ส่วนประกอบอื่น ๆ ได้แก่ แมนนิทอล ผู้ผลิต บริษัท นานกวง ฟาร์มาซูติคอล จำกัด ประเทศไทย ได้ทุกวัน ผู้นำเข้า บริษัท ซิมเจนส์ จำกัด กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย ผู้แทนจำหน่าย บริษัท ซิมเจนส์ จำกัด กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย เอกสารนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ 20 กรกฎาคม 2563

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ของ อย.

- <http://www.fda.moph.go.th/sites/oss/Pages/Main.aspx>
- <http://ndi.fda.moph.go.th/>

เอกสารนี้เป็นข้อมูลโดยย่อ
หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร