

**เจฟิทีนิป**  
**ความแรง 250 มิลลิกรัม**  
**ชนิดเม็ด**  
**ชื่อการค้า GEFIMAX (เจฟิแมกซ์)**

**1. ยานี้คืออะไร**

- 1.1 ยานี้มีชื่อว่าอะไร**
- ยานี้มีชื่อว่าเจฟิทีนิป มีตัวยา 250 มิลลิกรัม เป็นยาในกลุ่มยารักษาโรคเมเร็ง
- 1.2 ยานี้ใช้เพื่ออะไร**
- ยานี้ใช้รักษาโรคเมเร็งปอดในผู้ใหญ่ที่แพทย์ตรวจแล้วว่าจำเป็นต้องใช้ยานี้

**2. ข้อควรระวังก่อนใช้ยา**

- 2.1 ห้ามใช้ยานี้เมื่อไร**
- ⊗ เคยแพ้ยานี้ หรือส่วนประกอบอื่นในยานี้
  - ⊗ ห้ามใช้ในหญิงตั้งครรภ์หรือกำลังวางแผนตั้งครรภ์
  - ⊗ ห้ามใช้ในหญิงให้นมบุตร
- 2.2 ข้อควรระวังเมื่อใช้ยานี้**
- ให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร ในกรณีต่อไปนี้
    - มีอายุน้อยกว่า 18 ปี
    - มีประวัติโรคปอดหรือโรคตับ
    - แจ้งแพทย์ว่ากำลังใช้ยาใดบ้าง

**3. วิธีใช้ยา**

- 3.1 ขนาดและวิธีใช้**
- ควรใช้ยาตามคำแนะนำของแพทย์หรือเภสัชกรเท่านั้น เพราะขนาดและระยะเวลาในการใช้ยานี้ขึ้นกับชนิดและความรุนแรงของโรค
  - ควรกินยาให้ตรงเวลา กินตามขนาดยาและคำแนะนำของแพทย์ หรือเภสัชกรอย่างเคร่งครัด
  - กินยานี้พร้อมอาหาร หรือตอนท้องว่างก็ได้
  - ห้ามกินยาลดกรดภายใน 2 ชั่วโมงก่อนกินยานี้ หรือภายใน 1 ชั่วโมงหลังจากกินยานี้
- 3.2 หากลืมกินยาควรทำอย่างไร**
- ถ้าลืมกินยาน้อยกว่า 12 ชั่วโมง ให้กินยาทันทีที่นึกได้ แล้วกินเม็ดต่อไปตามปกติ

- ถ้าลืมกินยามากกว่า 12 ชั่วโมง ให้รอกินยาของมือถัดไป และห้ามกินยาเพิ่มเป็น 2 เท่า
- 3.3 ถ้ากินยานี้เกินขนาดที่แนะนำ ควรทำอย่างไร**
- แจ้งแพทย์หรือเภสัชกรทันที

**4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างใช้ยา**

- พบแพทย์ตามนัดอย่างสม่ำเสมอ ทั้งนี้เพื่อติดตามผลการรักษา หรืออันตรายจากยา
- ไม่ควรบริจาดเลือดระหว่างกินยานี้ และ 1 เดือนหลังจากหยุดกินยานี้
- ผู้หญิงที่กินยานี้ ต้องคุมกำเนิดไม่ให้ตั้งครรภ์ และหากประจำเดือนขาด ต้องรีบปรึกษาแพทย์
- หากกินยานี้แล้วเวียนศีรษะ วิงเวียน ควรหลีกเลี่ยงการขับรถหรือใช้เครื่องจักรกล

**5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา**

- 5.1 อาการที่ต้องหยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที**
- ลมพิษ บวมที่ใบหน้า เปลือกตาริมฝีปาก
  - หน้ามืด เป็นลม แน่นหน้าอก หายใจลำบาก
  - ผื่นแดง ตุ่มพอง ผิวหนังหลุดลอก มีฝ้าตามผิวหนังหรือเลือดออกผิวดิบ
  - ท้องเสียรุนแรง
  - ปวดตา ตาแดง ตาแฉะ แพ้แสง มองเห็นไม่ชัด

“ให้หยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที”

- 5.2 อาการที่ไม่จำเป็นต้องหยุดยา แต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์**
- ผิวแห้ง ปากแห้ง คอแห้ง
  - ท้องเสีย คลื่นไส้ อาเจียน มีไข้
  - เบื่ออาหาร อ่อนเพลีย ผอมลง
  - ตาแห้ง หรือคันตา

“ไม่จำเป็นต้องหยุดยา แต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์”

**6. ควรเก็บยานี้อย่างไร**

- เก็บไว้ในบรรจุภัณฑ์เดิมตามที่ได้รับมา
- เก็บยาในที่แห้ง อบอุ่นโดยตรง โดยทั่วไปควรเก็บที่อุณหภูมิไม่เกิน 30 องศาเซลเซียส ไม่เก็บยาในที่ร้อนหรือชื้น เช่น ในรถ ห้องน้ำ ห้องครัว

- ควรแกะยาเมื่อกินในแต่ละครั้งเท่านั้น ห้ามแกะยาออกจากแผงก่อน เพราะยาอาจเสียได้
- เก็บยาให้พ้นมือเด็ก

**7. ลักษณะและส่วนประกอบของยานี้**

- ลักษณะยา เป็นยาเม็ดเคลือบฟิล์มสีน้ำตาลรูปกลมมนทั้ง 2 ด้าน ด้านหนึ่งมีตัวอักษร 250 อีกด้านหนึ่งเรียบ
- ตัวยาสัญญา เจฟิทีนิป 250 มิลลิกรัม
  - ส่วนประกอบอื่นๆ ได้แก่ แลคโตสโมโนไฮเดรท, เซลลูโลส ไมโครคริสตัลไลน์, โครสคาเมลโลส โซเดียม, โพรโตน, แมกนีเซียมสเตียเรท, โซเดียม ลอริลซัลเฟต สารเคลือบ ได้แก่ โพลีไวนิลแอลกอฮอล์, แมคโครกอล, ทัลค, ไททาเนียมไดออกไซด์, สารปรุงแต่งสี สีแดงและสีเหลือง, น้ำ

ผู้ผลิต : Remedica Ltd. Aharon Street, Limassol Industrial Estate, 3056, Limassol, Cyprus  
ผู้นำเข้า/ผู้แทนจำหน่าย : บริษัท อินเตอร์ฟาร์มาแคร์ จำกัด กรุงเทพฯ

เอกสารนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ มกราคม 2565  
ศึกษาข้อมูลยาเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ของ อย.  
▪ <http://www.fda.moph.go.th/sites/oss/Pages/Main.aspx>  
▪ <http://ndi.fda.moph.go.th/>

คำเตือน ยานี้อาจทำให้เกิดอันตรายร้ายแรงได้ ต้องใช้ภายใต้การควบคุมของแพทย์เท่านั้น

เอกสารนี้เป็นข้อมูลโดยย่อ หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร