

เซฟแทสซิดิม และ อารีแบคแทม ชนิดผงสำหรับฉีด ชื่อการค้า Zavicefta™ (ซารีเซฟตา™)

1. ยานี้คืออะไร

1.1 ยานี้มีชื่อว่าอะไร

- ยานี้มีตัวยา 2 ชนิด คือ เซฟแทสซิดิม และ อารีแบคแทม (ceftazidime/avibactam) เป็นยาปฏิชีวนะในกลุ่มเซฟาโลสปอรินที่มีตัวยายังมีเบต้าแลคแทมเมส

1.2 ยานี้ใช้เพื่ออะไร

- ใช้รักษาโรคติดเชื้อบางชนิดในผู้ใหญ่และเด็กอายุตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป ได้แก่
 - ติดเชื้อในช่องท้อง
 - ติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะ
 - ปอดอักเสบจากการติดเชื้อในโรงพยาบาลหรือปอดอักเสบที่เกี่ยวข้องกับเครื่องช่วยหายใจ
 - โรคติดเชื้อบางชนิด ที่แพทย์วินิจฉัยแล้วว่าต้องใช้ยานี้ในการรักษา
- ใช้รักษาโรคติดเชื้อในกระแสเลือดที่พบร่วมกับการติดเชื้อในช่องท้อง ทางเดินปัสสาวะและปอดอักเสบจากการติดเชื้อในผู้ใหญ่

2. ข้อควรระวังก่อนใช้ยา

2.1 ห้ามใช้ยานี้เมื่อไร

- X** เคยแพ้ยานี้ หรือส่วนประกอบของยานี้
- X** เคยมีประวัติแพ้ยาในกลุ่มเซฟาโลสปอริน
- X** เคยมีประวัติแพ้ยารุนแรงกับยาในกลุ่มยาเพนิซิลินหรือคาร์บาเพเนม

2.2 ข้อควรระวังเมื่อใช้ยานี้

- แจ้งแพทย์ถ้าเป็นโรคไต
- แจ้งแพทย์ถ้ากำลังตั้งท้องหรือให้นมลูก หรือวางแผนที่จะมีลูก
- แจ้งแพทย์ถ้าผู้ป่วยอายุน้อยกว่า 3 เดือน
- แจ้งแพทย์หรือพยาบาล ถ้าเคยใช้ยานี้แล้วท้องเสีย
- แจ้งแพทย์ถ้าสงสัยว่าติดเชื้อราในช่องปาก หรืออวัยวะเพศ
- แจ้งแพทย์ถ้ากำลังใช้ยาต้านแบคทีเรียบางชนิด ยาขับปัสสาวะบางชนิด ยารักษาโรคเกาต์บางชนิด

3. วิธีใช้ยา

3.1 ขนาดและวิธีใช้

- ควรใช้ยาตามคำแนะนำของแพทย์หรือเภสัชกรเท่านั้น เพราะขนาดและระยะเวลาในการใช้ยานี้ขึ้นกับชนิดและความรุนแรงของโรค
- แพทย์หรือพยาบาลจะเป็นผู้ฉีดยาให้กับท่าน โดยหยดเข้าหลอดเลือดดำ

3.2 ถ้าลืมฉีดยาควรทำอย่างไร

- หากสงสัยว่าท่านไม่ได้รับยาตามปกติ ให้แจ้งแพทย์ พยาบาล หรือเภสัชกรทันที

3.3 ถ้าหากได้รับยาเกินขนาดควรทำอย่างไร

- หากสงสัยว่าได้รับยาเกินขนาด ให้แจ้งแพทย์ พยาบาล หรือเภสัชกรทันที

4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างการให้

- ยานี้อาจทำให้คุณรู้สึกมึนงง
- ยานี้มีส่วนประกอบของเกลือโซเดียม แจ้งแพทย์หากคุณต้องควบคุมอาหารที่มีเกลือโซเดียม

5. อันตรายจากยา

5.1 อาการที่ต้องแจ้งแพทย์ พยาบาล หรือเภสัชกรทันที

- ลมพิษ บวมที่ใบหน้า เปลือกตาริมฝีปาก
- หน้ามืด เป็นลม แน่นหน้าอก หายใจลำบาก
- ผื่นแดง ตุ่มพอง ผิวหนังหลุดลอก มีจุดตามผิวหนังหรือเลือดออกผิดปกติ
- รู้สึกเหนื่อย ตัวเหลือง ตาเหลือง
- บวมหน้า
- มีไข้สูง ปวดตามข้อ
- ท้องเสียมีเลือดในอุจจาระ

“ให้แจ้งแพทย์ พยาบาล หรือเภสัชกรทันที”

5.2 อาการที่อาจเกิด เมื่อใช้ยา

- ปวด บวม หรือแดงที่บริเวณที่ฉีดยา
- คลื่นไส้ อาเจียน ปวดท้อง
- รู้สึกถึงรสชาติไม่ดีในปาก
- ปวดศีรษะ มึนงง
- คัน เหน็บชา

“ให้รอดูอาการ แต่ถ้ามีอาการรุนแรง ให้แจ้งแพทย์ พยาบาล หรือเภสัชกร”

6. ควรเก็บยานี้อย่างไร

- ยานี้เก็บที่อุณหภูมิไม่เกิน 30 องศาเซลเซียส
- ยานี้เก็บไว้ที่โรงพยาบาล ท่านจะไม่ได้รับกลับบ้าน

7. ลักษณะและส่วนประกอบของยานี้

- ลักษณะยา ขวดแก้วบรรจุผงยาสีขาวถึงขาวออกเหลือง
- ตัวยาสําคัญ ได้แก่
 - เซฟแทสซิดิม 2 กรัม และ
 - อารีแบคแทม 0.5 กรัม
- ส่วนประกอบอื่นๆ ยาแต่ละขวดมีโซเดียมคาร์บอเนตประมาณ 233 มิลลิกรัม

ผู้นำเข้า บ. ไฟเซอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

เอกสารนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ 27 สิงหาคม 2564

PIL Revision no: 3.0
PIL date: August 27, 2021
Country: Thailand

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ของ อย.

- <http://www.fda.moph.go.th/sites/oss/Pages/Main.aspx>
- <http://ndi.fda.moph.go.th/>

**ข้อมูลยานี้เป็นข้อมูลโดยย่อ
หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร**