

พาโซพานิบ
ความแรง 200 มิลลิกรัม
ชนิดเม็ดเคลือบฟิล์ม
ชื่อการค้า Alvopanib 200 mg
(อัลโวพานิบ 200 มิลลิกรัม)

1. ยานี้คืออะไร

1.1 ยานี้มีชื่อว่าอะไร

- ยานี้มีชื่อว่า พาโซพานิบ (pazopanib)

1.2 ยานี้ใช้เพื่ออะไร

- ยานี้ใช้รักษาโรคมะเร็งไทรอยด์แพร่กระจาย มะเร็งเนื้อเยื่ออ่อนในผู้ใหญ่ ที่แพทย์ตรวจแล้วว่าจำเป็นต้องใช้ยานี้

2. ข้อควรระวังก่อนใช้ยา

2.1 ห้ามใช้ยานี้เมื่อไร

X เคยแพ้ยานี้ หรือส่วนประกอบของยานี้

2.2 ข้อควรระวังเมื่อใช้ยานี้

- **ให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร ในกรณีต่อไปนี้**
 - เป็นโรคหัวใจ เคยเป็นโรคหัวใจ
 - เป็นโรคตับ โรคไต
 - เป็นโรคไตร่อยด
 - เคยมีภาวะปอดล้มเหลว
 - เคยมีภาวะเลือดออก เส้นเลือดอุดตัน เส้นเลือดตีบ
 - เคยมีภาวะกระเพาะอาหารหรือลำไส้ทะลุ
 - มีหรือเคยมีผนังหลอดเลือดโป่งพองหรือฉีกขาด
 - มีความดันเลือดสูง
 - กำลังใช้ยาต่อไปนี้ • ยาฆ่าเชื้อแบคทีเรีย • ยารักษาโรคเอดส์ • ยารักษาโรคซึมเศร้า • ยารักษาไขมันในเลือดสูง • ยาลดกรด
 - ผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี
 - กำลังตั้งท้อง หรือให้นมลูก
- “หากมีภาวะดังกล่าว ให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร”**

3. วิธีใช้ยา

3.1 ขนาดและวิธีใช้

- **ควรใช้ยาตามคำแนะนำของแพทย์หรือเภสัชกร** เท่านั้น เพราะขนาดและระยะเวลาในการใช้ยานี้ขึ้นกับชนิดและความรุนแรงของโรค
- กินยานี้ตอนท้องว่าง โดยกินก่อนอาหาร 1 ชั่วโมงหรือหลังอาหารอย่างน้อย 2 ชั่วโมง
- กลืนยาทั้งเม็ดที่ละเม็ดพร้อมน้ำเปล่า **ห้ามบด หรือหักเม็ดยา**

3.2 หากลืมกินยาควรทำอย่างไร

- ให้กินยามื้อถัดไปตามปกติในเวลาเดิม ห้ามกินยาเพิ่มเป็นสองเท่า

3.3 ถ้ากินยานี้เกินขนาดที่แนะนำ ควรทำอย่างไร

- ให้สังเกตอาการอย่างใกล้ชิด หากมีอาการผิดปกติที่รุนแรงให้รีบนำส่งโรงพยาบาลทันที

4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างใช้ยา

- พบแพทย์ตามนัดอย่างสม่ำเสมอ เพื่อติดตามผลการรักษาหรืออันตรายจากยา
- หากมีความดันเลือดสูงขณะใช้ยานี้ ให้รีบแจ้งแพทย์
- อย่ากินเกรปฟรุตหรือน้ำเกรปฟรุตระหว่างใช้ยานี้ เพราะอาจเกิดอันตรายเพิ่มขึ้นจากยาได้
- ให้คุมกำเนิดตลอดระยะเวลาที่รักษา และต่อเนื่องอีกอย่างน้อย 2 สัปดาห์หลังจากสิ้นสุดการรักษา
- แจ้งแพทย์หรือเภสัชกร หากพบว่าตั้งครรภ์ขณะใช้ยานี้อยู่
- หลีกเลี่ยงการขับขี่ยานพาหนะหรือใช้เครื่องจักร ถ้ากินยานี้แล้วมีอาการเวียนหัว อ่อนเพลีย

คำเตือน : ยานี้ อาจทำให้เกิดอันตรายร้ายแรงได้ ต้องใช้ภายใต้การควบคุมของแพทย์เท่านั้น

5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา

5.1 อาการที่ต้องหยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที

- ลมพิษ บวมที่ใบหน้า เปลือกตา ริมฝีปาก
- หน้ามืด เป็นลม แน่นหน้าอก หายใจลำบาก
- ผื่นแดง ตุ่มพอง ผิวหนังหลุดลอก มีฝ้าตามผิวหนังหรือเลือดออกผิดปกติ
- พุดไม่ได้ การมองเห็นไม่ปกติ ชัก สับสน ความดันเลือดสูง
- เจ็บหน้าอกรุนแรง ปวดหัวรุนแรง ตาพร่า วิดกกังวลรุนแรง หายใจไม่อิ่ม เป็นลม
- หัวใจเต้นเร็ว ปวดแขน ขา คอ หรือกราม ชาบวม
- ซากครึ่งซีก หรืออ่อนแรงครึ่งซีก เวียนหัว
- อุจจาระสีดำหรือเป็นเลือด ปัสสาวะเป็นเลือด ไอหรืออาเจียนเป็นเลือด
- ปวดท้องรุนแรง คลื่นไส้ อาเจียน มีไข้ อุจจาระเป็นหนองและมีกลิ่นเหม็น
- ตัวเหลือง ตาเหลือง ปัสสาวะสีเข้ม ปวดท้องด้านขวา เมื่ออาหาร ช่าง่าย
- เจ็บแปลบที่หน้าอก หายใจเร็ว ปวดขา บวมที่แขนมือ ขา หรือเท้า
- กล้ามเนื้อกระตุกหรือเป็นตะคริว ปัสสาวะลดลง
- ไอไม่หยุด

“ให้หยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที”

5.2 อาการที่ไม่จำเป็นต้องหยุดยา แต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์

- นำหนักเพิ่มหรือเหนื่อย
- ท้องเสีย
- การรับรสเปลี่ยนไป เบื่ออาหาร น้ำหนักลด
- ปากเจ็บ
- ผมร่วง ผมบาง ผมเปลี่ยนสี

“ไม่จำเป็นต้องหยุดยา แต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์”

6. ควรเก็บยานี้อย่างไร

- เก็บไว้ในบรรจุภัณฑ์เดิมตามที่ได้รับมา
- เก็บยาในที่แห้ง อย่าให้โดนแสงโดยตรง โดยทั่วไป ควรเก็บที่อุณหภูมิไม่เกิน 30 องศาเซลเซียส ไม่เก็บยาในที่ร้อนหรือชื้น เช่น ในรถ ห้องน้ำ ห้องครัว
- เก็บยาให้พ้นมือเด็ก

7. ลักษณะและส่วนประกอบของยานี้

- **ลักษณะยา** ยาเม็ดเคลือบฟิล์ม รูปทรงแคปซูล สีชมพู ด้านหนึ่งมีรอบพิมพ์ "173" อีกด้านหนึ่งเรียบ
- **ตัวยาสำคัญ** พาโซพานิบ
- **ส่วนประกอบอื่น ๆ** ได้แก่ ไมโครคริสตัลลินเซลลูโลส โพรโปกอน-30 โซเดียมสเตาซโกไลโคเลต แมกนีเซียมสเตียเรท โอปราดรายและน้ำ

ผู้ผลิต บริษัท โลตัส ฟาร์มาซูติคอล จำกัด, ใต้หวัน
ผู้นำเข้า/ผู้แทนจำหน่าย บริษัท อัลโวเจน (ประเทศไทย) จำกัด

เอกสารนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ สิงหาคม 2565

ศึกษาข้อมูลยาเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ของ อย.

- <http://www.fda.moph.go.th/sites/oss/Pages/Main.aspx>
- <http://ndi.fda.moph.go.th/>

**เอกสารนี้เป็นข้อมูลโดยย่อ
หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร**