

ลिरากลูไทด์
ความแรง 6 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร
ชนิดสารละลายสำหรับฉีดรูปแบบปากกาฉีดยา
(แซคเซินดา®)

โปรดอ่านเอกสารกำกับยานี้โดยละเอียดก่อนที่ท่านจะเริ่มใช้ยา เนื่องจากเอกสารนี้มีข้อมูลที่สำคัญสำหรับท่าน

- เก็บรักษาเอกสารกำกับยานี้ไว้ ท่านอาจจำเป็นต้องอ่านเอกสารนี้อีกครั้ง
- หากท่านมีคำถามเพิ่มเติมใดๆ กรุณาปรึกษาแพทย์ของท่าน เภสัชกร หรือพยาบาล
- ยานี้ถูกส่งจ่ายสำหรับท่านเท่านั้น ไม่ควรให้ผู้อื่นใช้ เพราะอาจทำให้เกิดอันตรายกับผู้อื่น แม้ว่าจะมีอาการเจ็บป่วยเหมือนกับที่ท่านเป็นก็ตาม
- กรุณาปรึกษาแพทย์ของท่าน เภสัชกร หรือพยาบาล หากท่านมีอาการข้างเคียงใดๆ ซึ่งรวมถึงอาการข้างเคียงใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นแต่ไม่ได้อยู่ในเอกสารกำกับยานี้ ดูหัวข้อที่ 4

เอกสารกำกับยานี้ มีหัวข้ออะไรบ้าง

1. ยานี้คืออะไร
2. ข้อควรระวังก่อนใช้ยานี้
3. วิธีใช้ยานี้
4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างใช้ยานี้
5. อันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากยา
6. ควรเก็บยานี้อย่างไร

1. ยานี้คืออะไร

1.1 ยานี้มีชื่อสามัญว่าอะไร

ยานี้มีชื่อสามัญว่า ลिरากลูไทด์ (liraglutide) เป็นยาลดน้ำหนัก

1.2 ยานี้ใช้เพื่ออะไร

ยานี้ใช้เพื่อลดน้ำหนัก ควบคู่ไปกับการควบคุมอาหารและออกกำลังกายในผู้ใหญ่อายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป ในกรณีดังนี้

- ภาวะอ้วน ที่มีค่าดัชนีมวลกายหรือค่าบีเอ็มไอ ตั้งแต่ 30 กิโลกรัมต่อตารางเมตรขึ้นไป หรือ
- ภาวะน้ำหนักเกิน ที่มีค่าดัชนีมวลกายเท่ากับ 27 แต่ไม่ถึง 30 กิโลกรัมต่อตารางเมตร และมีปัญหาสุขภาพ เช่น เบาหวาน ความดันเลือดสูง ไชมันในเลือดสูง หรือมีปัญหาหยุดหายใจขณะนอนหลับจากการอุดกัน

2. ข้อควรระวังก่อนใช้ยา

2.1 ห้ามใช้ยานี้เมื่อไร

- เคยแพ้ยานี้ หรือส่วนประกอบของยานี้ (โปรดดูส่วนประกอบของยาที่กล่องยา)
- ห้ามใช้ยานี้หากตั้งครรภ์หรือวางแผนจะตั้งครรภ์ เนื่องจากยังไม่มีข้อมูลผลของยานี้ต่อทารกในครรภ์
- อย่าให้นมบุตรในระหว่างใช้ยานี้ เนื่องจากไม่มีข้อมูลว่ายานี้ผ่านน้ำนมไปสู่ทารกได้หรือไม่
- ท่านหรือบุคคลในครอบครัวเคยเป็นโรคมะเร็งต่อมไทรอยด์ชนิดเมตัสตา

2.2 คำเตือนและข้อควรระวังเมื่อใช้ยานี้

- หลีกเลี่ยงการใช้ยานี้ในผู้ที่มีการะตอไปนี้ หัวใจล้มเหลวรุนแรง โรคกระเพาะอาหารหรือลำไส้ที่รุนแรงซึ่งทำให้กระเพาะอาหารต้องใช้เวลาเพิ่มขึ้นในการบีบตัวเพื่อส่งอาหารไปที่ลำไส้เล็ก โรคลำไส้อักเสบเรื้อรัง
- หลีกเลี่ยงการใช้ยานี้ในเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี และผู้ป่วยที่มีอายุตั้งแต่ 75 ปีขึ้นไป เนื่องจากยังไม่มีข้อมูลด้านความปลอดภัย
- ปรึกษาแพทย์ก่อนใช้ยานี้หากท่านมีอาการต่อไปนี้ โรคตับอ่อนอักเสบ โรคถุงน้ำดีอักเสบ และนิ่วในถุงน้ำดี โรคไตเรื้อรัง มีใจสั่นหรือหัวใจเต้นเร็วผิดปกติในขณะที่พัก สูญเสียน้ำหนักผิดปกติหรือขาดน้ำ โรคไตหรือกำลังฟอกไต โรคตับ

- ผู้ป่วยโรคเบาหวาน ควรแจ้งให้แพทย์ของท่านทราบ เพราะอาจต้องปรับขนาดยารักษาโรคเบาหวาน และห้ามใช้ยานี้แทนการใช้ยาฉีดอินซูลิน
- การใช้ยานี้ร่วมกับยาบางชนิด อาจมีผลต่อการรักษาหรือเกิดอันตราย ให้แจ้งแพทย์ของท่าน ถ้าท่านใช้ยาอื่นร่วมด้วย ได้แก่ ยารักษาโรคเบาหวาน (เช่น ยาไกลเมพิไรด์ ไกลเบนคลาไมด์ เอ็กเซนาไทต์ ลิซีเซนาไทต์ อินซูลิน) หรือ ยาต้านการแข็งตัวของเลือด (เช่น ยา วอร์ฟาริน)
- ถ้าท่านปรับขนาดยาของอินซูลิน แพทย์ของท่านอาจแนะนำให้ท่านตรวจระดับน้ำตาลในเลือดบ่อยขึ้นกว่าเดิม
- เมื่อท่านเริ่มใช้ยา Saxenda® มันสำคัญมากที่ท่านจะต้องดื่มน้ำมากๆ เพื่อป้องกันไม่ให้อาหารสูญเสียน้ำหนักเกินไป หากท่านมีคำถามหรือข้อกังวลให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร

3. วิธีใช้ยานี้

3.1 ขนาดและวิธีใช้ยา

- ควรใช้ยานี้ตามคำแนะนำของแพทย์หรือเภสัชกรเท่านั้น
- ก่อนที่ท่านได้รับปากกาฉีดยา แพทย์ เภสัชกร หรือพยาบาล จะเป็นผู้สาธิตวิธีใช้ให้ท่าน
- ท่านสามารถฉีดยานี้เวลาไหนก็ได้ของวัน แต่ทุกวันควรฉีดยาในเวลาเดียวกัน โดยฉีดพร้อมมืออาหารและเครื่องดื่มหรือไม่พร้อมก็ได้
- การฉีดยานี้จะฉีดเข้าที่บริเวณใต้ผิวหนัง ตรงตำแหน่ง หน้าท้อง ต้นขา หรือ ต้นแขน
- ห้ามฉีดยาเข้าหลอดเลือดดำ หรือ กล้ามเนื้อ
- ห้ามผสมยานี้กับยาอื่นที่ฉีด เช่น ยาฉีดอินซูลิน
- ดูรายละเอียดการฉีดยาเพิ่มเติมได้จากเอกสารแนะนำวิธีฉีดยาที่อยู่ข้างหลังเอกสารกำกับยานี้

3.2 หากลืมฉีดยา ควรทำอย่างไร

- ถ้าลืมไม่เกิน 12 ชั่วโมงจากเวลาที่ท่านฉีดยาล่าสุด ให้ฉีดยาทันทีที่นึกได้
- ถ้าลืมเกิน 12 ชั่วโมงจากเวลาที่ท่านฉีด Saxenda® ล่าสุด ให้รอฉีดยาในวันถัดไปตามเวลาเดิมที่ท่านฉีด
- ห้ามฉีดยาเพิ่มเป็นสองเท่า หรือเพิ่มขนาดยาเพื่อทดแทนขนาดยาที่ท่านลืมฉีดโดยเด็ดขาด

3.3 ถ้าฉีดยานี้เกินขนาดที่แนะนำควรทำอย่างไร

- ให้สังเกตอาการอย่างใกล้ชิด หากมีอาการผิดปกติที่รุนแรง เช่น คลื่นไส้และอาเจียนอย่างรุนแรง หรือเกิดภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำ ให้รีบนำส่งโรงพยาบาลทันที พร้อมนำยาติดตัวไปด้วย

4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างใช้ยา

- ควบคุมอาหารและออกกำลังกายระหว่างการใช้นี้
- ห้ามหยุดยาเอง และให้ฉีดยาอย่างต่อเนื่องตามคำแนะนำของแพทย์ หรือเภสัชกร
- พบแพทย์ตามนัดอย่างสม่ำเสมอ เพื่อติดตามผลการรักษาหรืออันตรายจากยา

5. อาการข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้น

5.1 อาการที่ต้องหยุดยา

หากเกิดอาการเหล่านี้ **ต้องหยุดยา แล้วรีบไปพบแพทย์ทันที**

- บวมที่ใบหน้า เปลือกตา ริมฝีปาก ลมพิษ
- หน้ามืด เป็นลม แน่นหน้าอก หายใจลำบาก ผื่นแดง ตุ่มพอง ผิวหนังหลุดลอก มีจ้ำตามผิวหนัง หรือเลือดออกผิดปกติ ซึ่งอาจเป็นอาการแพ้รุนแรง
- ปวดท้องอย่างรุนแรง ปวดหลัง คลื่นไส้ อาเจียน ซึ่งอาจเป็นอาการของตับอ่อนอักเสบ
- ปวดท้องส่วนบนรุนแรง โดยทั่วไปจะมีอาการบริเวณด้านขวาล่างของซี่โครงซึ่งอาจเป็นอาการของนิ่วและถุงน้ำดีอักเสบ
- มีอาการของไตวายเฉียบพลัน คือ ถ่ายปัสสาวะได้น้อย ในปากรู้สึกมีรสเผื่อนคล้ายโลหะ และมีรอยถลอกง่าย

5.2 อาการที่ไม่จำเป็นต้องหยุดยา

แต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์ทันที

- คลื่นไส้ อาเจียน ท้องเสีย ท้องผูก ซึ่งอาจเป็นอาการร่างกายขาดน้ำ
- อาหารไม่ย่อย ปวดท้อง ภาวะอาหารอึดเสบ แสบร้อนกลางอก ท้องอืด ท้องเฟ้อ เรอ และปากแห้ง
- รู้สึกอ่อนแรงหรือเหนื่อย
- การรับรู้รสชาติเปลี่ยนไป
- รังเวียนศีรษะ
- นอนหลับยาก (มักเป็นในช่วง 3 เดือนแรกของการรักษา)
- ชีพจรเต้นเร็ว
- มีรอยช้ำ ปวด คัน ระบายเคือง และผื่นบริเวณที่ฉีดยา
- อาการน้ำตาลในเลือดต่ำ เช่น เวียนหัว ปวดท้อง ง่วงนอน ใจสั่น สับสน หิวหรือเหงื่อออก ให้กินลูกอม 1 ถึง 2 เม็ด หรือน้ำหวานครึ่งถึงหนึ่งแก้ว รอ 5 ถึง 10 นาที หากอาการไม่ดีขึ้นให้ดื่มน้ำหวานซ้ำอีก 1 แก้วทันที

6. ควรเก็บยานี้อย่างไร

- ก่อนเปิดใช้ยาครั้งแรก ให้เก็บยาไว้ในตู้เย็น (อุณหภูมิ 2 ถึง 8 องศาเซลเซียส)
- ห้ามเก็บยาไว้ในช่องแช่แข็ง และเก็บให้ห่างจากช่องแช่แข็ง
- หลังเปิดใช้ยาครั้งแรก ยามีอายุ 1 เดือน เมื่อเก็บยาที่อุณหภูมิต่ำกว่า 30 องศาเซลเซียส หรือในตู้เย็น อุณหภูมิ 2 ถึง 8 องศาเซลเซียส ห้ามเก็บยาไว้ในช่องแช่แข็ง และเก็บยาให้ห่างจากช่องแช่แข็ง
- ควรสวมปลอกปากกาฉีดยาไว้เสมอเมื่อท่านไม่ได้ใช้ เพื่อป้องกันแสง
- ห้ามใช้ยานี้หากสารละลายขุ่นหรือมีสี
- เก็บยานี้ให้พ้นสายตาและมือของเด็ก

ผู้ผลิต Novo Nordisk A/S : Novo Allé DK-2880 Bagsværd Denmark

ผู้นำเข้า บริษัท โนว นอร์ดิสค์ ฟาร์มา (ประเทศไทย) จำกัด, กรุงเทพฯ, ประเทศไทย

เอกสารนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ วันที่ได้รับอนุญาตจากทาง อย.

เอกสารนี้เป็นข้อมูลโดยย่อ
หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร

วิธีการใช้ปากกาฉีดยา ลิราглуไทด์ ความแรง 6 มิลลิกรัมต่อ มิลลิลิตร (แซคเซินดา®)

โปรดอ่านคำแนะนำต่อไปนี้อย่างละเอียดก่อนใช้ปากกาฉีดยา Saxenda®







- ไม่ควรใช้ปากกาฉีดยานี้โดยที่ยังไม่ได้รับการฝึกสอนการใช้จาก แพทย์ หรือ พยาบาล
- ขั้นตอนแรก ตรวจสอบปากกาของท่านเพื่อให้มั่นใจว่าได้รับยา ถูกต้อง โดยต้องเห็นชื่อยา Saxenda® บนปากกา
- กรุณาดูภาพประกอบด้านล่างเพื่อให้ทราบส่วนประกอบต่างๆ ของ ปากกาและเข็มฉีดยา
- หากท่านเป็นผู้พิการทางสายตาหรือสายตาไม่ดี และ ไม่สามารถ อ่านตัวเลขแสดงขนาดยาบนด้ามปากกาได้ ห้ามใช้ยานี้โดยไม่มี ผู้ดูแล ให้ขอความช่วยเหลือจากผู้ที่มีการมองเห็นชัดเจนและ ได้รับการอบรมการใช้ปากกาฉีดยา Saxenda®
- ปากกาที่ได้รับใช้ได้เฉพาะกับเข็มของบริษัทที่ใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้ง และในกล่องบรรจุนี้ไม่มีเข็มฉีดยาบรรจุอยู่ด้วย ต้องได้รับหรือซื้อ เข็มฉีดยาแยกต่างหาก




ส่วนประกอบ และขั้นตอนการฉีดยา






▲ ข้อมูลต่อไปนี้สำคัญ ควรอ่านให้เข้าใจเพื่อความปลอดภัยในการใช้ยา





ส่วนประกอบของปากกาฉีดยา



<p>ขั้นตอนการฉีดยา ขั้นตอนที่ 1 เตรียมปากกาฉีดยา และเข็มฉีดยา 1.1 ตรวจสอบชื่อยาและสีบนฉลากที่ปากกาทุกครั้ง เพื่อป้องกันไขยาผิด 1.2 ดึงปลอกปากกาออก</p>	
<p>1.3 ตรวจสอบยาซึ่งเป็นสารละลายที่บรรจุในปากกาต้องเป็นสารละลายใสและไม่มีสี โดยดูที่ช่องมองปริมาณยาบนตัวปากกา ห้ามใช้ถ้าสารละลายมีลักษณะขุ่นหรือมีสี</p>	
<p>1.4 เตรียมเข็มฉีดยา โดยดึงแผ่นกระดาษออก ตามรูป</p>	
<p>1.5 สวมเข็มเข้ากับปากกาตรงๆ แล้วหมุนให้แน่น</p>	
<p>1.6 ดึงปลอกเข็มชั้นนอกออก และเก็บไว้ใช้ในการถอดเข็มออกจากปากกา หลังจากที่ฉีดยาเสร็จแล้ว</p>	
<p>1.7 ดึงปลอกเข็มชั้นในออกแล้วทิ้ง ไม่ควรสวมกลับเข้าไป เพราะอาจถูกเข็มทิ่มได้ ให้ดึงปลอกเข็มออกก็ต่อเมื่อพร้อมฉีดยาแล้วเท่านั้น</p> <p>⚠ การฉีดยาแต่ละครั้งควรเปลี่ยนเข็มฉีดยาอันใหม่ ⚠ ห้ามใช้เข็มทิ้งหรือเสียบหาย</p>	

<p>ขั้นตอนที่ 2 ตรวจสอบการไหลของสารละลาย ก่อนใช้ปากกาฉีดยาใหม่ทุกครั้งให้ตรวจสอบว่าน้ำยาสามารถไหลออกมาจากปากกาได้ แต่ถ้าเคยใช้ปากกาฉีดยานี้มาแล้วให้ข้ามไปขั้นตอนที่ 3 การตั้งขนาดยา</p> <p>ขั้นตอนการตรวจสอบการไหลมีดังนี้ 2.1 หมุนวงแหวนตั้งขนาดยาจนสัญลักษณ์ที่ตรวจสอบการไหลตรงกับขีดบอกขนาดยา (0)</p>	 <p>สัญลักษณ์ ตรวจสอบการ ไหล</p>
<p>2.2 ถูปากกาให้ปลายเข็มชี้ขึ้นในแนวตั้ง (ตามภาพ B) 2.3 กดปุ่มฉีดยาค้างไว้ จนตัวเลขแสดงขนาดยากลับมาที่เลข 0 โดยขีดบอกขนาดยาต้องอยู่ตรงกับ 0 จะมองเห็นหยดของสารละลายที่ปลายเข็ม ถ้าไม่มีหยดของยาที่ปลายเข็ม ให้ทำขั้นตอนที่ 2 'ตรวจสอบการไหลของสารละลาย' ซ้ำ (สามารถทำซ้ำได้ 6 ครั้ง) หากยังไม่เห็นหยดของยาให้ ให้เปลี่ยนเข็มใหม่และเริ่มทำซ้ำขั้นตอนที่ 2 'ตรวจสอบการไหลของสารละลาย' อีกครั้ง หากยังไม่เห็นหยดของยาอีก ให้ทิ้งปากกาฉีดยานั้น และใช้ปากกาฉีดยาใหม่แทน</p> <p>⚠ ก่อนการใช้ปากกาฉีดยาฉีดยาใหม่ครั้งแรกจะต้องเห็นหยดของยาที่ปลายเข็มเสมอ เนื่องจากหากไม่เห็นหยดของยาออกมา แม้ว่าเข็มฉีดยาเข้าไปแล้วท่านก็จะไม่ได้รับยา ซึ่งอาจเกิดจากเข็มอุดตันหรือเสียหาย</p>	
<p>ขั้นตอนที่ 3 การตั้งขนาดยา 3.1 หมุนวงแหวนตั้งขนาดยาจนได้ตัวเลขแสดงขนาดยาตามที่แพทย์สั่ง โดยจะต้องตั้งให้ตรงพอดีกับขีดบอกขนาดยา เพื่อให้ได้รับยาในขนาดที่ถูกต้อง</p> <ul style="list-style-type: none"> - หากตั้งขนาดยาผิด สามารถหมุนวงแหวนตั้งขนาดยาไปข้างหน้าหรือถอยหลังจนได้ขนาดยาที่ต้องการ - ปากกาฉีดยาสามารถตั้งขนาดยาได้สูงสุดที่ 3.0 มิลลิกรัม ต่อการฉีดยาแต่ละครั้ง - เมื่อปากกาของท่านมีปริมาณยาเหลืออยู่น้อยกว่า 3.0 มิลลิกรัม ตัวเลขแสดงขนาดยาจะหยุดก่อนถึงเลข 3.0 - เมื่อหมุนวงแหวนตั้งขนาดยาไปข้างหน้า ถอยหลังหรือหมุนผ่านตัวเลขที่แสดงมิลลิกรัมที่เหลืออยู่จะมีเสียงคลิกที่แตกต่างกัน ห้าม กำหนดขนาดยาเองโดยการนับเสียงคลิก <p>3.2 ดูขนาดยาจากตัวเลขและขีดบอกขนาดยาก่อนฉีดยาทุกครั้ง</p> <p>⚠ ห้ามใช้ขีดบอกปริมาณยาในการตั้งขนาดยา เพราะขีดบอกปริมาณยาจะแสดงเพียงปริมาณยาที่เหลืออยู่ในปากกาของท่านโดยประมาณเท่านั้น</p>	 <p>ตัวอย่าง เลือกขนาด 0.6 มิลลิกรัม</p>

<p>- ดูปริมาณยาที่เหลืออยู่จากขีดบอกปริมาณยาในหลอดยา ซึ่งจะแสดงถึงปริมาณยาที่เหลืออยู่ในปากกาโดยประมาณ</p>	
<ul style="list-style-type: none"> • เพื่อให้ทราบถึงปริมาณยาที่เหลืออยู่จริง ให้ใช้ตัวเลขแสดงขนาดยา โดย <ul style="list-style-type: none"> ○ หมุนวงแหวนตั้งขนาดยาจนตัวเลขแสดงขนาดยาหยุดอยู่กับที่ ○ ถ้าตัวเลขแสดงที่ 3.0 หมายถึงมีปริมาณยาเหลือน้อยกว่า 3 มิลลิกรัม ขึ้นไป ○ หากตัวเลขแสดงขนาดยาหยุดอยู่ก่อนถึงเลข 3.0 แสดงว่าปริมาณยาที่เหลืออยู่น้อยกว่า 3 มิลลิกรัม ○ หากปริมาณยาที่เหลือในปากกาฉีดยามีปริมาณน้อยกว่าขนาดยาที่แพทย์สั่ง อาจใช้ปริมาณยาที่เหลืออยู่ในปากกาฉีดยาดำนี้ร่วมกับปริมาณยาในปากกาฉีดยาดำใหม่ได้ แต่ท่านต้องได้รับการฝึกสอน จากแพทย์ เภสัชกร หรือพยาบาล โดยใช้เครื่องคิดเลขคำนวณขนาดยาที่จะใช้ให้ถูกต้องด้วยความระมัดระวัง ○ หากไม่มั่นใจว่าจะคำนวณขนาดยาจากปริมาณยาที่เหลืออยู่ในปากกาฉีดยาดำนี้ร่วมกับปริมาณยาในปากกาฉีดยาดำใหม่ได้ ถูกต้องให้ท่านฉีดยาโดยใช้ปากกาฉีดยาดำใหม่ด้ามเดียว 	
<p>ขั้นตอนที่ 4 การฉีดยา</p> <p>4.1 ก่อนฉีดยาต้องมั่นใจว่าท่านเห็นตัวเลขแสดงขนาดยา โดยอย่าให้นิ้วมือบังบริเวณที่แสดงตัวเลขขนาดยา เพราะอาจทำให้ขีดข่วนการฉีดยาที่ถูกต้องได้</p> <p>4.2 แหงเข็มฉีดยาลงบนผิวหนัง ตามที่แพทย์หรือพยาบาลสอนท่าน</p>	
<p>4.3 กดปุ่มฉีดยาค้างไว้จนตัวเลขแสดงขนาดยาแสดงเลข 0 ตรงกับขีดบอกขนาดยาซึ่งอาจได้ยินเสียงคลิก</p>	
<p>4.4 ให้คาเข็มไว้ใต้ผิวหนัง และให้นับเลข 1 ถึง 6 ซ้ำๆ หากดึงเข็มออกจากผิวหนังเร็วไปอาจทำให้ไม่ได้รับยาครบตามขนาด และอาจเห็นยาไหลออกมาจากปลายเข็ม</p>	

<p>4.5 ดึงเข็มออกจากผิวหนัง</p> <ul style="list-style-type: none"> • หากมีเลือดไหลบริเวณที่ฉีดยา ให้ใช้ผ้าสะอาดหรือสำลีกดปิดไว้ และห้ามถูบริเวณดังกล่าว • หลังฉีดยาอาจเห็นหยดของยาที่ปลายเข็มซึ่งเป็นเรื่องปกติและไม่มีผลต่อขนาดยาที่ได้รับท่านได้รับ <p>⚠️ ถ้าเข็มฉีดยาอุดตันหรือเสียหาย ให้สังเกตดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ เมื่อกดปุ่มฉีดยาค้างไว้ เลข 0 จะไม่ปรากฏที่ตัวเลขแสดงขนาดยา แสดงว่าเข็มฉีดยาอุดตันหรือเสียหาย ซึ่งท่านจะไม่ได้รับยาเข้าไป แม้ว่าตัวเลขแสดงขนาดยาเคลื่อนไปจากตำแหน่งที่ตั้งต้นแล้วก็ตาม ○ หากเกิดเข็มอุดตัน ให้เปลี่ยนเข็ม ตามขั้นตอนที่ 5 'หลังการฉีดยา' ที่จะกล่าวต่อไป และให้เริ่มใหม่ตั้งแต่ขั้นตอนที่ 1 	
<p>ขั้นตอนที่ 5 หลังการฉีดยา</p> <p>5.1 สวมปลอกเข็มเข้าไปในปลอกเข็มชั้นนอกโดยวางปลอกเข็มบนพื้นเรียบ ขณะที่สวมไม่ควรสัมผัสเข็มหรือปลอก (ตามภาพ)</p>	
<p>5.2 เมื่อเข็มถูกสวมเข้าไปแล้วให้กดปลอกเข็มชั้นนอกจนปิดสนิท (ตามภาพ)</p> <p>5.3 หมุนเกลียวออกเพื่อถอดเข็ม และนำไปทิ้งด้วยความระมัดระวัง</p>	
<p>5.4 สวมปลอกปากกาฉีดยาหลังการใช้ทุกครั้งเพื่อป้องกันแสง ห้ามใส่เข็มฉีดยาใหม่ เพราะไม่ควรเก็บปากกาที่มีเข็มฉีดยาติดอยู่</p> <p>5.5 ทิ้งเข็มฉีดยาหลังการใช้ทุกครั้ง</p> <p>5.6 หากปากกาฉีดยาไม่มียาเหลือแล้ว ให้ทิ้งปากกานั้นโดยที่ไม่มีเข็มติดอยู่ ในภาชนะที่จัดเก็บอย่างมิดชิด</p>	

<p>ข้อมูลอื่นๆ</p> <ul style="list-style-type: none"> • เก็บปากกาและเข็มให้พ้นสายตาและพ้นมือของเด็ก • ห้ามใช้ปากกาฉีดยาและเข็มร่วมกับผู้อื่น • ผู้ดูแลผู้ป่วยต้องจัดการกับเข็มที่ใช้แล้วด้วยความระมัดระวังอย่างยิ่ง เพื่อป้องกันการถูกเข็มทิ่มและการติดเชื้อ 	
<p>การดูแลปากกาฉีดยา</p> <ul style="list-style-type: none"> • ห้ามทิ้งปากกาไว้ในรถหรือสถานที่ที่อาจมีอากาศร้อนหรือเย็นเกินไป • ห้ามฉีดยาที่แช่แข็ง หากนำมาฉีด อาจทำให้ได้ผลการรักษาไม่เป็นไปตามที่ต้องการ • เก็บปากกาให้พ้นจากฝุ่นละออง สิ่งสกปรก หรือของเหลว หากจำเป็น สามารถทำความสะอาดโดยใช้ผ้าชุบน้ำยาทำความสะอาดชนิดอ่อนเช็ด • ห้ามล้าง แช่หรือใช้สารหล่อลื่น กับปากกาฉีดยา • ห้ามทำปากกาตกหรือเคาะกับพื้น หากทำปากกาตกหรือสงสัยว่าปากกามีปัญหา ให้ท่านเปลี่ยนเข็มอันใหม่ และตรวจสอบการไหลของสารละลายก่อนฉีดยา • เมื่อยาในปากกาหมดท่านต้องทิ้งปากกาไป ห้ามพยายามเติมยาเข้าไปในปากกาเอง • ห้ามพยายามซ่อมหรือตั้งปากกาออกจากกัน 	