

วอริโคนาโซล 200 มิลลิกรัม ชนิดฉีด

ชื่อการค้า Voriconazole Alvogen

(วอริโคนาโซล อัลโวเจน)

1. ยานี้คืออะไร

1.1 ยานี้มีชื่อว่าอะไร

ยานี้มีชื่อว่า วอริโคนาโซล (voriconazole) อยู่ในกลุ่มยาต้านเชื้อรา

1.2 ยานี้ใช้เพื่ออะไร

ยานี้ใช้เพื่อรักษาโรคติดเชื้อราชนิดรุนแรง หรือ ต่อการรักษาด้วยยาต้านเชื้อราชนิดอื่น

2. ข้อควรระวังก่อนใช้ยา

2.1 ห้ามใช้ยานี้เมื่อไร

- เคยแพ้ยานี้ หรือส่วนประกอบอื่นในยานี้
- เคยแพ้ยาต้านเชื้อราชนิดอื่นในกลุ่มเอโซล เช่น คีโตนาโซล, ไอทราโคนาโซล และ ฟลูโคนาโซล
- กำลังได้รับยาดังต่อไปนี้
 - ซิซาไพเรด, ควินิดิน, ไรแฟมพิซิน, เอพฟาไวเร็นซ์, คาร์บามาซีปีน, ฟิโนบาร์บิทอล, เออร์โกตามีน, เซอร์โรโลมัส, ริโทนาเวียร์, สมุนไพรรักษาโรคหัวใจ

2.2 ข้อควรระวังเมื่อใช้ยานี้

- แจ้งแพทย์ทราบถ้ากำลังได้รับยาดังต่อไปนี้
 - วาฟาริน, ไซโคลสปอริน, ไกลปีไซด์, อะโทรวาสแตติน, ซิมวาสแตติน, อัลปราโซแลม, โอมิพราโซล, ยาคุมกำเนิด, วินคริสติน, อินดินาเวียร์, เอพฟาไวเร็นซ์, เนวาลีปีน, เมทาโดน, เฟนทานิล, โอบูโพลเฟน, ไดโคฟีแนค, ฟลูโคนาโซล, เอเวอร์โรโลมัส

- แจ้งแพทย์ถ้ามีภาวะดังต่อไปนี้
 - โรคหัวใจ
 - โรคตับบกพร่อง
 - การมองเห็นผิดปกติ
- แจ้งแพทย์ถ้าผู้ป่วยอายุต่ำกว่า 2 ปี
- แจ้งแพทย์ถ้ากำลังตั้งท้องหรือให้นมบุตร

3. วิธีใช้ยา

3.1 ขนาดและวิธีใช้

- ควรใช้ยาตามคำแนะนำของแพทย์หรือเภสัชกรเท่านั้น เพราะขนาดและระยะเวลาในการใช้ยานี้ขึ้นกับความรุนแรงของโรค
- แพทย์หรือพยาบาลจะเป็นผู้ฉีดยานี้ให้กับท่าน ด้วยวิธีหยดยาเข้าหลอดเลือดดำ

3.2 หากลืมมาฉีดยาควรทำอย่างไร

- หากท่านสงสัยว่าไม่ได้รับยา ให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร

3.3 ถ้าฉีดยานี้เกินขนาดที่แนะนำ ควรทำอย่างไร

- ให้สังเกตอาการอย่างใกล้ชิด หากมีอาการผิดปกติที่รุนแรง ให้รีบนำส่งโรงพยาบาลทันที

4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างใช้ยา

- ระมัดระวังการขับชียานอนด์ หรือทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักรกล หรือเสี่ยงต่อการพลัดตกจากที่สูง เพราะยานี้อาจทำให้เกิดการมองเห็นผิดปกติชั่วคราว
- หลีกเลี่ยงการอยู่กลางแจ้งโดยตรง ให้สวมเสื้อแขนยาวและทาสารกันแดดที่มีค่า เอสพีเอฟ (SPF) มากกว่า 30 เพราะยานี้อาจทำให้ผิวหนังไวต่อแสงแดด

5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา

5.1 อาการที่ต้องแจ้งแพทย์ พยาบาลหรือเภสัชกรทันที

- บวมที่ใบหน้า เปลือกตา ริมฝีปาก ลมพิษ
- หน้ามืด เป็นลม แน่นหน้าอก หายใจลำบาก
- ผื่นแดง ตุ่มพอง ผิวหนังหลุดลอก มีจุดตามผิวหนังหรือเลือดออกผิดปกติ
- ตัวเหลือง ตาเหลือง บัสสาวะสีเข้มผิดปกติ
- การมองเห็นผิดปกติ
- มีไข้ ปวดหัว
- ปวดท้องอย่างรุนแรง ร่วมกับคลื่นไส้ อาเจียน
- แขน ขาบวม
- สับสน นอนไม่หลับ เห็นภาพหลอน
- หัวใจเต้นผิดปกติ

“ให้แจ้งแพทย์ พยาบาลหรือเภสัชกรทันที”

5.2 อาการที่ไม่จำเป็นต้องแจ้งแพทย์ แต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้แจ้งแพทย์ทันที

- คลื่นไส้ อาเจียน ปวดท้อง ท้องเสีย
- เวียนศีรษะ ปวดหัว
- รู้สึกขาที่ปลายมือ ปลายเท้า
- การทรงตัวผิดปกติ
- การรับรสผิดปกติ
- การได้ยินผิดปกติ
- ข้อต่อบวม อักเสบ

“ให้รอดูอาการ แต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้แจ้งแพทย์ทันที”

6. ควรเก็บยานี้อย่างไร

- ยานี้เก็บไว้ที่โรงพยาบาล ท่านจะไม่ได้รับกลับบ้าน
- เก็บไว้ในภาชนะบรรจุเดิมตามที่ได้รับมา
- เก็บยาในที่แห้ง อย่าให้โดนแสงโดยตรง ควรเก็บยาที่อุณหภูมิต่ำกว่า 30 องศาเซลเซียส
- เก็บยาทุกชนิดให้พ้นมือเด็ก

7. ลักษณะและส่วนประกอบของยานี้

7.1 ลักษณะยา

- วอริโคนาโซล อัลโวเจน 200 มิลลิกรัม มีลักษณะเป็นผงยาไลโอโซฟิไลซ์สีขาวถึงขาวนวล

7.2 ส่วนประกอบของยา

- ยานี้มีตัวยาสาคัญคือ วอริโคนาโซล
- ส่วนประกอบอื่นๆคือ ไฮดรอกซีโพรพิลเบตาเดกซ์, โซเดียมคลอไรด์, ไฮโดรคลอริก แอซิด

ผู้ผลิต: บริษัท แอนฟาร์ม เฮลส์ เอสเอ, ประเทศกรีซ

ผู้ตรวจปล่อยยา: บริษัท ฟาร์มาเทน เอสเอ, ประเทศกรีซ

ผู้นำเข้า/ผู้แทนจำหน่าย: บริษัท อัลโวเจน (ประเทศไทย)

จำกัด

เอกสารนี้ปรับปรุงครั้งสุดท้ายเมื่อ มีนาคม 2562

**คำเตือนยานี้อาจทำให้เกิดอันตรายร้ายแรงได้ :
ต้องใช้ภายใต้การควบคุมของแพทย์**

**เอกสารนี้เป็นข้อมูลโดยย่อ
หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร**