

เจฟีทีนิป  
ความแรง 250 มิลลิกรัม  
ชนิดเม็ด  
ชื่อการค้า เจฟีทีนิป อัสโวจีน

## 1. ยานี้คืออะไร

### 1.1 ยานี้มีชื่อว่าอะไร

ยานี้มีชื่อว่า เจฟีทีนิป (Gefitinib) มีตัวยา 250 มิลลิกรัม เป็นยาในกลุ่มยารักษาโรคมะเร็ง

### 1.2 ยานี้ใช้เพื่ออะไร

ยานี้ใช้เพื่อรักษามะเร็งปอดในผู้ใหญ่ที่แพทย์ตรวจแล้วว่าจำเป็นต้องใช้ยานี้

## 2. ข้อควรระวังก่อนใช้ยา

### 2.1 ห้ามใช้ยานี้เมื่อไร

- เคยแพ้ยานี้ หรือส่วนประกอบอื่นของยานี้
- ห้ามใช้ในหญิงตั้งครรภ์หรือกำลังวางแผนตั้งท้อง
- ห้ามใช้ในหญิงให้นมบุตร
- ห้ามใช้ในเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี

### 2.2 ข้อควรระวังเมื่อใช้ยานี้

- ให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร ในกรณีต่อไปนี้
- มีประวัติโรคปอดหรือโรคตับ
- ระวังการขับขี้นานพาหนะหรือทำงานกับเครื่องจักร

## 3. วิธีใช้ยา

### 3.1 ขนาดและวิธีใช้

- ควรใช้ยาตามคำแนะนำของแพทย์หรือ เภสัชกร เท่านั้น เพราะขนาดและระยะเวลาในการใช้ยานี้ ขึ้นกับความรุนแรงของโรค
- ควรกินยาให้ตรงเวลา กินตามขนาดยาและคำแนะนำของแพทย์ หรือเภสัชกรอย่างเคร่งครัด
- กินยานี้พร้อมอาหาร หรือตอนท้องว่างก็ได้
- ห้ามกินยานี้พร้อมยาลดกรด

### 3.2 หากลืมกินยาควรทำอย่างไร

- ถ้าลืมกินยาน้อยกว่า 12 ชั่วโมง ให้กินยาทันทีที่นึกได้
- ถ้าลืมกินยามากกว่า 12 ชั่วโมง ให้รอกินยาของมื้อต่อไป และห้ามกินยาเพิ่มเป็น 2 เท่า

### 3.3 ถ้ากินยานี้เกินขนาดที่แนะนำ ควรทำอย่างไร

- ให้สังเกตอาการอย่างใกล้ชิด หากมีอาการผิดปกติที่รุนแรง ให้รีบนำส่งโรงพยาบาลทันที

## 4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างใช้ยา

- พบแพทย์ตามนัดอย่างสม่ำเสมอ ทั้งนี้ เพื่อติดตามผลการรักษา หรืออันตรายจากยา
- ไม่ควรบริจาดเลือดระหว่างกินยานี้ และ 1 เดือน หลังจากหยุดกินยานี้
- ผู้ป่วยโรคไต ควรแจ้งแพทย์เพื่อปรับลดขนาดยา
- ผู้หญิงที่กินยานี้ ต้องคุมกำเนิดไม่ให้ตั้งท้อง และต้องตรวจการตั้งท้องก่อนการรักษา ระหว่างการรักษา และตรวจหลังการรักษา 4 อาทิตย์ หากประจำเดือนขาดต้องรีบปรึกษาแพทย์
- ผู้ชายที่กินยานี้ ควรคุมกำเนิดด้วยการสวมถุงยางอนามัยทุกครั้งเมื่อมีเพศสัมพันธ์
- หากผงยาในแคปซูลโดนผิวหนัง ต้องรีบล้างออก
- หากกินยานี้แล้วง่วงนอน วิงเวียน ควรหลีกเลี่ยงการขับรถหรือใช้เครื่องจักรกล

## 5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา

### 5.1 อาการที่ต้องหยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที

- ลมพิษ บวมที่ใบหน้า เปลือกตา ริมฝีปาก
- หน้ามืด เป็นลม แน่นหน้าอก หายใจลำบาก
- ผื่นแดง ตุ่มพอง ผิวหนังหลุดลอก มีจ้ำตามผิวหนังหรือเลือดออกผิดปกติ
- ท้องเสียรุนแรง
- ปวดตา ตาแดง ตาแฉะ ตาแพ้แสง มองเห็นไม่ชัด

“ให้หยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที”

### 5.2 อาการที่ไม่จำเป็นต้องหยุดยา แต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์

- ผิวแห้ง ปากแห้ง คอแห้ง
- ท้องเสีย คลื่นไส้ อาเจียน มีไข้
- เบื่ออาหาร อ่อนเพลีย ผม่วง
- ตาแห้ง หรือคันตา

“ไม่จำเป็นต้องหยุดยา แต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์”

## 6. ควรเก็บยานี้อย่างไร

- เก็บไว้ในบรรจุภัณฑ์เดิมตามที่ได้รับมา
- เก็บยาในที่แห้ง อย่าให้โดนแสงโดยตรง โดยทั่วไป ควรเก็บที่อุณหภูมิไม่เกิน 30 องศาเซลเซียส ไม่เก็บยาในที่ร้อนหรือชื้น เช่น ในรถ ห้องน้ำ ห้องครัว
- เก็บยาให้พ้นมือเด็ก

## 7. ลักษณะและส่วนประกอบของยานี้

เจฟีทีนิป อัสโวจีน 250 มิลลิกรัม มีลักษณะเป็นยาเม็ดเคลือบฟิล์ม สีน้ำตาล กลมมนูนทั้ง 2 ด้าน ด้านหนึ่งพิมพ์ “LP 100” อีกด้านหนึ่งไม่พิมพ์

### ส่วนประกอบในตำรับยา:

ตัวยาสำคัญคือ เจฟีทีนิป 250 มิลลิกรัม สารปรุงแต่งได้แก่ แลคโตสโมโนไฮเดรต, ไมโครคริสตัลไลน์เซลลูโลส, โครสคาเมลโลส โซเดียม, โพรโตน, โซเดียม ลอริล ซัลเฟต, แมกนีเซียม สเตียเรท

ผู้ผลิต : Lotus Pharmaceutical Co., Ltd., Taiwan

ผู้นำเข้า/ผู้แทนจำหน่าย :

บริษัท อัสโวจีน (ประเทศไทย) จำกัด กรุงเทพฯ

เอกสารนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ 24 กุมภาพันธ์ 2563

เอกสารนี้เป็นข้อมูลโดยย่อ  
หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร