

โดลูเทกราเวียร์

ความแรง 50 มิลลิกรัม

ชนิดเม็ดเคลือบฟิล์ม

ชื่อการค้า มายเทกร้า

1. ยานี้คืออะไร

1.1 ยานี้มีชื่อสามัญว่าอะไร

- ยานี้มีชื่อสามัญว่า โดลูเทกราเวียร์ (dolutegravir) เป็นยาต้านไวรัส

1.2 ยานี้ใช้เพื่ออะไร

- ใช้รักษาการติดเชื้อไวรัสเอชไอวี ในผู้ป่วยผู้ใหญ่ และเด็กอายุมากกว่า 6 ปีที่มีน้ำหนักมากกว่า 14 กิโลกรัม

2. ข้อควรระวังก่อนใช้ยา

2.1 ห้ามใช้ยานี้เมื่อไหร่

- เคยแพ้ยานี้ หรือส่วนประกอบอื่นๆของยานี้
- ห้ามกินยานี้พร้อมกับยารักษาโรคปอดอักเสบ เสื่อมแข็ง ชื่อ ดัลแฟมพรีดิน
- ห้ามใช้ยานี้ในเด็กอายุต่ำกว่า 6 ปี, น้ำหนักตัวน้อยกว่า 14 กิโลกรัม หรือที่ติดเชื้อไวรัสเอชไอวีที่ติดต่อยาอื่นๆที่คล้ายกับโดลูเทกราเวียร์

2.2 ข้อควรระวังเมื่อใช้ยานี้

- ให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรในกรณีต่อไปนี้
 - มีอาการติดเชื้อ และอาการอักเสบ
 - มีอาการปวดข้อ ข้อติด และปัญหาเกี่ยวกับกระดูก
 - ดับหรือโตบกพร่อง
 - กำลังตั้งครรภ์หรือวางแผนมีบุตร
 - กำลังใช้ยาดังต่อไปนี้
 - ยาควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด เช่น เมทฟอร์มิน
 - ยาลดกรดในกระเพาะอาหาร
 - วิตามินและอาหารเสริมต่างๆ เช่น แคลเซียม วิตามินเสริมธาตุเหล็ก หรือวิตามินรวม
 - ยาต้านเชื้อไวรัสในกลุ่มอื่นๆ เช่น อีทราเวียร์, เอฟฟาเวเรนซ์, โพรแซมพรีนาเวียร์/ริโทนาเวียร์, เนวีราพิน หรือ ทีพรานาเวียร์/ริโทนาเวียร์
 - ยาฆ่าเชื้อสำหรับรักษาวัณโรค เช่น ไรแฟมพิซิน
 - ยารักษาโรคลมชัก เช่น ฟีนโทอิน และฟีโน

บาริโทล

- ยารักษาโรคโบทูลิน เช่น ออกโซคาร์บาซิพิน และคาร์บาเมซิพิน
- สมุนไพรบางชนิด เช่น St. John's wort และสมุนไพรที่ใช้รักษาอาการซึมเศร้า
- ยาฆ่าเชื้อ เช่น แวนโคไมซิน, แอมโฟเทอรานิน มี, เพนทามิดิน, ยาต้านไวรัส และยากดภูมิคุ้มกัน เนื่องจากมีผลต่อไต

- ยานี้อาจทำให้ระดับไขมันและน้ำตาลในเลือดสูงขึ้น
- หญิงที่ติดเชื้อเอชไอวีต้องไม่ให้นมบุตร

3. วิธีใช้ยา

3.1 ขนาดและวิธีใช้

- ใช้ยาตามคำแนะนำของแพทย์ หรือเภสัชกรเท่านั้น เนื่องจากระยะเวลาในการใช้ยานี้ขึ้นกับชนิดและความรุนแรงของโรค
- ยานี้สามารถกินพร้อมอาหารได้ และดื่มน้ำตามมากๆ
- หากอาเจียนหลังจากกินยาภายใน 1 ชั่วโมง ให้กินยาเพิ่มอีก 1 เม็ด หลังจากนั้นหากอาการไม่ดีขึ้นไม่ต้องกินซ้ำอีก ให้รอกินยามื้อต่อไป

3.2 หากลืมกินยาควรทำอย่างไร

- หากมีเวลานานเกินกว่า 4 ชั่วโมงก่อนกินยามื้อถัดไปให้กินยาทันทีที่นึกได้
- หากนึกได้ว่าลืมกินยาและอีกไม่เกิน 4 ชั่วโมงจะต้องกินยามื้อต่อไป ให้รอกินยามื้อต่อไป

3.3 หากกินยานี้เกินขนาดที่แนะนำควรทำอย่างไร

- ให้รีบแจ้งแพทย์ทันที

4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างการใช้ยา

- พบแพทย์ตามนัดอย่างสม่ำเสมอ เพื่อติดตามผลการรักษาหรืออันตรายจากยา
- ห้ามหยุดยาเอง และให้กินยานี้อย่างต่อเนื่องตามคำแนะนำของแพทย์ หรือเภสัชกร
- ควรหลีกเลี่ยงการขับรถในช่วงที่กินยา เนื่องจากยามีผลทำให้ง่วงนอน

5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา

5.1 อันตรายที่ต้องหยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที

- บวมที่ใบหน้า เปลือกตา ริมฝีปาก ลมพิษ
- หน้ามืด เป็นลม แน่นหน้าอก หายใจลำบาก

- ผื่นแดง ตุ่มพอง ผิวหนังหลุดลอก มีฝ้าตามผิวหนังหรือเลือดออกผื่นปกติ
 - มีไข้สูง ปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อหรือข้อต่อ
- ### 5.2 อาการที่ไม่จำเป็นต้องหยุดยา แต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์ทันที
- ปวดหัว มึนงง นอนไม่หลับ
 - คลื่นไส้ อาเจียน ท้องเสีย อาหารไม่ย่อย

6. ควรเก็บยานี้อย่างไร

- เก็บไว้ในบรรจุภัณฑ์เดิมตามที่ได้รับมา
- เก็บในที่แห้ง อย่าวางให้โดนแสงโดยตรง โดยทั่วไปควรเก็บที่อุณหภูมิต่ำกว่า 30 องศาเซลเซียส ไม่เก็บยาในที่ร้อนหรือชื้น เช่น ในรถ ห้องนำห้องครัว
- เก็บยาให้พ้นมือเด็ก

7. ลักษณะและส่วนประกอบของยานี้

- **ลักษณะยา**
ยาเม็ดรูปกลม ปลายมน นูนทั้งสองด้าน เคลือบฟิล์มสีชมพู ด้านหนึ่งมีตัวอักษร **M** ด้านหนึ่งมีตัวอักษร **DT5**
- **ตัวยาสำคัญ** โดลูเทกราเวียร์
- **ส่วนประกอบอื่นๆ** ได้แก่แมนนิทอล, ไมโครคริสตัลลิน เซลลูโลส, โซเดียมสเตียเรต, โพรโตน, โซเดียมสเตียริลฟูมาเรต, ไททาเนียมไดออกไซด์, โพลีไวนิลแอลกอฮอล์, มาโครกอล, ทัลคัม, สารแต่งสี

ผู้ผลิต Mylan Laboratories Limited
ประเทศอินเดีย

ผู้นำเข้า บริษัท เมต้า ฟามาร์ (ประเทศไทย) จำกัด

เอกสารนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ เมษายน 2564

ศึกษาข้อมูลยาเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ของ อย.

• <http://fda.moph.go.th/sites/oss/Pages/Main.aspx>

• <http://ndi.fda.moph.go.th>

**เอกสารนี้เป็นข้อมูลโดยย่อ
หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร**