

**เอสเฟลอร์ไบโพรเฟน
ความแรง 40 มิลลิกรัม
ชนิดแผ่นแปะผิวหนัง
ชื่อการค้า LOCOA (โลควา)**

1. ยานี้คืออะไร

1.1 ยานี้มีชื่อว่าอะไร

- ยานี้มีชื่อว่า เอสเฟลอร์ไบโพรเฟน (esflurbiprofen) อยู่ในกลุ่มยาต้านอักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยด์

1.2 ยานี้ใช้เพื่ออะไร

- ยานี้ใช้บรรเทาอาการปวด ลดอาการอักเสบที่มีอาการร้อน บวมแดง จากสาเหตุโรคข้อเสื่อมที่แพทย์ตรวจแล้วว่าต้องใชยานี้

2. ข้อควรระวังก่อนใช้ยา

2.1 ห้ามใช้ยานี้เมื่อไร

- ⊗ เคยแพ้ยานี้หรือส่วนประกอบอื่นๆในยานี้
- ⊗ เป็นแผลในกระเพาะอาหาร
- ⊗ มีภาวะโรคเลือดอย่างรุนแรง
- ⊗ โรคไต โรคตับ หรือโรคหัวใจ ที่รุนแรง
- ⊗ ความดันเลือดสูงรุนแรง
- ⊗ โรคหืดหรือเคยเกิดหืดจากยาแอสไพริน
- ⊗ กำลังใช้ยารักษาโรคหัวใจหรือหลอดเลือดหัวใจ
- ⊗ หญิงที่มีอายุครรภ์มากกว่า 6 เดือน

“ห้ามใช้ยาหากมีภาวะดังกล่าว”

2.2 ข้อควรระวังเมื่อใช้ยานี้

- ให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร ในกรณีต่อไปนี้
 - เคยเป็นแผลในกระเพาะอาหาร โรคเลือด โรคไต โรคตับ โรคหัวใจ ความดันเลือดสูง โรคหืด โรคโคโรน
 - ผู้สูงอายุ
 - ในช่วง 6 เดือนแรกของการตั้งท้อง มีแผนจะตั้งท้องหรืออยู่ในระยะให้นมลูก
 - กำลังใช้ยา สมุนไพร หรือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารอื่นๆ อยู่
- ไม่แนะนำให้ใช้ในเด็ก เพราะยังไม่มีข้อมูลด้านความปลอดภัย

**“สอบถามแพทย์หรือเภสัชกร
ถ้าไม่แน่ใจว่ามีภาวะดังกล่าวหรือไม่”**

3. วิธีใช้ยา

3.1 ขนาดและวิธีใช้ยา

- **ควรใช้ตามคำแนะนำของแพทย์หรือเภสัชกรเท่านั้น** เพราะขนาดและระยะเวลาในการใช้ยานี้ขึ้นกับชนิดและความรุนแรงของโรค
- แปะแผ่นยาริเวณที่มีอาการ วันละ 1 ครั้ง
- **ห้ามแปะแผ่นยาริเวณที่มีแผล เยื่อเมือก ผิวหนังอักเสบ เป็นผื่น**
- **ห้ามแปะแผ่นยามากกว่า 2 แผ่นในคราวเดียว**
- หากจำเป็นต้องใช้ 2 แผ่นต่อวันควรใช้ยานี้ในช่วงเวลาที่สั้นที่สุดที่จำเป็นในการควบคุมอาการ
- ยา 1 แผ่น แปะได้ไม่เกิน 24 ชั่วโมง
- เมื่อต้องการหยุดใช้ยาแผ่นนี้ ให้ดึงแผ่นยาออกช้าๆ เพื่อไม่ให้เจ็บ

3.2 หากลืมติดแผ่นยา ควรทำอย่างไร

- หากนึกขึ้นได้และยังมีอาการอยู่ สามารถใช้ยาแผ่นใหม่ได้โดยไม่ต้องเพิ่มขนาดยาเป็น 2 แผ่น

3.3 หากแปะแผ่นยามากกว่าที่แนะนำ ควรทำอย่างไร

- ให้ดึงแผ่นยาออกแล้วล้างผิวหนังบริเวณที่แปะด้วยน้ำสะอาด และสังเกตอาการอย่างใกล้ชิด หากมีอาการผิดปกติที่รุนแรง ให้นำส่งโรงพยาบาลทันที

4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างใช้ยา

- หากใช้ยานี้ต่อเนื่องหลายวัน ให้ปรึกษาแพทย์
- ให้แจ้งแพทย์หรือเภสัชกรว่ากำลังใช้ยานี้อยู่ หากต้องได้รับยาแก้ปวดชนิดอื่นร่วมด้วย

5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา

5.1 อาการที่ต้องหยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที

- ลมพิษ บวมที่ใบหน้า เปลือกตาริมฝีปาก
- หน้ามืด เป็นลม แน่นหน้าอก หายใจลำบาก
- ผื่นแดง ตุ่มพอง ผิวหนังหลุดลอก มีจุดตามผิวหนัง หรือเลือดออกผิดปกติ
- บัสสาวะน้อยลง บัสสาวะเป็นเลือด บวมหน้า
- ปวดท้องรุนแรง แสบยอดอก ถ่ายดำ
- หมดสติ ชัก

“ให้หยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที”

5.2 อาการที่ไม่จำเป็นต้องหยุดยา แต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์

- เป็นผื่นบริเวณที่แปะ
- รังเวียน ปวดหัว คลื่นไส้ อาเจียน
- ไม่สบายท้อง ท้องเสีย ท้องผูก เบื่ออาหาร
- ใจสั่น

**“ไม่จำเป็นต้องหยุดยา
แต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์”**

6. ควรเก็บยานี้อย่างไร

- เก็บไว้ในบรรจุภัณฑ์เดิมตามที่ได้รับมา
- เก็บยาในที่แห้ง อย่าให้โดนแสงโดยตรง โดยทั่วไปควรเก็บที่อุณหภูมิไม่เกิน 30 องศาเซลเซียส ไม่เก็บยาในที่ร้อนหรือชื้น เช่น ในรถห้องน้ำ ห้องครัว
- เก็บยาให้พ้นมือเด็ก

7. ลักษณะและส่วนประกอบของยานี้

- **ลักษณะยา** แผ่นพลาสติกไม่มีสีถึงสีเหลืองอ่อน มีกลิ่นเฉพาะ
- **ตัวยาสำคัญ** เอสเฟลอร์ไบโพรเฟน 40 มิลลิกรัม
- **ส่วนประกอบอื่นๆได้แก่** เมนทาออยล์, พาราฟินเหลว, สไตรีนไอโซพรีน-สไตรีนบลิคโคโคโพลีเมอร์, โพลีไอโซบิวไทลีน, เอสเธอร์กัม-เอชจี, โพลีโพลีเอทิลีนไกลคอล-ไดคาพริลเลต, 2-เมอแคปโต-เบนซิมิดาโซล และไดบูทิลไฮดรอกซีโทลูอีน

ผู้ผลิต บริษัทโทคุซอน คอร์ปอเรชั่น ประเทศญี่ปุ่น
ผู้นำเข้า บริษัทโอเอสเอสกา ไทยโซ ฟาร์มาซูติคอล จำกัด ประเทศไทย
เอกสารนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ พฤศจิกายน 2563

**ศึกษาข้อมูลยาเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ของ
อย.**

- <http://www.fda.moph.go.th/sites/oss/Pages/Main.aspx>
- <http://ndi.fda.moph.go.th/>

**เอกสารนี้เป็นข้อมูลโดยย่อ
หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร**

คำเตือนตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข

1. ยานี้อาจทำให้เกิดอาการไม่พึงประสงค์ทางผิวหนัง หากพบอาการผิดปกติ ทางผิวหนัง ควรหยุดยาทันทีและรีบปรึกษาแพทย์
2. ห้ามใช้ในผู้ที่แพ้ยานี หรือผู้ที่มีอาการหอบหืด ลมพิษ หรือโพรงจมูก อักเสบแบบเฉียบพลันจากการแพ้ยาแอสไพริน (Aspirin) หรือยากลุ่มต้านการอักเสบที่ไม่ใช่สเตอรอยด์ (NSAIDs)
3. หลีกเลี่ยงการใช้ยานี้ในสตรีมีครรภ์ไตรมาสสุดท้าย นอกจากแพทย์สั่ง
4. หลีกเลี่ยงการใช้ยานี้ในผู้ที่มีเลือดออกในกระเพาะอาหาร ลำไส้ หรือมีแผลทะลุ เนื่องจากยานี้เพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดอาการดังกล่าว
5. หลีกเลี่ยงการใช้ในผู้ที่ เป็นโรคตับหรือโรคไต หรือมีการทำงานของตับหรือไตผิดปกติ
6. ยานี้หากใช้ติดต่อกันเป็นเวลานานอาจเกิดอาการไม่พึงประสงค์เช่นเดียวกับ ยาชนิดรับประทาน เช่น เสี่ยงต่อการเกิดความผิดปกติของเกล็ดเลือด หรือความผิดปกติของระบบหัวใจและหลอดเลือด
7. ระวังการใช้นี้ในผู้สูงอายุ