

ลูซพาเทอเซ็ป
ความแรง 25 และ 75 มิลลิกรัมต่อขวด
ชนิดผงสำหรับฉีด
ชื่อการค้า Reblozyl® (รีโบลซิล®)

1. ยานี้คืออะไร

1.1 ยานี้มีชื่อว่าอะไร

ยานี้มีชื่อว่าลูซพาเทอเซ็ป (Luspatercept)

1.2 ยานี้ใช้เพื่ออะไร

ยานี้ใช้รักษาผู้ป่วยผู้ใหญ่โรคโลหิตจางที่มีสาเหตุจากโรคไขกระดูกเสื่อมหรือโรคเมตาธาลัสซีเมียที่แพทย์พิจารณาแล้วว่าต้องใช้ยานี้

2. ข้อควรระวังก่อนใช้ยา

2.1 ห้ามใช้ยานี้เมื่อไร

- ⊗ เคยแพ้ยานี้ หรือส่วนประกอบของยานี้
- ⊗ สตรีมีครรภ์หรือวางแผนตั้งครรภ์

2.2 ข้อควรระวังเมื่อใช้ยานี้

- ให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร ในกรณีต่อไปนี้
 - มีประวัติผื่นคัน
 - มีประวัติเกิดลมเลือดอุดตัน
 - กำลังทานฮอร์โมนทดแทน
 - เป็นโรคความดันโลหิตสูง
 - เด็กและผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี

3. วิธีใช้ยา

3.1 ขนาดและวิธีใช้

- ควรใช้ยาตามคำแนะนำของแพทย์หรือเภสัชกรเท่านั้น เพราะขนาดและระยะเวลาในการใช้ยานี้ขึ้นกับชนิดและความรุนแรงของโรค
- แพทย์หรือพยาบาลจะเป็นผู้ฉีดยานี้ให้ท่านโดยฉีดเข้าใต้ผิวหนัง

3.2 หากลืมมาฉีดยาควรทำอย่างไร

- ให้ติดต่อแพทย์หรือเภสัชกรทันทีที่นึกขึ้นได้

3.3 ถ้าฉีดยานี้เกินขนาดที่แนะนำ ควรทำอย่างไร

- หากสงสัยว่าได้รับยาเกินขนาด ให้รีบแจ้งแพทย์พยาบาลหรือเภสัชกรทันที

4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างใช้ยา

- ให้ไปพบแพทย์ตามนัดอย่างสม่ำเสมอ เพื่อรับยาอย่างต่อเนื่องและติดตามผลการรักษาหรืออันตรายจากยา
- ควรใช้วิธีการคุมกำเนิดที่มีประสิทธิภาพระหว่างที่ได้รับการรักษาด้วยยานี้และหลังจากได้รับยาครั้งสุดท้ายเป็นเวลา 3 เดือน
- ไม่ควรให้นมบุตรระหว่างที่ได้รับการรักษาด้วยยานี้และหลังจากได้รับยาครั้งสุดท้ายเป็นเวลา 3 เดือน

5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา

5.1 อาการที่ต้องแจ้งแพทย์ พยาบาล หรือเภสัชกรทันที

- ลมพิษ บวมที่ใบหน้า เปลือกตา ริมฝีปาก ลิ้นหรือลำคอ
- หน้ามืด เป็นลม แน่นหน้าอก หายใจลำบาก
- ผื่นแดง ตุ่มพอง ผื่นหนังหลุดลอก มีจุดตามผิวหนังหรือเลือดออกผิดปกติ
- เดี๋ยวหรือปวดลำบาก ริงเวียน สูญเสียการทรงตัว
- หน้า ขาหรือแขนมีอาการชาหรือเป็นอัมพาต
- มองภาพไม่ชัด

“หากมีอาการเหล่านี้
ให้แจ้งแพทย์ พยาบาล หรือเภสัชกรทันที”

5.2 อาการที่อาจเกิดได้และให้รอดอาการ แต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้แจ้งแพทย์ พยาบาลหรือเภสัชกรทันที

- หลอดลมอักเสบ อาการไข้หวัดใหญ่
- ปัสสาวะแสบขัด
- มึนงง ปวดศีรษะ ท้องเสีย คลื่นไส้ ปวดหลัง ปวดข้อหรือกระดูก อ่อนเพลีย

“ให้รอดอาการ แต่ถ้ามีอาการรุนแรง
ให้แจ้งแพทย์ พยาบาล หรือเภสัชกร”

6. ควรเก็บยานี้อย่างไร

- ยานี้เก็บไว้ที่โรงพยาบาล ท่านจะไม่ได้รับกลับบ้าน
- เก็บยาในตู้เย็น ห้ามแช่แข็ง

7. ลักษณะและส่วนประกอบของยานี้

- **ลักษณะยา** ผงยาสีขาว ปราศจากอนุภาคแปลกปลอมที่มองเห็นได้
- **ตัวยาสําคัญ** ลูซพาเทอเซ็ป
- **ส่วนประกอบอื่น ๆ** ได้แก่ ซิทริกแอซิด โมโนไฮเดรต (citric acid monohydrate) โซเดียมซิเตรต (sodium citrate) โพลีซอร์เบต 80 (polysorbate 80) ซูโครส (sucrose) ไฮโดรคลอริกแอซิด (hydrochloric acid) โซเดียมไฮดรอกไซด์ (sodium hydroxide)

ผู้ผลิต แพททีออน อิตาเลีย เอส.พี.เอ ประเทศอิตาลี

ผู้นำเข้า บริษัท เซลจิน จำกัด

ผู้แทนจำหน่าย บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด

เอกสารนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ 24 มิถุนายน 2565

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ของ อย.

- <http://www.fda.moph.go.th/sites/oss/Pages/Main.aspx>
- <http://ndi.fda.moph.go.th/>

**เอกสารนี้เป็นข้อมูลโดยย่อ
หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร**