

เพมีเทรกเซด**ความแรง 500 มิลลิกรัม****ชนิดผงยาเพื่อเตรียมเป็นสารละลาย
ข้มข้นสำหรับให้ทางหลอดเลือดดำแบบ
หยด****ชื่อการค้า PEMEMAX (พีมีแมกซ์)****1. ยานี้คืออะไร****1.1 ยานี้มีชื่อว่าอะไร**

- ยานี้มีชื่อว่า เพมีเทรกเซด (pemetrexed) เป็นยา
รักษาโรคมะเร็ง

1.2 ยานี้ใช้เพื่ออะไร

- ยานี้ใช้เพื่อรักษาโรคมะเร็งเยื่อหุ้มปอด หลังแพทย์
ตรวจรักษาแล้วเห็นว่าต้องใช้ยานี้
- ยานี้ใช้รักษาโรคมะเร็งปอดชนิดไม่ใช้เซลล์เล็ก หลัง
แพทย์ตรวจรักษาแล้วเห็นว่าต้องใช้ยานี้

2. ข้อควรระวังก่อนใช้ยา**2.1 ห้ามใช้ยานี้เมื่อไร**

- เมื่อได้รับหรือกำลังจะได้รับวัคซีนป้องกันโรคไขเหลือง
- เคยแพ้ยานี้ หรือส่วนประกอบของยานี้ หรือยาในกลุ่ม
กรดโฟลิก
- เมื่ออยู่ในระยะให้นมลูก เพราะทำให้เกิดอันตราย
ร้ายแรงต่อเด็ก

2.2 ข้อควรระวังเมื่อใช้ยานี้

- **ให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร ในกรณีต่อไปนี้**
 - มีภาวะโรคตับ ไต หัวใจ หรือน้ำท่วมปอด
 - กำลังหรืออยู่ระหว่างการฉายรังสี
 - กำลังกินหรือฉีดยาแก้ปวด อักเสบ หรือฉีดวัคซีน
 - ผู้หญิงที่วางแผนมีลูกหรือกำลังตั้งท้อง
 - ผู้ชายที่ต้องการมีลูก เพราะยาอาจทำให้มีลูกยาก

3. วิธีใช้ยา**3.1 ขนาดและวิธีใช้**

- ควรใช้ยาตามคำแนะนำของแพทย์หรือเภสัชกร
เพราะขนาดและระยะเวลาในการใช้ยานี้ขึ้นกับชนิดและ
ความรุนแรงของโรค
- บุคลากรทางการแพทย์จะเป็นผู้เตรียมยาและให้ยากับ
ท่าน โดยการหยดยาเข้าทางหลอดเลือดดำ

3.2 หากลืมมาฉีดยา ควรทำอย่างไร

- ปรึกษาแพทย์ หรือเภสัชกร

3.3 หากฉีดยานี้เกินขนาดที่แนะนำ ควรทำอย่างไร

- ให้สังเกตอาการอย่างใกล้ชิด หากมีอาการผิดปกติที่
รุนแรง เช่น มีไข้ ท้องเสีย มีแผลในปาก เลือดออกและ
หยุดยาก อาการคันหรือตุ่มพุพอง หายใจลำบาก เจ็บ
หน้าอก ให้รีบนำส่งโรงพยาบาลทันที

4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างใช้ยา

- **พบแพทย์ตามนัดอย่างสม่ำเสมอ เพื่อติดตาม
ผลการรักษาหรืออันตรายจากยา**
- แจ้งแพทย์ เภสัชกร หรือพยาบาลว่ากำลังใช้ยานี้
- ระหว่างใช้ยานี้ ผู้หญิงต้องคุมกำเนิดและหยุดให้นมลูก
- ระมัดระวังการขับขี้นานยนต์หรือทำงานเกี่ยวกับ
เครื่องจักรกลหรือทำงานที่เสี่ยงต่อการพลัดตกจากที่สูง
- ห้ามฉีดวัคซีนป้องกันไขเหลือง กรณีจำเป็นต้องฉีด
วัคซีน ให้ใช้วัคซีนชนิดเชื้อตาย

5. อันตรายจากยา**5.1 อาการที่ต้องแจ้งแพทย์ พยาบาล หรือเภสัชกรทันที**

- บวมที่ใบหน้า เปลือกตา ริมฝีปาก ลมพิษ
- หน้ามืด เป็นลม แน่นหน้าอก หายใจลำบาก ไอแบบมี
เสมหะเป็นเลือด
- ผื่นแดง ตุ่มพอง ผิวหนังหลุดลอก มีจำตามผิวหนัง หรือ
เลือดออกผิดปกติ
- มีไข้สูงกว่า 38 องศาเซลเซียส เหงื่อออก หนาวสั่น
- มีอาการเลือดออกจากเหงือก ปาก จมูก ปัสสาวะสีแดง
หรือชมพู
- หยุดหายใจชั่วคราว เจ็บหน้าอก
- รู้สึกอ่อนล้า หน้าซีด

**“หากมีอาการเหล่านี้ ให้แจ้งแพทย์ พยาบาล
หรือเภสัชกรทันที”**

**5.2 อาการที่อาจเกิดขึ้นได้และให้รอดูอาการ แต่
ถ้ามีอาการรุนแรงให้แจ้งแพทย์ เภสัชกร หรือ
พยาบาล**

- คลื่นไส้ อาเจียน คออักเสบ ท้องร่วง ท้องผูก ปวด
ท้อง อ่อนเพลีย เมื่ออาหาร
 - ผมรั้ง การรับรสเปลี่ยนไป
- “หากมีอาการรุนแรงหรือทนไม่ได้ ให้ไปพบแพทย์”**

6. ควรเก็บยานี้อย่างไร

- ยานี้เก็บไว้ที่โรงพยาบาล ท่านจะไม่ได้รับกลับบ้าน

7. ลักษณะและส่วนประกอบของยานี้

- **พีมีแมกซ์** เป็นผงยาสีขาวถึงเหลืองอ่อนหรือสีเหลือง
ออกเขียว บรรจุในขวดแก้วใส สำหรับเตรียมเป็น
สารละลายและเจือจางเพื่อหยดเข้าหลอดเลือดดำ
- **พีมีแมกซ์** ประกอบด้วย ตัวยาสำคัญเพมีเทรกเซด
- **ส่วนประกอบอื่น ๆ** ได้แก่ แมนนิทอล ไฮโดรคลอริก แอ
ซิด และ โซเดียมไฮดรอกไซด์

ผู้ผลิต: Thymoorgan Pharmazie GmbH, Goslar,
Germany. และ Pharmidea SIA, Olaine, Latvia.

ผู้นำเข้า/ผู้แทนจำหน่าย:

บริษัท เมดิคอล ดิสทริบิวชั่น แอนด์ คอลเลคชั่น เซอร์วิส
เชส จำกัด

เอกสารนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ 3 พฤษภาคม 2566

ศึกษาข้อมูลยาเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ของ **อย.**

- <http://www.fda.moph.go.th/sites/oss/Pages/Main.aspx>
- <http://ndi.fda.moph.go.th/>

**เอกสารนี้เป็นข้อมูลโดยย่อ
หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร**

**ยานี้อาจทำให้เกิดอันตรายร้ายแรงได้
ต้องใช้ภายใต้การควบคุมของแพทย์เท่านั้น**