

เอลวิเทกราเวียร์/โคบิซิสแตต/เอมโทรซิดามีน/ เทโนโฟเวียร์ อะลาเฟนาไมด์

ความแรง 150/150/200/10 มิลลิกรัม

ชนิด เม็ด

ชื่อการค้า **Genvoya (เจนโวยา)**

1. ยานี้คืออะไร

1.1 ยานี้มีชื่อว่าอะไร

- ยานี้มีชื่อว่า เจนโวยา (Genvoya) มีตัวยา เอลวิเทกราเวียร์ (elvitegravir) 150 มิลลิกรัม, โคบิซิสแตต (cobicistat) 150 มิลลิกรัม, เอมโทรซิดามีน (emtricitabine) 200 มิลลิกรัม, เทโนโฟเวียร์ อะลาเฟนาไมด์ (tenofovir alafenamide) 10 มิลลิกรัม

- เป็นยาในกลุ่ม ยาต้านไวรัส

1.2 ยานี้ใช้เพื่ออะไร

ยานี้ใช้เพื่อรักษาโรคติดเชื้อเอชไอวีในผู้ใหญ่ และในเด็กที่อายุมากกว่า 6 ปีขึ้นไปที่มีน้ำหนักตัวอย่างน้อย 25 กิโลกรัม

2. ข้อควรระวังก่อนใช้ยา

2.1 ห้ามใช้ยานี้เมื่อไร

- ⊗ เคยแพ้ยานี้ หรือส่วนประกอบของยานี้
- ⊗ ห้ามกินร่วมกับยาต่อไปนี้
- ยารักษาวัณโรคบางชนิด (เช่น ริแฟมพิซิน)
- ยารักษาต่อมลูกหมากโตบางชนิด (เช่น อัลฟูโซซิน)
- ยาต้านการแข็งตัวของเลือดบางชนิด (เช่น ดาบีกาแทรน)
- ยารักษาโรคหัวใจบางชนิด (เช่น อะมิโอดาโรน ครินิดิน)
- ยารักษาโรคลมชักบางชนิด (เช่น คาร์บามาซีพีน เฟนิโทอิน ฟิโนบาร์บิทัล)
- ยารักษาไมเกรนบางชนิด (เช่น เออร์โกทามีน)

- ยาลดไขมันในเลือดบางชนิด (เช่น ซิมวาสแททิน โลวาสแททิน)
- ยาทางจิตเวชบางชนิด (เช่น พิโมไซด์) ยารักษาความผิดปกติของความดันโลหิตเลือดแดงในปอดบางชนิด (เช่น ซิลเดนาฟิล)
- ยานอนหลับบางชนิด (เช่น มิดาโซแลม ไทรอะโซแลม)
- ยารักษาโรคทางเดินอาหารบางชนิด (เช่น ซิซาไพเรด)
- สมุนไพรบางชนิด (เช่น เซนต์จอห์นเวิร์ต)

2.2 ข้อควรระวังเมื่อใช้ยานี้

- **ให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร ในกรณีต่อไปนี้**
- กำลังตั้งครรภ์ หรือ วางแผนที่จะตั้งครรภ์ เพราะยังไม่มีข้อมูลความปลอดภัย และการตั้งครรภ์ทำให้ระดับยาในเลือดต่ำลงการรักษาไม่ได้ผล
- กำลังให้นมลูก เพราะยาอาจถูกขับออกทางน้ำนม
- เป็นโรคไต
- เป็นโรคตับหรือมีประวัติติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีหรือซี เพราะอาจทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนเกี่ยวกับตับได้
- มีประวัติแพ้น้ำตาลแล็กโทส
- **ไม่ควรใช้ยานี้ร่วมกับยาบางชนิด เพราะอาจมีผลต่อการรักษาหรือเกิดอันตรายได้ เช่น** ยาต้านเชื้อราบางชนิด ยาต้านไวรัสตับอักเสบบีบางชนิด ยาต้านแบคทีเรียบางชนิด ยาคุมกำเนิดบางชนิด ยาเสเดอรอยด์บางชนิด ยาขยายหลอดลมบางชนิด ยาต้านอาการซึมเศร้าบางชนิด ยาอื่นที่มีส่วนประกอบของทีโนโฟเวียร์ หรือลามิวูดีน หรือ อะดีโฟเวียร์ ไดไฟโวซิล ยารักษาเบาหวานบางชนิด (เช่น เมตฟอร์มิน) ยาละลายลิ่มเลือดบางชนิด (เช่น วอร์ฟาริน อะพิซาแบน เอดดอกซาแบน ไรวารอกซาแบน) ยาขยายหลอดลมบางชนิด (เช่น แซลเมเทอรอล) ยารักษาโรคเกาต์บางชนิด (เช่น คอลชิซิน) ยารักษาโรคหัวใจบางชนิด (เช่น ดิจอกซิน)

“หากท่านไม่แน่ใจว่ากำลังใช้ยาดังกล่าวอยู่หรือไม่ ควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร”

3. วิธีใช้ยา

3.1 ขนาดและวิธีใช้

- **ควรใช้ยาตามคำแนะนำของแพทย์หรือเภสัชกร** เท่านั้น เพราะขนาดและระยะเวลาในการใช้ยานี้ขึ้นกับชนิดและความรุนแรงของโรค
- กินวันละ 1 ครั้ง พร้อมอาหาร
- ห้ามเคี้ยว หรือบดเม็ดยา แต่สามารถหักแบ่งเม็ดได้ หากไม่สามารถกลืนยาได้ทั้งเม็ด (ควรหักเม็ดยาก่อนกินเท่านั้น ไม่ควรหักแบ่งเก็บไว้)
- หากอาเจียนภายใน 1 ชั่วโมงหลังจากกินยา ให้กินยานี้ใหม่พร้อมอาหาร
- แต่หากอาเจียนหลังจากกินยาแล้ว เกิน 1 ชั่วโมง ไม่ต้องกินยาซ้ำ
- หากท่านต้องล้างไต ให้กินยาหลังล้างไต
- หากกินวิตามินหรือยาลดกรดที่มีส่วนผสมของแมกนีเซียมหรืออลูมิเนียม ให้กินห่างจากยานี้โดยกินก่อนหรือหลังกินยานี้อย่างน้อย 4 ชั่วโมง

3.2 หากลืมกินยาควรทำอย่างไร

- **ถ้านึกได้ภายใน 18 ชั่วโมง** ให้กินยาทันทีที่นึกได้ และกินยามื้อต่อไปตามปกติ
- **ถ้าลืมกินยาเกิน 18 ชั่วโมง** ไม่ต้องกินยามื้อนั้น ให้รอกินยาของมื้อต่อไป และห้ามกินยาเพิ่มเป็น 2 เท่า

3.3 ถ้ากินยานี้เกินขนาดที่แนะนำ ควรทำอย่างไร

- ให้สังเกตอาการอย่างใกล้ชิด หากมีอาการผิดปกติที่รุนแรงให้รีบนำส่งโรงพยาบาลทันที

4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างใช้ยา

- พบแพทย์ตามนัดอย่างสม่ำเสมอ เพื่อติดตามผลการรักษาหรืออันตรายจากยา
- ใช้ยานี้อย่างต่อเนื่องตามคำแนะนำของแพทย์ หรือเภสัชกร
- **ห้ามลดขนาดหรือหยุดยาเอง** เพราะการขาดยาจะทำให้อาการของโรคกำเริบได้ เกิดเชื้อดื้อยาและรักษายากขึ้น

- ระหว่างใช้ยานี้ คุณยังสามารถรับเชื้อหรือแพร่เชื้อไวรัสสู่ผู้อื่นได้ ควรปรึกษาแพทย์เพื่อทราบวิธีปฏิบัติตัวที่ปลอดภัย
- ต้องคุมกำเนิดด้วยวิธีที่มีประสิทธิภาพ
- งดให้นมลูกระหว่างใช้ยานี้
- ระมัดระวังการขับขี่จักรยาน หรือยานยนต์หรือทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักรกลหรือทำงานที่เสี่ยงต่อการพลัดตกจากที่สูง เพราะยานี้ทำให้เวียนศีรษะ มึนงงได้

5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา

5.1 อาการที่ต้องหยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที

- ลมพิษ บวมที่ใบหน้า เปลือกตาริมฝีปาก
- หน้ามืด เป็นลม แน่นหน้าอก หายใจลำบาก
- ผื่นแดง ตุ่มพอง ผื่นหนังหลุดลอก มีจุดตามผิวหนังหรือเลือดออกผื่นปกติ
- ข้อตึงขัด ปวดข้อ (โดยเฉพาะบริเวณสะโพก หัวเข่า ไหล่) เคลื่อนไหวลำบาก
- มีภาวะแพ้ภูมิตัวเอง เช่น กล้ามเนื้ออ่อนแรง (เริ่มที่มือ เท้า และกระจายไปที่ลำตัว) ใจสั่นหรือมือสั่น ผื่นปกติ
- มีอาการแฉะ เช่น ติดเชื้อแทรกซ้อนบริเวณต่างๆ ของร่างกาย หรือมีอาการอักเสบรุนแรง
- มีความคิดอยากฆ่าตัวตาย อาจเกิดขึ้นได้หากท่านเคยเป็นโรคซึมเศร้า

“ให้หยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที”

5.2 อาการที่ไม่จำเป็นต้องหยุดยา แต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์

- คลื่นไส้ อาเจียน อ่อนเพลีย
- ปวดท้อง ท้องเสีย ท้องอืด
- ปวดศีรษะ เวียนศีรษะ ผื่นผื่นปกติ

“ไม่จำเป็นต้องหยุดยา แต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์”

6. ควรเก็บยานี้อย่างไร

- เก็บไว้ในบรรจุภัณฑ์เดิมตามที่ได้รับมา

- เก็บยาในที่แห้ง อย่าให้โดนแสงโดยตรง โดยทั่วไป ควรเก็บที่อุณหภูมิ <ไม่เกิน 30 > องศาเซลเซียส ไม่เก็บยาในที่ร้อนหรือชื้น เช่น ในรถ ห้องนำห้องครัว
- เก็บยาให้พ้นมือเด็ก

7. ลักษณะและส่วนประกอบของยานี้

- **ลักษณะยา** เม็ดยารูปรีปลายมน-นูนทั้งสองด้าน เคลือบฟิล์มสีเขียว ด้านหนึ่งมีตัวอักษร “GSI” อีกด้านมีตัวอักษร “510”
- **ตัวยาสำคัญ** เอลวิเทกราเวียร์, โคบีซิสแทต, เอมโทรซิตามีน, เทโนโฟเวียร์ อะลาเฟนาไมด์
- **ส่วนประกอบอื่น ๆ** ได้แก่ Lactose monohydrate (แลคโทสโมโนไฮเดรต), Microcrystalline Cellulose (ไมโครคริสตัลลีน เซลลูโลส), Hydroxypropyl Cellulose (ไฮดรอกซิลโพรพิล เซลลูโลส), Sodium lauryl sulfate (โซเดียม ลอริล ซัลเฟต), Croscarmellose sodium (ครอสคาร์เมลโลส โซเดียม), Magnesium stearate (แมกนีเซียม สเตียเรท), Purified water (น้ำบริสุทธิ์)

ผู้ผลิต Patheon Inc., แคนาดา

ผู้นำเข้า บ.ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย) จำกัด

ผู้แทนจำหน่าย บ.ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย) จำกัด

เอกสารนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ กรกฎาคม 2563

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ของ **อย.**

- <http://www.fda.moph.go.th/sites/oss/Pages/Main.aspx>
- <http://ndi.fda.moph.go.th/>

เอกสารนี้เป็นข้อมูลโดยย่อ หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร