

อิมาทินิบ**ความแรง 100 และ 400 มิลลิกรัม****ชนิดเม็ด****ชื่อการค้า Tykonib 100 , Tykonib 400
(ทีโคนิบ 100 , ทีโคนิบ 400)****1. ยานี้คืออะไร****1.1 ยานี้มีชื่อสามัญว่าอะไร**

- ยานี้มีชื่อว่า อิมาทินิบ เมสึเลท (Imatinib mesylate)

1.2 ยานี้ใช้เพื่ออะไร

ยานี้ใช้เพื่อรักษามะเร็งเม็ดเลือดขาวบางชนิด มะเร็งของกระเพาะอาหารและลำไส้ และมะเร็งผิวหนัง ซึ่งแพทย์ต้องตรวจแล้วว่าเหมาะสมที่จะใช้ยานี้

2. ข้อควรระวังก่อนใช้ยา**2.1 ห้ามใช้ยานี้เมื่อไร**

- ⊗ ห้ามใช้หากเคยแพ้ยานี้ หรือส่วนประกอบของยานี้

2.2 ข้อควรระวังเมื่อใช้ยานี้

- **แจ้งแพทย์ก่อนใช้ยา** หากมีภาวะดังต่อไปนี้
 - ผู้มีหรือเคยมีปัญหาที่ ตับ ไต หรือหัวใจ
 - ได้รับการผ่าตัดต่อมไทรอยด์ออกและกำลังรับยา ลีโวไทรอกซิน (Levothyroxin)
 - มีหรือเคยมีการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบี เพราะอาจทำให้โรคตับอักเสบบีกำเริบ ซึ่งอาจทำให้เสียชีวิตได้
- แจ้งแพทย์หากท่านกำลังตั้งครรภ์ วางแผนจะตั้งครรภ์ หรืออยู่ในระยะให้นมบุตร เพราะอาจทำให้เกิดอันตรายต่อทารก
- แจ้งแพทย์หรือเภสัชกรก่อนใช้ยา หากท่านใช้ยาอื่นๆ อาหารเสริมหรือสมุนไพร เพราะอาจส่งผลกระทบต่อการรักษาของยานี้

3. วิธีใช้ยา**3.1 ขนาดและวิธีใช้**

- ใช้ยาตามคำแนะนำของแพทย์ หรือ เภสัชกร อย่างเคร่งครัด เพราะขนาดและระยะเวลาในการใช้ยานี้ขึ้นกับชนิดและความรุนแรงของโรค จึงควรกินยาตามแพทย์สั่ง
- กินยาทั้งเม็ดพร้อมอาหาร หรือหลังอาหารทันที แล้วดื่มน้ำตามมากๆ เพื่อลดการระคายเคืองกระเพาะและลำไส้
- หากกลืนยาไม่ได้ ให้ละลายยาในน้ำเปล่าหรือน้ำแอปเปิ้ล และดื่มน้ำให้หมดทันที ยาขนาด 100 มิลลิกรัม ละลายในน้ำ 50 มิลลิลิตร และขนาด 400 มิลลิกรัม ละลายน้ำ 200 มิลลิลิตร

3.2 หากลืมกินยาควรทำอย่างไร

- หากลืมกินยาแล้วนึกออกภายใน 6 ชั่วโมง ให้กินยาทันทีที่นึกได้
- ถ้าลืมกินยาเกิน 6 ชั่วโมง ไม่ต้องกินยามื้อนั้นให้รอ กินยาของมื้อต่อไป ห้ามกินยาเพิ่มเป็น 2 เท่า

3.3 ถ้ากินยานี้เกินขนาดที่แนะนำ ควรทำอย่างไร

- ให้สังเกตอาการอย่างใกล้ชิด หากมีอาการ ผิดปกติที่รุนแรง เช่น คลื่นไส้ อาเจียนรุนแรง ท้องเสีย รุนแรง ปวดท้องรุนแรง ให้รีบนำส่งโรงพยาบาลทันทีและนำไปด้วย

4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างใช้ยา

- สวมเสื้อผ้าให้มิดชิดและทาครีมกันแดดที่มีสาร SPF เพราะยานี้อาจทำให้ผิวหนังไวต่อแสงแดดทั้งในเด็กและผู้ใหญ่
- ห้ามปรับขนาดยาหรือหยุดยาเอง และให้กินยานี้อย่างต่อเนื่องตามคำแนะนำของแพทย์ หรือเภสัชกร
- พบแพทย์ตามนัดอย่างสม่ำเสมอ เพื่อติดตามผลการรักษาหรืออันตรายจากยา
- ระมัดระวังการขับขี่ยานยนต์ การทำงานกับเครื่องจักร กกล หรืองานที่เสี่ยงต่อการพลัดตกจากที่สูง เพราะยานี้อาจทำให้ง่วงซึม ตาพร่ามัว

5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา**5.1 อาการที่ต้องหยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที**

- บวมที่ใบหน้า เปลือกตา ริมฝีปาก ลมพิษ
- หน้ามืด เป็นลม แน่นหน้าอก หายใจลำบาก
- ผื่นแดง ตุ่มพอง ผิวหนังหลุดลอก มีฝ้าตามผิวหนังหรือเลือดออกผิวดก
- ไอ เจ็บหน้าอก หายใจลำบาก หรือรู้สึกเจ็บขณะหายใจ
- อาการภาวะหัวใจล้มเหลว เช่นเหนื่อยขณะออกกำลังกายหรือขณะนอนราบ หัวใจเต้นเร็ว ตัวบวม
- เลือดออกในทางเดินอาหาร ดูได้จากมีอาเจียนเป็นเลือด อุจจาระเป็นสีดำ

“ให้หยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที”**5.2 อาการที่ไม่จำเป็นต้องหยุดยา แต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์**

- คลื่นไส้ อาเจียน ท้องเสีย ปวดท้อง
- ปวดกล้ามเนื้อ ตะคริว เป็นผื่นแดง
- บวม น้ำหนักขึ้น

“ให้รอดูอาการ แต่ถ้ามีอาการรุนแรงควรไปพบแพทย์”**6. ควรเก็บยานี้อย่างไร**

- เก็บไว้ในบรรจุภัณฑ์เดิมตามที่ได้รับมา
- เก็บยาในที่แห้ง อบอุ่นโดยตรง โดยทั่วไปควรเก็บที่อุณหภูมิไม่เกิน 30 องศาเซลเซียส ไม่เก็บยาในที่ร้อนหรือชื้น เช่น ในรถ ห้องน้ำ ห้องครัว
- ห้ามใช้ยาหลังวันหมดอายุที่ระบุบนกล่อง
- เก็บยาให้พ้นมือเด็ก

7. ลักษณะและส่วนประกอบของยา

• ลักษณะยา

ทีโคนิบ 100 เป็นยาเม็ดรูปกลมแบน เคลือบฟิล์ม สีน้ำตาลอมส้ม มีข้อความ IMT บนเม็ดด้านหนึ่งและขีดแบ่งอีกด้านหนึ่ง

ทีโคนิบ 400 เป็นยาเม็ดรูปทรงยาวนูน ปลายมนสองด้าน เคลือบฟิล์ม สีน้ำตาลอมส้ม มีข้อความ 400บนเม็ดด้านหนึ่งและข้อความ IMT อีกด้านหนึ่ง

• ส่วนประกอบอื่นๆ

Microcrystalline cellulose, Crospovidone, Colloidol silicon dioxide, Hydroxypropyl methylcellulose, Magnesium stearate, Purified water, Hypromellose, Macrogol, Talc และสีจาก iron oxide

ผลิตโดย: MSN Laboratories Private Limited
Telangana, India

นำเข้าโดย: Mega Lifesciences Public Company
Limited

Samutprakarn, Thailand

เอกสารนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ มิถุนายน 2566

คำเตือน ยานี้อาจทำให้เกิดอันตรายร้ายแรงได้
ต้องใช้ภายใต้การควบคุมของแพทย์

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ของ อย.

- <http://www.fda.moph.go.th/sites/oss/Pages/Main.aspx>
- <http://ndi.fda.moph.go.th/>

เอกสารนี้เป็นข้อมูลโดยย่อ
หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร