

เมลฟาแลน
ความแรง 50 มิลลิกรัมต่อขวด
ชนิดผงสำหรับฉีด
ชื่อการค้า Megval (เม็กวาล)

1. ยานี้คืออะไร

1.1 ยานี้มีชื่อว่าอะไร

- ยานี้มีชื่อว่าเมลฟาแลน เป็นยาในกลุ่มเคมีบำบัด

1.2 ยานี้ใช้เพื่ออะไร

1. ใช้สำหรับเตรียมผู้ป่วย multiple myeloma ก่อนการปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดเลือด (hematopoietic progenitor (stem) cell transplantation)
2. ใช้สำหรับรักษาแบบประคับประคองในผู้ป่วย multiple myeloma ที่ใช้ยารับประทานไม่ได้ผล

2. ข้อควรระวังก่อนใช้ยา

2.1 ห้ามใช้ยานี้เมื่อไร

- ⊗ เคยแพ้ยานี้ หรือส่วนประกอบของยานี้
- ⊗ ห้ามใช้ในหญิงกำลังตั้งครรภ์ แต่แพทย์อาจสั่งใช้หากมีความจำเป็น
- ⊗ ห้ามใช้ในหญิงให้นมบุตร
- ⊗ เม็ดเลือดขาวต่ำมากหรือเกล็ดเลือดต่ำมาก

2.2 ข้อควรระวังเมื่อใช้ยานี้

- ให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร ในกรณีต่อไปนี้
 - กำลังหรือเคยได้รับการฉายรังสีหรือเคมีบำบัด
 - มีปัญหาเกี่ยวกับไต
 - มีกำหนดจะได้รับวัคซีนชนิดเชื้อมีชีวิต
 - กำลังได้รับยา กรดแอสลิดิกซิก
 - กำลังได้รับยา ซิกโคลสปอริน

3. วิธีใช้ยา

3.1 ขนาดและวิธีใช้

- ควรใช้ยาตามคำแนะนำของแพทย์หรือเภสัชกรเท่านั้น เพราะขนาดและระยะเวลาในการใช้ยานี้ขึ้นกับชนิดและความรุนแรงของโรค
- แพทย์หรือพยาบาลจะเป็นผู้ฉีดยาให้กับท่าน โดยฉีดเข้าทางหลอดเลือดดำ

3.2 หากลืมมาฉีดยาควรทำอย่างไร

- ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรเมื่อลืมมาฉีดยานี้

3.3 ถ้าฉีดยานี้เกินขนาดที่แนะนำ ควรทำอย่างไร

- หากสงสัยว่าได้รับยาเกินขนาด ให้รีบแจ้งแพทย์หรือพยาบาลทันที

4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างใช้ยา

- พบแพทย์ตามนัดอย่างสม่ำเสมอ เพื่อติดตามผลการรักษาหรืออันตรายจากยา
- ผู้ป่วยชายและผู้ป่วยหญิงให้คุมกำเนิดในระหว่างที่ใช้ยานี้และคุมกำเนิดอย่างต่อเนื่องหลังจากหยุดยาไปแล้วอีก 6 เดือน

5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา

5.1 อาการที่ต้องแจ้งแพทย์ พยาบาล หรือเภสัชกรทันที

- ลมพิษ บวมที่ใบหน้า เปลือกตาริมฝีปาก
- หน้ามืด เป็นลม แน่นหน้าอก หายใจลำบาก
- ผื่นแดง ตุ่มพอง ผื่นหนังหลุดลอก มีจ้ำตามผื่นหรือเลือดออกผื่นปกติ
- หมดสติ หัวใจหยุดเต้นเฉียบพลัน
- มีอาการคล้ายจะเป็นไข้หรือติดเชื้อ เช่น เจ็บคอ เจ็บปาก ติดเชื้อทางเดินปัสสาวะ
- รู้สึกเหนื่อยมาก หรือเวียนหัวมาก
- รู้สึกไม่สบาย ถึงแม้ว่าไม่มีไข้
- ปวดกล้ามเนื้อ กล้ามเนื้อหดเกร็ง หรือกล้ามเนื้ออ่อนแรง
- ปัสสาวะมีสีเข้มขึ้น หรือสีน้ำตาลหรือสีแดง
- รู้สึกปวด แสบ ร้อน บริเวณที่ให้ยา

**“หากมีอาการเหล่านี้
ให้แจ้งแพทย์ พยาบาล หรือเภสัชกรทันที”**

5.2 อาการที่อาจเกิดได้และให้รอดอาการ แต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้แจ้งแพทย์หรือพยาบาล

- คลื่นไส้ อาเจียน ท้องเสีย
 - มีแผลในปาก ผอมร่วง เมื่อได้รับยาในขนาดสูง
 - รู้สึกเจ็บแปลบหรืออุบบริเวณที่ถูกฉีดยา
- “ให้รอดอาการ แต่ถ้ามีอาการรุนแรง
ให้แจ้งแพทย์ พยาบาล หรือเภสัชกร”**

6. ควรเก็บยานี้อย่างไร

- ยานี้เก็บไว้ที่โรงพยาบาล ท่านจะไม่ได้รับกลับบ้าน

7. ลักษณะและส่วนประกอบของยานี้

- **ลักษณะยา** ผงยาละลายในตัวทำละลายสำหรับฉีด
- **ตัวยาสำคัญ** เมลฟาแลน
- **ส่วนประกอบอื่น ๆ** ได้แก่ povidone (โพรโิดอน), hydrochloric acid (กรดไฮโดรคลอริก), water for injection (น้ำสำหรับยาฉีด), nitrogen (ไนโตรเจน), sodium citrate dihydrate (โซเดียมซิเตรตไดไฮเดรต), propylene glycol (โพรพิลีนไกลคอล), ethanol (เอทานอล)

ผู้ผลิต Emcure Pharmaceuticals Ltd., India

ผู้นำเข้า Alliance Pharma Co., Ltd., Thailand

ผู้แทนจำหน่าย Alliance Pharma Co., Ltd., Thailand

เอกสารนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ กุมภาพันธ์ 2566

ศึกษาข้อมูลยาเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ของ อย.

- <http://www.fda.moph.go.th/sites/oss/Pages/Main.aspx>
- <http://ndi.fda.moph.go.th/>

**คำเตือน: ยานี้ อาจทำให้เกิดอันตรายร้ายแรงได้
ต้องใช้ภายใต้การควบคุมของแพทย์เท่านั้น**

**เอกสารนี้เป็นข้อมูลโดยย่อ
หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร**