

แนฟาโซลีน และ คลอเฟนิรามีน**ความแรง 1 มิลลิกรัม และ****2.5 มิลลิกรัม****ชนิดพ่นจุ่ม****ชื่อการค้า NASOL® NEBULISER****(นาซอล® ยาพ่นจุ่ม)****1. ยานี้คืออะไร****1.1 ยานี้มีชื่อว่าอะไร**

- ยานี้มีชื่อว่า **นาซอล® ยาพ่นจุ่ม** เป็นยาสูตรผสม มีตัวยาคือ
 - แนฟาโซลีน (naphazoline) 1 มิลลิกรัม และ
 - คลอเฟนิรามีน (chlorpheniramine) 2.5 มิลลิกรัม
 เป็นยาในกลุ่มที่ใช้หดหลอดเลือดและแก้แพ้

1.2 ยานี้ใช้เพื่ออะไร

- ยานี้ใช้บรรเทาอาการคัดจมูก เนื่องจากหวัด ไข้ละอองฟาง โรคจมูกอักเสบจากภูมิแพ้ ไซนัสอักเสบ

2. ข้อควรระวังก่อนใช้ยา**2.1 ห้ามใช้ยานี้เมื่อไร**

- เคยแพ้ยานี้ หรือแพ้ส่วนประกอบของยานี้
- เคยแพ้ยาแก้คัดจมูกตัวอื่น
- เป็นโรคต่อหีนชนิดมุมแคบ

2.2 ข้อควรระวังเมื่อใช้ยานี้


- ให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร ในกรณีต่อไปนี้
 - เป็นโรคเบาหวาน ความดันเลือดสูง โรคหัวใจ
 - โรคหอบหืด หลอดลมอักเสบ
 - เป็นโรคไทรอยด์ โรคตับ ลมชัก
 - ต้อหิน ความดันลูกตาสูง
 - ต่อมลูกหมากโต กลั้นปัสสาวะไม่อยู่
 - อดตันระหว่างกรวยไตและลำไส้
 - เด็กและผู้สูงอายุ
 - หญิงตั้งครรภ์ หญิงให้นมลูก
 - กำลังใช้ยาโรคจิตเภท ยาคลายกังวลบางชนิด
- “หากมีภาวะดังกล่าว ให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร”**

3. วิธีใช้ยา**3.1 ขนาดและวิธีใช้**

- ผู้ป่วยอายุ **12 ปี ขึ้นไป**: พ่นยาข้างละ 1 ถึง 2 ครั้ง ทุก 4 ถึง 6 ชั่วโมง หากมีอาการคัดจมูก
- เด็กอายุ **6 ถึง 12 ปี**: พ่นยาข้างละ 1 ครั้ง ทุก 4 ถึง 6 ชั่วโมง หากมีอาการคัดจมูก
- ไม่แนะนำให้ใช้ยานี้ในเด็กอายุต่ำกว่า 6 ปี**

ก่อนพ่น .

- กำจัดน้ำมูกออกจากจมูกให้หมด (ถ้ามี)
- ถ้าใช้ครั้งแรกให้เปิดฝาขวดและบีบลมออกก่อนจนได้ละอองฝอย

ขณะพ่น .

- เปิดฝาขวดยา
- สอดปลายที่พ่นยาเข้าไปในรูจมูก ใช้นิ้วมืออีกข้างปิดรูจมูกข้างที่เหลือ
- สูดหายใจเข้าช้า ๆ พร้อมกับกอดที่พ่นยาเข้าจมูก โดยให้ปลายหลอดชี้ไปทางผนังด้านข้างจมูกให้มากที่สุด

หลังพ่น .

- เช็ดทำความสะอาดที่ปลายพ่น ปิดฝาให้เรียบร้อย

3.2 หากลืมพ่นยาควรทำอย่างไร

- หากยังมีอาการอยู่ให้พ่นยาทันทีที่นึกขึ้นได้ แต่ถ้านึกขึ้นได้ใกล้กับการพ่นยาครั้งถัดไปให้พ่นยาในขนาดปกติ ห้ามพ่นยาเป็น 2 เท่า
- หากไม่มีอาการแล้ว สามารถหยุดยาได้เลย

3.3 ถ้าพ่นยานี้เกินขนาดที่แนะนำ ควรทำอย่างไร

- ให้สังเกตอาการอย่างใกล้ชิด หากมีอาการผิดปกติที่รุนแรง เช่น ง่วงซึม ตัวเย็น ใจเต้นช้า อาเจียน ไม่มีแรง ให้รีบนำส่งโรงพยาบาลทันที

4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างใช้ยา

- ไม่ควรใช้ยานี้ติดต่อกันเกิน 3 วัน เพราะอาจคัดแน่นจมูกมากกว่าเดิม
- หากพ่นยาแล้วง่วงซึม ตามัว ให้หลีกเลี่ยงการขับขี่ยานพาหนะ การทำงานกับเครื่องจักรกลหรืองานที่เสี่ยงต่อการพลัดตกจากที่สูง

5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา**5.1 อาการที่ต้องหยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที**

- ลมพิษ บวมที่ใบหน้า เปลือกตา ริมฝีปาก
 - หน้ามืด เป็นลม แน่นหน้าอก หายใจลำบาก
 - ผื่นแดง ตุ่มพอง ผิวหนังหลุดลอก มีจ้ำตามผิวหนัง
 - ง่วงซึม ตัวเย็น ใจเต้นช้า อาเจียน ไม่มีแรง
- “ให้หยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที”**

5.2 อาการที่ไม่จำเป็นต้องหยุดยา

- แต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์
 - ระคายเคือง แสบร้อนบริเวณเยื่อภายในจมูก
 - จมูกแห้ง มีอาการจามหรือน้ำมูกเพิ่มขึ้น
- “ไม่จำเป็นต้องหยุดยา แต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์”**

6. ควรเก็บยานี้อย่างไร

- เก็บไว้ในบรรจุภัณฑ์เดิมตามที่ได้รับมา
- เก็บยาในที่แห้ง อย่าให้โดนแสงโดยตรง โดยทั่วไป ควรเก็บที่อุณหภูมิไม่เกิน 30 องศาเซลเซียส
- ไม่เก็บยาในที่ร้อนหรือชื้น เช่น ในรถ ห้องน้ำ ห้องครัว
- เก็บยานี้ให้พ้นมือเด็ก

7. ลักษณะและส่วนประกอบของยานี้

- **ลักษณะยา:** นํ้ายาสำหรับพ่นจมูก ใส ไม่มีสี
- **ตัวยาสำคัญ:** แนฟาโซลีน 1 มิลลิกรัม และ คลอเฟนิรามีน 2.5 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร บรรจขวดละ 15 มิลลิลิตร
- **ส่วนประกอบอื่นๆ ได้แก่:** กรดซิตริกแอนไฮไดรต (anhydrous citric acid), เอเดเตตไดโซเดียม (edetate disodium), โมโนเบสิกโซเดียมฟอสเฟตไดไฮเดรต (monobasic sodium phosphate dihydrate), ไดเบสิกโซเดียมฟอสเฟตเฮปตะไฮเดรต (dibasic sodium phosphate heptahydrate), กลีเซอริน (glycerin), เบนซาลโคเนียมคลอไรด์ (benzalkonium chloride) และนํ้า

ผู้ผลิต: บริษัท โอลิด (ประเทศไทย) จำกัด
166 นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน ถนนอุดมสรยุทธ
หมู่ที่ 16 ตำบลบางกระสัน อำเภอบางปะอิน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13160 ประเทศไทย

ผู้แทนจำหน่าย: ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยเวชการ
272 สาทรแมนชั่น ถนนกรุงธนบุรี กรุงเทพฯ

เอกสารนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ **2 ตุลาคม 2566**

ศึกษาข้อมูลยาเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ของ อย.

- <http://www.fda.moph.go.th/sites/oss/Pages/Main.aspx>
- <http://ndi.fda.moph.go.th>

เอกสารนี้เป็นข้อมูลโดยย่อ

หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร