

**เพมีเทรกเซต**  
**ความแรง 100 และ 500 มิลลิกรัม**  
**ชนิดผงยาเพื่อเตรียมเป็น**  
**สารละลายเข้มข้นสำหรับ**  
**ให้ทางหลอดเลือดดำแบบหยด**  
**ชื่อการค้า PEMETREXED EURODRUG**  
**(เพมีเทรกเซต ยูโรดรัก)**

## 1. ยานี้คืออะไร

- ยานี้มีชื่อว่าอะไร
  - ยานี้มีชื่อว่า เพมีเทรกเซต (pemetrexed) เป็นยา รักษาโรคมะเร็ง
- ยานี้ใช้เพื่ออะไร
  - ยานี้ใช้เพื่อรักษาโรคมะเร็งเยื่อหุ้มปอด หลังแพทย์ตรวจรักษาแล้วเห็นว่าต้องใช้นี้
  - ยานี้ใช้รักษาโรคมะเร็งปอดชนิดไม่ใช้เซลล์เล็ก หลังแพทย์ตรวจรักษาแล้วเห็นว่าต้องใช้นี้

## 2. ข้อควรระวังเมื่อใช้ยา

- ห้ามใช้ยาเมื่อไร
  - เมื่อได้รับหรือกำลังจะได้รับวัคซีนป้องกันโรคไขหวัดหรือเคยแพ้ยา นี้ หรือส่วนประกอบของยา นี้ หรือยา ในกลุ่มกรดโฟลิก
  - เมื่ออยู่ในระยะให้มลูก เพราะทำให้เกิดอันตรายร้ายแรงต่อเด็ก
- ข้อควรระวังเมื่อใช้ยานี้
  - ให้บริการแพทย์หรือเภสัชกร หากท่านมีอาการต่อไปนี้
    - มีภาวะโรคตับ ไต หัวใจ หรือ น้ำท่วมปอด
    - กำลังหรืออยู่ระหว่างการฉายรังสี
    - กำลังกินหรือคิดยาแก้ปวด อักเสบ หรือฉีดวัคซีน
    - ผู้หญิงที่วางแผนมีลูกหรือกำลังตั้งครรภ์
    - ผู้ชายที่ต้องการมีลูก เพราะยาอาจทำให้มีลูกยาก

## 3. วิธีการใช้ยา

- ขนาดและวิธีใช้
  - ควรใช้ยาตามคำแนะนำของแพทย์หรือเภสัชกร เพราะขนาดและระยะเวลาในการใช้ยานี้ขึ้นกับชนิดและความรุนแรงของโรค
  - บุคลากรทางการแพทย์จะเป็นผู้เตรียมยาและให้ยากับท่าน โดยการหยดยาเข้าทางหลอดเลือดดำ
- หากลืมมาฉีดยา ควรทำอย่างไร
  - ปรึกษาแพทย์ หรือเภสัชกร
- หากฉีดยานี้เกินขนาดที่แนะนำ ควรทำอย่างไร
  - ให้สังเกตอาการอย่างใกล้ชิด หากมีอาการผิดปกติที่รุนแรง เช่น มีไข้ ท้องเสีย มีแผลในปาก เลือดออกและหยุดยาก อาการคันหรือตุ่มพอง หายใจลำบาก เจ็บหน้าอก ให้รีบนำส่งโรงพยาบาลทันที

## 4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างใช้ยา

- พบแพทย์ตามนัดอย่างสม่ำเสมอ เพื่อติดตามผลการรักษา หรืออันตรายจากยา
- แจ้งแพทย์ เภสัชกร หรือพยาบาลว่ากำลังใช้ยานี้
- ระหว่งใช้ยานี้ ผู้หญิงต้องคุมกำเนิดและหยุดให้มลูก
- ระมัดระวังการขับขี้นานยนต์หรือทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักรกลหรือทำงานที่เสี่ยงต่อการพลัดตกจากที่สูง
- ห้ามฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดหรือ วัคซีนป้องกันโรคอื่น วัคซีน ให้ใช้ชนิดชนิดฉีด

## 5. อันตรายจากยา

- อาการที่ต้องแจ้งแพทย์ พยาบาล หรือเภสัชกรทันที
  - บวมที่ใบหน้า เปลือกตา ริมฝีปาก ลมพิษ
  - หน้ามืด เป็นลม แน่นหน้าอก หายใจลำบาก ไอแบบมีเสมหะเป็นเลือด
  - ผื่นแดง ตุ่มพอง ผิวหนังหลุดลอก มีจุดตามผิวหนังหรือเลือดออกผิดปกติ
  - มีไข้สูงกว่า 38 องศาเซลเซียส เหงื่อออก หนาวสั่น
  - มีอาการเลือดออกจากเหงือก ปาก จมูก มีสภาวะสีแดงหรือชมพู
  - หยุดหายใจชั่วคราว เจ็บหน้าอก
  - รู้สึกอ่อนล้า หน้าซีด

"หากมีอาการเหล่านี้ ให้แจ้งแพทย์ พยาบาล หรือเภสัชกรทันที"

- อาการที่อาจเกิดขึ้นได้และให้รอดูอาการ แต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้แจ้งแพทย์ เภสัชกร หรือพยาบาล
  - คลื่นไส้ อาเจียน คออักเสบ ท้องร่วง ท้องผูก ปวดท้อง
  - อ่อนเพลีย เบื่ออาหาร
  - ผมร่วง การรบกวนสเปียนไป

"หากมีอาการรุนแรงหรือทอนไม่ ได้ ให้ไปพบแพทย์"

## 6. ควรเก็บยาน้อย่างไร

- ยานี้เก็บไว้ที่โรงพยาบาล ท่านจะไม่ได้รับกลับบ้าน

## 7. ลักษณะและส่วนประกอบของยา

- เพมีเทรกเซต ยูโรดรัก เป็นผงยาสีขาวถึงเหลืองอ่อน บรรจุในขวดแก้วใสไม่มีสี สำหรับเตรียมเป็นสารละลายและเจือจางเพื่อหยดเข้าหลอดเลือดดำ
- เพมีเทรกเซต ยูโรดรัก ประกอบด้วยตัวยาคัญ เพมีเทรกเซต
- ส่วนประกอบอื่นๆ ได้แก่ แมนนิทอล ไฮโดรคลอริค แอซิด และโซเดียมไฮดรอกไซด์

ผู้ผลิต: Oncomed Manufacturing a.s.  
Karásek 2229/1b, budova 02  
Reckovice, 621 00 Brno, Czech Republic

### ผู้นำเข้า/ผู้แทนจำหน่าย :

บริษัท แมซซิฟิด เฮอร์แคร์ (ไทยแลนด์) จำกัด กรุงเทพฯ  
เอกสารนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ 23 กันยายน 2565

### ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ของ อย.

- <http://www.fda.moph.go.th/sites/oss/Pages/Main.aspx>
- <http://ndi.fda.moph.go.th/>

เอกสารนี้เป็นข้อมูลโดยย่อ

หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร

คำเตือน ยานี้อาจทำให้เกิดอันตรายร้ายแรงได้  
ต้องใช้ภายใต้การควบคุมของแพทย์เท่านั้น