

ชุนิทิบ
ความแรง 12.5 มิลลิกรัม
ชนิดแคปซูลแข็ง
ชื่อการค้า SUNITINIB 12.5 EURODRUG
(ชุนิทิบ 12.5 ยูโรดริก)

1. ยานี้คืออะไร

- 1.1 ยานี้มีชื่อว่าอะไร**
- ยานี้มีชื่อว่า ชุนิทิบ (sunitinib) มีตัวยา 12.5 มิลลิกรัม เป็นยาในกลุ่มยาต้านมะเร็ง
- 1.2 ยานี้ใช้เพื่ออะไร**
- ยานี้ใช้รักษาโรคมะเร็งในผู้ป่วยผู้ใหญ่ดังต่อไปนี้ มะเร็งกระเพาะอาหารและลำไส้ มะเร็งไตระยะแพร่กระจาย และมะเร็งตับอ่อน ที่แพทย์ตรวจแล้วว่าจำเป็นต้องใช้ยานี้

2. ข้อควรระวังก่อนใช้ยา

- 2.1 ห้ามใช้ยานี้เมื่อไร**
- เคยแพ้ยานี้ หรือส่วนประกอบอื่นในยานี้
- 2.2 ข้อควรระวังเมื่อใช้ยานี้**
- ให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร ในกรณีต่อไปนี้
 - มีความดันสูง
 - มีปัญหาโรคหัวใจ หรือหัวใจเต้นผิดจังหวะ
 - มีปัญหาต่อมไทรอยด์
 - เป็นหรือเคยเป็นโรคเกี่ยวกับเลือด หรือมีปัญหาเกี่ยวกับการเลือดออก หรือมีรอยช้ำ
 - เป็นหรือเคยเป็นปัญหาเกี่ยวกับตับ
 - มีหรือเคยมีความผิดปกติของตับอ่อนหรือถุงน้ำดี
 - มีหรือเคยมีปัญหาเกี่ยวกับไต
 - มีหรือเคยมีอาการเกี่ยวกับฟัน เช่น ปวดฟัน ปวดกราม หรือมีอาการชา บวมหรือเจ็บภายในปาก
 - มีหรือเคยมีความผิดปกติเกี่ยวกับผิวหนัง
 - มีหรือเคยมีอาการชัก
 - เป็นโรคเบาหวาน
 - เพิ่งได้รับการผ่าตัดหรือกำลังจะเข้ารับการผ่าตัด
 - ไม่ควรใช้ยานี้ในผู้ป่วยอายุต่ำกว่า 18 ปี เนื่องจากไม่มีข้อมูลสนับสนุน
 - ระมัดระวังการใช้ยานี้ในหญิงตั้งครรภ์หรือให้นมลูก เพราะไม่มีข้อมูลยืนยันความปลอดภัย

- ไม่ควรใช้ยานี้ร่วมกับยาบางชนิด เช่น ยาต้านเชื้อรา (อิทราโคนาโซล คีโทโคนาโซล) ยารักษาเอดส์ (รีโทนาเวียร์) ยาแก้ชัก (เฟนิโทอิน คาร์บามาซีปีน ฟิโนบาร์บิทอล) ยาฆ่าเชื้อแบคทีเรีย (คลาริโพรไมซิน อิริโทรไมซิน ริแฟมพิซิน) ยาสเตียรอยด์ (เดกซาเมทาโซน) สมุนไพรเซนต์จอห์นเวิร์ท เพราะอาจมีผลต่อการรักษาหรือเกิดอันตรายได้ หากท่านไม่แน่ใจว่ากำลังใช้ยาเหล่านี้อยู่ โปรดปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร
- “สอบถามแพทย์หรือเภสัชกร ถ้าไม่แน่ใจว่ามีภาวะดังกล่าวหรือไม่”**

3. วิธีใช้ยา

- 3.1 ขนาดและวิธีใช้**
- ควรกินยาตามคำแนะนำของแพทย์หรือเภสัชกรเท่านั้น เพราะขนาดและระยะเวลาในการใช้ยานี้ขึ้นกับชนิดและความรุนแรงของโรค
 - กินยานี้พร้อมหรือไม่พร้อมอาหารก็ได้
- 3.2 หากลืมกินยาควรทำอย่างไร**
- ห้ามกินยาเพิ่มเป็น 2 เท่า
- 3.3 ถ้ากินยานี้เกินขนาดที่แนะนำ ควรทำอย่างไร**
- ให้สังเกตอาการอย่างใกล้ชิด หากมีอาการผิดปกติที่รุนแรง ให้รีบนำส่งโรงพยาบาลทันที

4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างใช้ยา

- ระมัดระวังการขับชี่ยานยนต์ หรือทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักรกล หรือทำงานที่เสี่ยงต่อการพลัดตกจากที่สูง ถ้าหารู้สึกเวียน หรือเหนื่อยล้าผิดปกติ
- พบแพทย์ตามนัดอย่างสม่ำเสมอ เพื่อติดตามผลการรักษาหรืออันตรายจากยา

5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา

- 5.1 อาการที่ต้องรีบไปพบแพทย์ทันที**
- ลมพิษ บวมที่ใบหน้า เปลือกตา ริมฝีปาก
 - หน้ามืด เป็นลม แน่นหน้าอก หายใจลำบาก
 - ผื่นแดง ตุ่มพอง ผิวหนังหลุดลอก มีจ้ำตามผิวหนัง หรือมีเลือดออกผิดปกติ
 - เหนื่อยล้า หายใจติดขัด
 - ไอเป็นเลือด เจ็บหน้าอก
 - อาเจียนเป็นเลือด อุจจาระสีดำ ปัสสาวะเป็นเลือด
 - ไข้ ปวดท้องรุนแรง
 - ปัสสาวะบ่อยขึ้นหรือลดลงหรือไม่มีปัสสาวะ

“ให้หยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที”

5.2 อาการที่ไม่จำเป็นต้องหยุดยา แต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์

- ความดันสูง
- เบื่ออาหาร
- ท้องเสีย คลื่นไส้ อาเจียน
- สีผิวเปลี่ยน ผื่นที่ฝ่ามือและฝ่าเท้า

“ไม่จำเป็นต้องหยุดยา แต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์”

6. ควรเก็บยานี้อย่างไร

- เก็บไว้ในบรรจุภัณฑ์เดิมตามที่ได้รับมา
- เก็บยาในที่แห้ง อบอุ่น โดยตรง โดยทั่วไป ควรเก็บที่อุณหภูมิไม่เกิน 30 องศาเซลเซียส ไม่เก็บยาในที่ร้อนหรือชื้น เช่น ในรถ ห้องน้ำ ห้องครัว
- เก็บยาให้พ้นมือเด็ก

7. ลักษณะและส่วนประกอบของยานี้

- ลักษณะยา** เป็นยาแคปซูลชนิดแข็ง ตัวและฝาแคปซูลสีส้ม พิมพ์อักษรสีขาวว่า SNB และตัวเลข 12.5
- ตัวยาสำคัญ** ชุนิทิบ (sunitinib)
- ส่วนประกอบอื่นๆ** ได้แก่ povidone (โพรโอดิน), microcrystalline cellulose (ไมโครคริสตัลไลน์เซลลูโลส), croscarmellose sodium (ครอสคาเมลโลสโซเดียม), magnesium stearate (แมกนีเซียมสเตียเรท) และแคปซูลทำจากเจลลาติน

ผู้ผลิต : SYNTHON HISPANIA SL ประเทศสเปน
ผู้รับอนุญาตนำเข้าหรือส่งยาแผนปัจจุบัน: บริษัท แปซิฟิก เฮลท์แคร์ (ไทยแลนด์) จำกัด กรุงเทพฯ

เอกสารนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ มกราคม 2568

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ของ อย.
▪ <http://ndi.fda.moph.go.th/>

คำเตือน : ยานี้อาจทำให้เกิดอันตรายร้ายแรงได้ ต้องใช้ภายใต้การควบคุมของแพทย์เท่านั้น

เอกสารนี้เป็นข้อมูลโดยย่อ หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร