

คาร์วีโดลอล และ ไอวาบราดีน
6.25/5, 6.25/7.5, 12.5/5 และ
12.5/7.5 มิลลิกรัม
ชนิดเม็ดเคลือบฟิล์ม
ชื่อการค้า Carivalan (คาริวาแลน)

1. ยานี้คืออะไร

1.1 ยานี้มีชื่อว่าอะไร

- ยานี้เป็นยาสูตรผสม มีตัวยาคือ คาร์วีโดลอล (carvedilol) และไอวาบราดีน (ivabradine)

1.2 ยานี้ใช้เพื่ออะไร

- ยานี้ใช้สำหรับรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือดที่มีภาวะเจ็บหน้าอกเรื้อรัง หรือรักษาภาวะหัวใจล้มเหลวเรื้อรังที่แพทย์พิจารณาแล้วว่าจำเป็นต้องใช้ยานี้

2. ข้อควรระวังก่อนใช้ยา

2.1 ห้ามใช้ยานี้เมื่อไร

- เคยแพ้ยานี้ หรือส่วนประกอบของยานี้หรือยาใช้รักษาโรคหัวใจกลุ่มเบต้า-บล็อกเกอร์ เช่น อะทีโนลอล เมโทโพรลอล และ โพรพานอลอล เป็นต้น
- หญิงตั้งครรภ์ วางแผนจะตั้งครรภ์ หรือให้นมลูก
- ผู้ป่วยตับบกพร่องรุนแรง
- ผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือดบางชนิดซึ่งแพทย์ประเมินแล้วว่าห้ามใช้ยานี้
- ผู้ป่วยที่ใส่เครื่องกระตุ้นไฟฟ้าหัวใจ
- ผู้ป่วยที่มีความดันเลือดต่ำรุนแรง
- ผู้ป่วยโรคทางเดินหายใจ เช่น โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง โรคหอบหืด เป็นต้น
- ภาวะเลือดเป็นกรด

- โรคเนื้องอกต่อมหมวกไตที่ไม่ได้รับการรักษา
- ห้ามใช้ร่วมกับยาปฏิชีวนะ ยาต้านไวรัสบางชนิด ยารักษาโรคซึมเศร้า ยารักษาโรคหัวใจบางชนิด แต่หากท่านไม่แน่ใจว่าใช้ยาเหล่านี้อยู่ โปรดปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร

2.2 ข้อควรระวังเมื่อใช้ยานี้

ให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร ในกรณีต่อไปนี้

- ระมัดระวังการใช้ยานี้ในผู้ที่มีอายุน้อยกว่า 18 ปี เพราะยังไม่มีข้อมูลยืนยันความปลอดภัย
- ผู้ป่วยโรคความดันเลือดที่ไม่สามารถควบคุมได้
- ผู้ป่วยโรคหัวใจ หรือหลอดเลือดสมอง เช่น โรคหัวใจเต้นผิดจังหวะ
- ผู้ป่วยที่มีความผิดปกติเกี่ยวกับการมองเห็น
- โรคเบาหวาน โรคไตร่อยดทำงานมากผิดปกติ
- โรคสะกดเงิน
- ผู้ป่วยที่สงสัยว่ามีเนื้องอกต่อมหมวกไต
- ผู้ที่ใส่คอนแทคเลนส์ เพราะยานี้อาจทำให้ตาแห้ง
- ภาวะขาดหรือพร่องเอนไซม์แลคเตส
- ไม่ควรใช้ยานี้ร่วมกับยา อาหาร สมุนไพร หรือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบางชนิด เพราะอาจมีผลต่อการรักษาหรือเกิดอันตรายได้ เช่น ฟลูโคนาโซล ไซเมทีดิน กลุ่มยาลดน้ำตาลในเลือด

3.1 ขนาดและวิธีใช้

- ควรใช้ยาตามคำแนะนำของแพทย์หรือเภสัชกรเท่านั้น เพราะขนาดและระยะเวลาในการใช้ยานี้ขึ้นกับชนิดและความรุนแรงของโรค

3.2 หากลืมกินยาควรทำอย่างไร

- กินยาทันทีที่นึกได้ แต่ถ้าใกล้เวลาของมื้อต่อไปให้รอกินยาของมื้อต่อไป ห้ามกินยาเพิ่มเป็น 2 เท่า

3.2 หากกินยาเกินขนาดควรทำอย่างไร

- ให้สังเกตอาการอย่างใกล้ชิด หากมีอาการผิดปกติที่รุนแรงให้รีบนำส่งโรงพยาบาลทันที

4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างใช้ยา

- พบแพทย์ตามนัดอย่างสม่ำเสมอ เพื่อติดตามผลการรักษาหรืออันตรายจากยา
- ระมัดระวังการขับขี่ยานยนต์ หรือทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักรกล หรือทำงานที่เสี่ยงต่อการพลัดตกจากที่สูง
- หลีกเลี่ยงการกินยานี้ร่วมกับเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์หรือเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลฟรุต
- ห้ามหยุดยาเอง และให้กินยาน้อยอย่างต่อเนื่องตามคำแนะนำของแพทย์ หรือเภสัชกร

5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา

5.1 อาการที่ต้องหยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที

- ลมพิษ บวมที่ใบหน้า เปลือกตาริมฝีปาก
- หน้ามืด เป็นลม แน่นหน้าอก หายใจลำบาก
- ผื่นแดง ตุ่มพอง ผิวหนังหลุดลอก มีจ้ำตามผิวหนัง หรือเลือดออกผิดปกติ
- หัวใจเต้นช้ากว่าปกติ
- ความสามารถในการมองเห็นลดลง
- แขนขาบวม หายใจถี่ กล้ามเนื้ออ่อนแรง
- ปัสสาวะลดลงหรือไม่มีปัสสาวะ

“ให้หยุดยา แล้วรีบไปพบแพทย์ทันที”

5.2 อาการที่ไม่จำเป็นต้องหยุดยา แต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์

- ปวดศีรษะ เวียนศีรษะ บ้านหมุน เป็นลม
- คัดจมูก
- คลื่นไส้ ท้องผูก ท้องเสีย อาเจียน
- ปวดท้อง อาหารไม่ย่อย
- อ่อนเพลีย ปวดแขนขา
- น้ำหนักขึ้น
- มองเห็นแสงจ้า ระคายเคืองตา ตาพร่า ตาแห้ง
- อารมณ์แปรปรวน นอนไม่หลับ สับสน

“ไม่จำเป็นต้องหยุดยา แต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์”

6. ควรเก็บยานี้อย่างไร

- เก็บยาไว้ในบรรจุภัณฑ์เดิมตามที่ได้รับมา
- เก็บยาในที่แห้ง อย่าให้โดนแสงโดยตรง โดยทั่วไปควรเก็บที่อุณหภูมิไม่เกิน 30 องศาเซลเซียส ไม่เก็บยาในที่ร้อนหรือชื้น เช่น ในรถห้องน้ำ ห้องครัว
- ควรแกะยาเมื่อกินในแต่ละครั้งเท่านั้น ห้ามแกะยาออกจากแพคเกจก่อน เพราะยาอาจเสียได้
- เก็บยาให้พ้นมือเด็ก

7. ลักษณะและส่วนประกอบของยานี้

ลักษณะยา

- **คาริวาแลน 6.25/5 มิลลิกรัม:** ยาเม็ดเคลือบฟิล์ม สีขาว รูปหกเหลี่ยม ด้านหนึ่งมีสัญลักษณ์ ☞ และด้านหนึ่งมีคำว่า CI2
- **คาริวาแลน 6.25/7.5 มิลลิกรัม:** ยาเม็ดเคลือบฟิล์ม สีเหลือง รูปหกเหลี่ยม ด้านหนึ่งมีสัญลักษณ์ ☞ และด้านหนึ่งมีคำว่า CI3
- **คาริวาแลน 12.5/5 มิลลิกรัม:** ยาเม็ดเคลือบฟิล์ม สีขาว รูปไข่ ด้านหนึ่งมีสัญลักษณ์ ☞ และด้านหนึ่งมีคำว่า CI4
- **คาริวาแลน 12.5/7.5 มิลลิกรัม:** ยาเม็ดเคลือบฟิล์ม สีขาว รูปไข่ ด้านหนึ่งมีสัญลักษณ์ ☞ และด้านหนึ่งมีคำว่า CI5

ตัวยาสำคัญ: คาร์วีโดลอล และไอวาบราติน

ส่วนประกอบอื่นๆ: Pregelatinised starch (แป้ง), Lactose monohydrate (แลคโตสโมโนไฮเดรต), Microcrystalline cellulose (ไมโครคริสตัลไลน์เซลลูโลส), Croscarmellose sodium (ครอสคาเมลโลสโซเดียม), Maltodextrin (มอลโตเดกซ์ตริน), Silica colloidal anhydrous (ซิลิกาคอลลอยดอลแอนไฮไดรอส), Magnesium stearate (แมกนีเซียมสเตียเรท), Glycerol (กลีเซอรอล), Hypromellose

(ไฮโปพรมเมลโลส), Titanium dioxide (ไททาเนียมไดออกไซด์), Iron oxide yellow (สีเหลือง ไอรอนออกไซด์), Macroglol 6000 (มาโครกลอล 6000)

ผู้ผลิต: เลส แลบบอราทอยเรส เซอร์เวียร์ อินเดียสทรี ประเทศฝรั่งเศส

ผู้นำเข้า: บริษัท เซอร์เวียร์ (ประเทศไทย) จำกัด กรุงเทพฯ, ประเทศไทย

เอกสารนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ XX XXX XXXX

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ของ อย.

- <http://www.fda.moph.go.th/sites/oss/Pages/Main.aspx>
- <http://ndi.fda.moph.go.th/>

เอกสารนี้เป็นข้อมูลโดยย่อ
หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร