

**โพลาทูซูแมบ วิโดทิน**  
**ความแรง 30 หรือ 140 มิลลิกรัม**  
**ยาผงสำหรับฉีด**  
**ชื่อการค้า POLIVY (โพลีวี)**

## 1. ยานี้คืออะไร

### 1.1 ยานี้มีชื่อว่าอะไร

- ยานี้มีชื่อว่า โพลาทูซูแมบ วิโดทิน (polatuzumab vedotin) เป็นยาในกลุ่มโมโนโคลนอลแอนติบอดี

### 1.2 ยานี้ใช้เพื่ออะไร

- ใช้เพื่อรักษาโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลืองชนิดบีเซลล์ ในผู้ป่วยที่กลับเป็นซ้ำหรือดื้อยาและไม่สามารถเข้ารับการรักษาดูแลด้วยการปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดเลือด โดยใช้ร่วมกับยาเบนดามัสทีนและริทูซิแมบ

## 2. ข้อควรระวังก่อนใช้ยา

### 2.1 ห้ามใช้ยานี้เมื่อไร

- เคยแพ้ยานี้ หรือส่วนประกอบของยานี้
- ให้นมลูก

### 2.2 ข้อควรระวังเมื่อฉีดยานี้

- ให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรในกรณีต่อไปนี้
  - เคยมีปัญหาด้านความจำ เคลื่อนไหวลำบาก รู้สึกเหมือนเข็มตำ เจ็บ แสบร้อนเมื่อสัมผัส
  - เคยมีปัญหาด้านสายตา
  - โรคตับ

## 3. วิธีใช้ยา

### 3.1 ขนาดและวิธีใช้

- ควรใช้ยาตามคำแนะนำของแพทย์หรือ เภสัชกร เท่านั้น **เพราะขนาดและระยะเวลาในการใช้ยานี้** ขึ้นกับชนิดและความรุนแรงของโรค
- แพทย์หรือพยาบาลจะเป็นผู้ฉีดยาให้กับท่านโดยวิธีหยดเข้าหลอดเลือดดำ

### 3.2 หากลืมไปฉีดยาควรทำอย่างไร

- หากนึกขึ้นได้ให้รีบไปฉีดยาทันที
- แพทย์จะแจ้งนัดการฉีดยาครั้งต่อไปให้กับท่าน

### 3.3 ถ้าฉีดยาเกินขนาด ควรทำอย่างไร

- ถ้าสงสัยว่าได้รับยาเกินขนาด ให้แจ้งแพทย์ พยาบาล หรือเภสัชกรทันที

## 4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างใช้ยา

- **ผู้หญิง**คุมกำเนิดระหว่างที่ใช้ยานี้ และคุมกำเนิดต่อไปอีกหลังหยุดใช้ยาไปแล้วอย่างน้อย 9 เดือน
- **ผู้ชาย**ต้องใส่ถุงยางอนามัยทุกครั้งเมื่อมีเพศสัมพันธ์ระหว่างที่ใช้ยานี้ และต่อเนื่องไปอีกหลังหยุดใช้ยาไปแล้วอย่างน้อย 6 เดือน
- ระวังการขับขี่ การทำงานกับเครื่องจักรหรือทำงานบนที่สูง **เพราะยานี้**อาจทำให้ท่านรู้สึกเหนื่อยอ่อนเพลีย หรือเวียนหัว
- ห้ามรับวัคซีนระหว่างใช้ยานี้

## 5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา

### 5.1 อาการที่ต้องรีบไปพบแพทย์ทันที

- บวมที่ใบหน้า เปลือกตา ริมฝีปาก ลมพิษ
- หน้ามืด เป็นลม แน่นหน้าอก หายใจลำบาก
- ผื่นแดง ตุ่มพอง ผิวหนังหลุดลอก มีฝ้าตามผิวหนังหรือเลือดออกผิวดิบ
- ตัวเหลือง ตาเหลือง บัสสาวะสีเข้ม คันที่ผิวหนัง
- ติดเชื้อ มีไข้ เป็นเริม งูสวัด
- เดินเซ ตาพร่า หลงลืม พูดลำบาก
- เม็ดเลือดขาวต่ำ หรืออ่อนเพลียมาก

**"หากมีอาการเหล่านี้ให้รีบไปพบแพทย์ทันที"**

### 5.2 หากฉีดยาแล้วเกิดอาการ เช่น

- มีอาการปวด คัน แดง บริเวณที่ฉีดยา
- คลื่นไส้ อาเจียน ปวดท้อง ท้องผูก ท้องร่วง
- เบื่ออาหาร น้ำหนักลด

- ปวดข้อ ชาปลายมือ ปลายเท้า
- "ให้รอดูอาการ แต่ถ้านแรงให้ไปพบแพทย์"**

## 6. ควรเก็บยานี้อย่างไร

- ยานี้เก็บไว้ที่โรงพยาบาล ท่านจะไม่ได้รับยากลับบ้าน
- เก็บยาในตู้เย็นที่อุณหภูมิ 2 ถึง 8 องศาเซลเซียส
- ห้ามแช่แข็ง ห้ามเขย่า

## 7. ลักษณะและส่วนประกอบของยานี้

- **ลักษณะยา** ขวดแก้วบรรจุผงสีขาวถึงสีขาวอมเทา
- **ตัวยาสําคัญ** โพลาทูซูแมบ วิโดทิน 30 มิลลิกรัม หรือ 140 มิลลิกรัม
- **ส่วนประกอบอื่นๆ** ได้แก่ กรดซัคซินิก โซเดียมไฮดรอกไซด์ ซูโครส โพลีซอร์เบท20

**เอกสารนี้เป็นข้อมูลโดยย่อ**  
**หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร**

ค่าเดือน: ยานี้อาจทำให้เกิดอันตรายร้ายแรงได้ ต้องใช้ภายใต้การควบคุมของแพทย์เท่านั้น

ผู้ผลิตโพลีวี 30 มิลลิกรัม: บริษัท เอฟ ฮอฟมันน์ – ลา โรช จำกัด สวิสเซอร์แลนด์

ผู้ผลิตโพลีวี 140 มิลลิกรัม: บริษัท บีเอสพี ฟาร์มาซูติคอล เอส.พี.เอ อิตาลี

ผู้นำเข้า: บริษัท โรช ไทยแลนด์ จำกัด กรุงเทพฯ

ผู้แทนจำหน่าย: บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด เอกสารนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุดเดือน 24 มิถุนายน 2564

**ศึกษาข้อมูลยาเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ของ อย.**

- <http://www.fda.moph.go.th/sites/oss/Pages/Main.aspx>
- <http://ndi.fda.moph.go.th/>