

แมนิดิพิน**ความแรง 10 และ 20 มิลลิกรัม
ชนิดเม็ด****ชื่อการค้า Cardiplot (คาดีพลอท)****1. ยานี้คืออะไร****1.1 ยานี้มีชื่อว่าอะไร**

ยานี้มีชื่อว่า แมนิดิพิน ไฮโดรคลอไรด์ (manidipine hydrochloride) อยู่ในกลุ่มยาควบคุมโรคความดันเลือดสูง

1.2 ยานี้ใช้เพื่ออะไร

เพื่อควบคุมโรคความดันเลือดสูง และโรคความดันเลือดสูงที่มีภาวะไตบกพร่องร่วมด้วย

2. ข้อควรระวังก่อนใช้ยา**2.1 ห้ามใช้ยานี้เมื่อไร**

- เคยแพ้ยานี้ หรือส่วนประกอบของยานี้
- เมื่อตั้งท้องหรือวางแผนว่าจะตั้งท้อง
- เมื่ออยู่ในระยะให้นมลูก

2.2 ข้อควรระวังเมื่อใช้ยานี้**ให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรในกรณีต่อไปนี้**

- หากท่านมีภาวะไตบกพร่องอย่างรุนแรงเพราะอาจทำให้โรครุนแรงขึ้นหรือเกิดอันตรายจากยานี้มากขึ้น
- **ไม่ควรใช้ยานี้ร่วมกับยาต่อไปนี้** เพราะอาจมีผลต่อการรักษา หรืออาจเกิดอันตรายได้ เช่น ยาดีจ็อกซิน และยาไซเมทิดีน

**เอกสารนี้เป็นข้อมูลโดยย่อ
หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร**

3. วิธีใช้ยา**3.1 ขนาดและวิธีใช้**

- **ควรใช้ยาตามคำแนะนำของแพทย์หรือเภสัชกรเท่านั้น** เพราะขนาดและระยะเวลาในการใช้ยานี้ขึ้นกับชนิดและความรุนแรงของโรค
- กินยาวันละครั้งหลังอาหารเช้า

3.2 หากลืมกินยาควรทำอย่างไร

- ให้กินยาทันทีที่นึกได้ แต่ถ้าใกล้เวลาของมื้อต่อไปให้รอกินยาของมื้อต่อไป และห้ามกินยาเพิ่มเป็น 2 เท่า

3.3 ถ้ากินยานี้เกินขนาดที่แนะนำ ควรทำอย่างไร

- ให้สังเกตอาการอย่างใกล้ชิด หากมีอาการผิดปกติที่รุนแรง (เช่น หน้ามืด เวียนหัว หัวใจเต้นเร็วผิดปกติ) ให้รีบนำส่งโรงพยาบาลทันที

4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างใช้ยา

- หากความดันเลือดลดต่ำมาก หรือเกิด อาการวิงเวียน ควรปรึกษาแพทย์ หรือเภสัชกร
- การขับขี่ยานยนต์หรือทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักรกลหรือทำงานที่เสี่ยงต่อการพลัดตกจากที่สูง เป็นสิ่งที่ท่านควรระวัง
- การหยุดใช้ยาแมนิดิพินเองโดยทันทีอาจทำให้ อาการรุนแรงขึ้น หากมีความจำเป็นต้องหยุดใช้ยาแมนิดิพิน ควรได้รับคำแนะนำจากแพทย์หรือเภสัชกร
- พบแพทย์ตามนัดอย่างสม่ำเสมอ เพื่อติดตามผลการรักษาหรืออันตรายจากยา

5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา**5.1 อาการที่ต้องหยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที**

- บวมที่ใบหน้า เปลือกตา ริมฝีปาก ลมพิษ
 - หน้ามืด เป็นลม แน่นหน้าอก หายใจลำบาก
 - ผื่นแดง ตุ่มพอง ผิวหนังหลุดลอก มีจ้ำตามผิวหนังหรือเลือดออกผิดปกติ
- "ให้หยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที"**

5.2 อาการที่ไม่จำเป็นต้องหยุดยา แต่ถ้ามี อาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์

- หน้าแดงร้อน ร้อนตามตัว เยื่อบุตาบวม ใจสั่น หัวใจเต้นเร็ว เป็นต้น
 - มึนงง เวียนหัวเมื่อยืนขึ้น ปวดศีรษะ ง่วงนอนมากผิดปกติ หรือขาดตามร่างกาย
 - คลื่นไส้ อาเจียน เบื่ออาหาร อาการมวนท้อง เสียดท้อง แสบยอดอก ท้องอืด ปวดท้อง ท้องร่วง ท้องผูก ปากแห้ง
 - อ่อนเพลีย บวมตามแขนขา บัสสาวะบ่อย
- "หากมีอาการข้างต้นไม่จำเป็นต้องหยุดยาแต่ถ้ามีอาการรุนแรง ให้ไปพบแพทย์"**

6. ควรเก็บยานี้อย่างไร

- เก็บไว้ในบรรจุภัณฑ์เดิมตามที่ได้รับมา
- เก็บให้พ้นจากแสง
- แยกออกจากแผงเมื่อกินในแต่ละครั้งเท่านั้น
- เก็บยาในที่แห้ง ที่อุณหภูมิไม่เกิน 30 องศาเซลเซียส ไม่เก็บยาในที่ร้อนหรือชื้น เช่น ในรถห้องน้ำ ห้องครัว
- เก็บยาให้พ้นมือเด็ก

7. ลักษณะและส่วนประกอบของยานี้

ยาคาดีพลอท 10 เป็นยาเม็ดกลม สีเหลือง ด้านหนึ่งมีขีดแบ่งครึ่งระหว่างตัวอักษร "B" และ "L" และอีกด้านหนึ่งมีขีดแบ่งครึ่งทับตัวเลข "10"

ยาคาดีพลอท 20 เป็นยาเม็ดกลม สีเหลือง ด้านหนึ่งมีขีดแบ่งครึ่งระหว่างตัวอักษร "B" และ "L" และอีกด้านหนึ่งมีขีดแบ่งครึ่งทับตัวเลข "20"

ส่วนประกอบ

ยาคาดีพลอท 10 และ 20 ประกอบด้วยตัวยามาชนิดป็นไฮโดรคลอไรด์ 10 และ 20 มิลลิกรัม

ส่วนประกอบอื่นๆ ได้แก่ lactose monohydrate, corn starch, low-substituted hydroxypropyl cellulose, hydroxypropyl cellulose-L, magnesium stearate, riboflavin และ purified water

ผู้ผลิต บริษัท เฮอร์ลีนฟาร์มาซูติคอลลินด์สตรี้ จำกัด
เอกสารนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ 11 พฤษภาคม 2563