

ดรอสไพรีโนน
ความแรง 4 มิลลิกรัม
ชนิดเม็ดเคลือบฟิล์ม
ชื่อการค้า Slinda® (สลินดา)

1. ยานี้คืออะไร

1.1 ยานี้มีชื่อว่าอะไร

- ยานี้มีชื่อว่า ดรอสไพรีโนน (drospirenone) เป็นฮอร์โมนโปรเจสโตเจนชนิดเดียว

1.2 ยานี้ใช้เพื่ออะไร

- ใช้เพื่อคุมกำเนิด

2. ข้อควรระวังก่อนใช้ยา

2.1 ห้ามใช้ยานี้เมื่อไหร่

- X** เคยแพ้ยานี้ หรือส่วนประกอบของยานี้
- X** กำลังตั้งท้อง
- X** มีภาวะหลอดเลือดอุดตันผิดปกติ เส้นเลือดขอด
- X** เป็นโรคตับ หรือตับทำงานผิดปกติ
- X** เป็นโรคไตเรื้อรังขั้นรุนแรงหรือไตวายเฉียบพลัน
- X** เป็นหรือเคยเป็น มะเร็งเต้านม มะเร็งปากมดลูก
- X** มีภาวะเลือดออกที่ช่องคลอดผิดปกติ

2.2 ข้อควรระวังเมื่อใช้ยานี้

- ให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร ในกรณีต่อไปนี้
 - ใช้ยา สมุนไพร อาหารเสริมอื่นๆ โดยเฉพาะกลุ่มที่มีโพแทสเซียมเป็นส่วนประกอบ
 - เป็นโรคเบาหวาน ไขมันในเลือดสูง ความดันเลือดสูง โรคลมชัก โรคซึมเศร้า


ผู้ผลิต Laboratorios Leon Farma S.A., Spain
ผู้นำเข้า บริษัท เอ็กเซลทิส (ประเทศไทย) จำกัด
กรุงเทพฯ ประเทศไทย

เอกสารนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุด 17 กุมภาพันธ์ 2564

3. วิธีใช้ยา

3.1 ขนาดและวิธีใช้

- ควรใช้ยาตามคำแนะนำของแพทย์หรือเภสัชกรเท่านั้น
- เริ่มกินยาในวันแรกที่มีประจำเดือน
- กินยานี้วันละ 1 เม็ด ในเวลาเดียวกันทุกวันเริ่มจากหมายเลข 1 แล้วเรียงตามตัวเลขบนแผงยา
- กินยาทุกวันจนหมดแผง จากนั้นเริ่มกินยาแผงใหม่ทันที โดยไม่ต้องหยุดยา



3.2 หากลืมกินยาตามกำหนดควรทำอย่างไร

- กินยาทันทีที่นึกขึ้นได้แล้วกินยาเม็ดต่อไปตามเวลาปกติ และควรใช้ถุงยางอนามัยในช่วง 7 วันนับจากวันที่ลืมกินยา

3.3 ถ้ากินยานี้เกินขนาดที่แนะนำควรทำอย่างไร

- ให้สังเกตอาการ ซึ่งอาจมีอาการผิดปกติเล็กน้อย เช่น คลื่นไส้ อาเจียน เลือดออกจากช่องคลอดเล็กน้อย แต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์

4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างใช้ยา

- ไม่มีข้อมูล

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ของ อย.

<http://www.fda.moph.go.th/sites/oss/Pages/Main.aspx>

<http://ndi.fda.moph.go.th/>

เอกสารนี้เป็นข้อมูลโดยย่อ
หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาแพทย์ หรือเภสัชกร

5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา

5.1 อาการที่ต้องหยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที

- ลมพิษ บวมที่ใบหน้า เปลือกตาริมฝีปาก
- หน้ามืด เป็นลม แน่นหน้าอก หายใจลำบาก
- ผื่นแดง ตุ่มพอง ผิวหนังหลุดลอก มีจ้ำตามผิวหนัง หรือเลือดออกผิดปกติ
- ตัวเหลืองตาเหลือง
- เจ็บหน้าอกรุนแรง ร้าวมาที่แขนหรือลำคอ
- เลือดออกที่ช่องคลอดผิดปกติ
- ปวดขารุนแรง ขาบวมผิดปกติ

“ให้หยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที”

5.2 อาการที่ไม่จำเป็นต้องหยุดยา แต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์

- ปวดศีรษะ คลื่นไส้ ปวดท้อง
- ความรู้สึกทางเพศเปลี่ยนไป ซึมเศร้า
- สิวขึ้น น้ำหนักเพิ่มขึ้นผิดปกติ
- คัดตึงเต้านม ปวดเต้านม
- ประจำเดือนผิดปกติ

“ไม่จำเป็นต้องหยุดยา
แต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์”

6. ควรเก็บยานี้อย่างไร

- เก็บไว้ในบรรจุภัณฑ์เดิมตามที่ได้รับมา
- เก็บยาในที่แห้ง อย่าให้โดนแสงโดยตรงโดยทั่วไปควรเก็บที่อุณหภูมิไม่เกิน 30 องศาเซลเซียส ไม่เก็บยาในที่ร้อนหรือชื้น เช่น ในรถห้องน้ำ ห้องครัว
- เก็บยาให้พ้นมือเด็ก

7. ลักษณะและส่วนประกอบของยา

- ลักษณะยา ยาเม็ดเคลือบฟิล์ม สีขาว 24 เม็ด และสีเขียว 4 เม็ด
- ตัวยาสำคัญ ดรอสไพรีโนน 4 มิลลิกรัม
- ส่วนประกอบอื่น ๆ ได้แก่ ไมโครคริสตัลไลน์เซลลูโลส, แลคโทสแอนไฮดรัส, ซิลิกาคอลลอยดอลแอนไฮดรัส, แมกนีเซียมสเตียเรต, โพลีไวนิลแอลกอฮอล์, ไททาเนียมไดออกไซด์, มาโครกอล, ทาลคัม