

ไมโคฟีโนเลตโมฟีทิล
ความแรง 250 มิลลิกรัม ชนิดแคปซูล
ชื่อการค้า Mycophenolate Teva 250
(ไมโคฟีโนเลต เทวา 250)

1. ยานี้คืออะไร

1.1 ยานี้มีชื่อว่าอะไร

- ยานี้มีชื่อว่า ไมโคฟีโนเลตโมฟีทิล (mycophenolate mofetil) อยู่ในกลุ่มยากดภูมิคุ้มกัน

1.2 ยานี้ใช้เพื่ออะไร

ยานี้ใช้ร่วมกับยาอื่นเพื่อป้องกันร่างกายต่อต้านอวัยวะที่ปลูกถ่าย ได้แก่ ตับ ไต หัวใจ

2. ข้อควรระวังก่อนใช้ยา

2.1 ห้ามใช้ยานี้เมื่อไร

- เคยแพ้ยานี้หรือส่วนประกอบในยานี้
- กำลังตั้งท้องหรือให้นมลูกหรือวางแผนจะตั้งท้อง
- ผู้ป่วยหญิงต้องตรวจภาวะการตั้งท้องก่อน เพราะยาอาจทำให้แท้งหรือทำให้เด็กพิการได้

2.2 ข้อควรระวังเมื่อใช้ยานี้

- ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรหากมีภาวะต่อไปนี้
 - มีอาการของการติดเชื้อ เช่น มีไข้ เจ็บคอ
 - มีรอยช้ำหรือเลือดออกอย่างไม่รู้สาเหตุ
- รู้ว่ามีแผลหรือเลือดออกในทางเดินอาหาร
- ไม่ควรใช้ยานี้ร่วมกับยาบางชนิด เพราะอาจมีผลต่อการรักษาหรือเกิดอันตรายได้ เช่น ยากดภูมิคุ้มกัน • ยาลดกรดหรือยายับยั้งการหลั่งกรด • ยาต้านแบคทีเรียบางชนิด • ยาจับฟอสเฟต • โคลิสไทราซีน • ริแฟมพิซิน • ไอซาวูโคนาโซล • เทลมิซาร์แทน

“ให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร หากไม่แน่ใจว่ากำลังใช้ยาเหล่านี้อยู่”

3. วิธีใช้ยา

3.1 ขนาดและวิธีใช้

- ควรใช้ยาตามคำแนะนำของแพทย์หรือเภสัชกรเท่านั้น เนื่องจากขนาดและระยะเวลาในการใช้ยานี้ขึ้นกับชนิดและความรุนแรงของโรค
- กลืนยาทั้งเม็ด ห้ามหักหรือแบ่งเม็ดยา

3.2 หากลืมกินยา ควรทำอย่างไร

- ให้กินยาทันทีที่นึกได้ แต่ถ้าใกล้เวลาของมื้อต่อไปให้รอกินยาของมื้อต่อไป ห้ามกินยาเพิ่มเป็น 2 เท่า

3.3 ถ้ากินยานี้เกินขนาดที่แนะนำ ควรทำอย่างไร

- ให้สังเกตอาการอย่างใกล้ชิด หากมีอาการผิดปกติที่รุนแรงให้ไปพบแพทย์ทันที

4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างใช้ยา

- พบแพทย์ตามนัดอย่างสม่ำเสมอ เพื่อติดตามผลการรักษาหรืออันตรายจากยา
- แจ้งแพทย์หรือเภสัชกรทุกครั้งที่ได้รับบริการว่ากำลังใช้ยานี้อยู่
- ห้ามหยุดยาเอง ให้กินยานี้ติดต่อกันตามคำแนะนำของแพทย์ หรือเภสัชกร
- ก่อนฉีดวัคซีนให้แจ้งแพทย์หรือพยาบาลทราบ ว่ากำลังใช้ยานี้อยู่ เพราะยานี้อาจลดประสิทธิภาพของวัคซีนชนิดเชื้อเป็น
- ไม่บริจาคเลือดขณะใช้ยานี้และในช่วง 6 สัปดาห์หลังจากหยุดยา
- ต้องคุมกำเนิดระหว่างใช้ยานี้ เพราะยานี้ทำให้เกิดอันตรายต่อทารก และเมื่อรู้ว่าตั้งท้องต้องรีบมาปรึกษาแพทย์ทันที
- ผู้ป่วยชายและคู่นอนควรคุมกำเนิดระหว่างใช้ยานี้และในช่วง 90 วันหลังจากหยุดยา
- ไม่บริจาคอสุจิขณะใช้ยานี้และในช่วง 90 วันหลังจากหยุดยา
- หลีกเลี่ยงแสงแดดโดยสวมใส่เสื้อผ้า และทาครีมกันแดด

5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา

5.1 อาการที่ต้องหยุดยา แล้วรีบไปพบแพทย์ทันที

- บวมที่ใบหน้า เปลือกตา ริมฝีปาก ลมพิษ
- หน้ามืด เป็นลม แน่นหน้าอก หายใจลำบาก
- ผื่นแดง ตุ่มพอง ผิวหนังหลุดลอก มีจ้ำตามผิวหนังหรือเลือดออกผิดปกติ
- มีอาการของโรคติดเชื้อ เช่น มีไข้ เจ็บคอ
- มีรอยช้ำหรือเลือดออกอย่างไม่รู้สาเหตุ

“ให้หยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที”

5.2 อาการที่ไม่จำเป็นต้องหยุดยา แต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์

- อาเจียน วิดกังกกล นอนไม่หลับ เวียนหัว ปวดหัว หัวใจเต้นเร็ว ท้องเสีย ท้องผูก อาหารไม่ย่อย

6. ควรเก็บยานี้อย่างไร

- เก็บยาไว้ในภาชนะบรรจุเดิมตามที่ได้รับมา
- เก็บยาในที่แห้ง อย่าให้โดนแสงโดยตรง เก็บยาในที่อุณหภูมิไม่เกิน 30 องศาเซลเซียส ไม่เก็บยาในที่ร้อนหรือชื้น เช่น ในรถ ห้องน้ำ ห้องครัว
- เก็บยาให้พ้นมือเด็ก

เอกสารนี้เป็นข้อมูลโดยย่อ หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร

7. ลักษณะและส่วนประกอบของยานี้

ไมโคฟีโนเลต เทวา 250 ชนิดแคปซูล

ลักษณะ: แคปซูลชนิดแข็ง ขนาดเบอร์ 1 สีฟ้าอ่อน/ เหลืองอมชมพู มีตัวอักษร 'MMF' บนฝาแคปซูลและมีตัวเลข '250' บนตัวแคปซูล บรรจุซองยาสีขาวถึงขาวนวล

ตัวยาสำคัญ: ไมโคฟีโนเลตโมฟีทิล (Mycophenolate Mofetil 250 มิลลิกรัม)

ส่วนประกอบอื่นๆ:

แคปซูล: ไมโครคริสตัลไลน์เซลลูโลส, โพรโอดิน, ไฮดรอกซีโพรพิลเซลลูโลส, ครอสคาร์เมลโลสโซเดียม, ทัลก์, แมกนีเซียม สเตียเรท

เปลือกแคปซูล: เจลาติน, โซเดียม ลอริล ซัลเฟต, ไททานเนียมไดออกไซด์, ไอรอนออกไซด์ สีแดง, ไอรอนออกไซด์ สีเหลือง, อินดีโก คาร์มิน อลูมิเนียมเลค

หมึกพิมพ์อักษร: เซลแล็ก, ไอรอนออกไซด์ สีดำ

ผู้ผลิต: Intas Pharmaceuticals Limited

Plot No. 457 and 458, Sarkhej – Bavla Highway,
Matoda, Sanand, Ahmedabad – 382 210, Gujarat,
India

ผู้นำเข้า: บริษัท เทวา ฟาร์มา (ประเทศไทย) จำกัด
กรุงเทพฯ ประเทศไทย

เอกสารนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ:
31 มกราคม 2563

เอกสารนี้เป็นข้อมูลโดยย่อ หากมีข้อสงสัยให้
ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร