

วิตามินรวมสำหรับเด็กทารก ชื่อการค้า LSP Multivitamin Syrup for Infant (แอลเอสพี มัลติวิตามิน ไซรัป สำหรับเด็กทารก)

1. ยานี้คืออะไร

1.1 ยานี้มีชื่อว่าอะไร

- ยานี้มีชื่อว่าวิตามินรวมสำหรับเด็กทารก มีตัวยา วิตามินเอ วิตามินบีหนึ่ง วิตามินบีสอง วิตามินบีหก วิตามินบีสิบสอง วิตามินซี วิตามินดีสาม และ นิโคตินาไมด์ เป็นยาในกลุ่มวิตามินและเกลือแร่

1.2 ยานี้ใช้เพื่ออะไร

ยานี้ใช้สำหรับป้องกันการขาดวิตามินในเด็กทารก อายุระหว่าง 6 ถึง 11 เดือน

2. ข้อควรระวังก่อนใช้ยา

2.1 ห้ามใช้ยานี้เมื่อไร

- เคยแพ้ยานี้ หรือส่วนประกอบของยานี้

2.2 ข้อควรระวังเมื่อใช้ยานี้

- ให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร ในกรณีใช้ยาหรือกินวิตามินอยู่

3. วิธีใช้ยา

3.1 ขนาดและวิธีใช้

- ควรใช้ยาตามคำแนะนำของแพทย์หรือเภสัชกรเท่านั้น เพราะขนาดและระยะเวลาในการใช้ยานี้ ขึ้นกับชนิดและความรุนแรงของโรค
- เด็กทารกอายุ 6-11 เดือน รับประทาน ครั้งละ 0.5 มล. วันละ 2 ครั้ง ขนาดรับประทานสูงสุด ต่อวัน คือ 1 มล.

การตรวจด้วยหลอดฉีดยาและการป้อนยา

- ฉีกซองบรรจุหลอดฉีดยา
- ดึงก้านฉีดด้านในของหลอดฉีดยาขึ้น เพื่อดูดยา 0.5 มล. ตรวจสอบในระดับสายตาเพื่อให้แน่ใจว่าดูดยาในปริมาณที่ถูกต้อง
- ฉีดยาเข้าไปบริเวณกระพุ้งแก้มด้านใดด้านหนึ่ง อย่างช้าๆ จนหมด
- ล้างหลอดฉีดยาก่อนเก็บด้วยน้ำสะอาดทุกครั้ง

3.2 หากลืมกินยาควรทำอย่างไร

- ให้กินทันทีที่นึกได้ แต่ถ้าใกล้มื้อถัดไปให้รอกินตามปกติไม่ต้องกินเพิ่มเป็น 2 เท่า

3.3 ถ้ากินยานี้เกินขนาดที่แนะนำ ควรทำอย่างไร

- ให้สังเกตอาการอย่างใกล้ชิด หากมีอาการผิดปกติที่รุนแรง ให้รีบนำส่งโรงพยาบาลทันที

4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างใช้ยา

- ไม่ควรใช้เกินขนาดที่กำหนดไว้ หรือใช้ติดต่อกันเป็นระยะเวลานาน นอกจากแพทย์สั่ง

5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา

5.1 อาการที่ต้องหยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที

- ลมพิษ บวมที่ใบหน้า เปลือกตา ริมฝีปาก
- หน้ามืด เป็นลม แน่นหน้าอก หายใจลำบาก
- ผื่นแดง ตุ่มพอง ผิวหนึ่งหลุดลอก มีจ้ำตามผิวหนึ่งหรือเลือดออกผิดปกติ

“ให้หยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที”

5.2 อาการที่ไม่จำเป็นต้องหยุดยา แต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์

- คลื่นไส้ อาเจียน ท้องอืด อัดอืด ไม่สบายท้อง

“ไม่จำเป็นต้องหยุดยา แต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์”

6. ควรเก็บยาได้อย่างไร

- เก็บไว้ในบรรจุภัณฑ์เดิมตามที่ได้รับมา
- เก็บยาในที่แห้ง อบอุ่น โดยตรง โดยทั่วไป ควรเก็บที่อุณหภูมิไม่เกิน 25 องศาเซลเซียส ไม่เก็บยาในที่ร้อนหรือชื้น เช่น ในรถ ห้องน้ำ ห้องครัว
- เมื่อเปิดใช้แล้วเก็บยาในตู้เย็นได้ 28 วัน ห้ามแช่แข็ง
- เก็บยาให้พ้นมือเด็ก

7. ลักษณะและส่วนประกอบของยานี้

- ลักษณะยา ของเหลวสีส้มขุ่น กลิ่นส้ม
- ตัวยาสําคัญ ใน 1 มล. ประกอบด้วย วิตามินเอ 1500 ไอยู วิตามินบีหนึ่ง 0.50 มก. วิตามินบีสอง 0.50 มก. วิตามินบีหก 0.50 มก. วิตามินบีสิบสอง 0.60 มก. วิตามินซี 50 มก. วิตามินดีสาม 400 ไอยู และ นิโคตินาไมด์ 5.0 มก.
- ส่วนประกอบอื่น ๆ ได้แก่ โพลีออกซิล 40 ไฮโดรจีเนท แคลสเตอร์ออยล์ ซุคราโรส แซนแทน กัม กลิ่นส้ม ฟอสฟอรัส 400 ซีซีแซตเทิลโลว์ (CI. 15985) เมทิลพาราเบน โพรพิลพาราเบน น้ำบริสุทธิ์ สารละลายซอร์บิทอล

ผู้ผลิต ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงงานเลิศสิงห์เภสัชกรรม 922 สุขุมวิท 50 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10260 ประเทศไทย

เอกสารนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ 11 ตุลาคม 2564 ศึกษาข้อมูลยาเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ของ [อย.](http://www.fda.moph.go.th)

- <http://www.fda.moph.go.th/sites/oss/Pages/Main.aspx>
- <http://ndi.fda.moph.go.th/>

เอกสารนี้เป็นข้อมูลโดยย่อ
หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร