

ครีมพริกนาโนอิมอลชัน 0.025%
ชนิดครีมสำหรับทารกและเด็ก
(เอ็น-แคปซิน ครีม)

1. ยานี้ดีอย่างไร

1.1 ยาพริก¹

- ยานี้มีชื่อสารนวัตกรรมครีมพริกนาโนอิมอลชัน (Nanoemulsion capsaicin cream) เป็นยาทาภายนอกที่ใช้สำหรับปวดข้อ และกล้ามเนื้อ

1.2 ยานี้ใช้เพื่ออะไร

- ไข้บรรเทาอาการปวดข้อ และกล้ามเนื้อด้านร่างกาย

2. ข้อควรรู้ก่อนใช้ยา

2.1 ห้ามใช้ยาเมื่อไหร่

- ห้ามใช้ในบุตรคลดที่เคยแพ้แคปไซซินจากพิษจ้ำพากพริก², ชาลิไซเลด เบ็น แอลไพริน หรือยาแก้ปวด แก้กัดเส้น, เมนทอล หรือส่วนประกอบของยานี้
- ห้ามใช้ยาในบริเวณที่มีแพลง รอยถลอก บริเวณที่มีการระคายเคือง หน้า บริเวณตางๆ หรือเนื้อเยื่อที่อ่อนหรือระคายเคืองได้ง่าย
- ห้ามใช้ในเด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี เนื่องจากข้อมูลด้านประสิทธิภาพ และความปลอดภัยไม่เพียงพอ
- ห้ามใช้ในหญิงตั้งครรภ์และให้นมบุตรเนื่องจากสารแคปไซซินสามารถผ่านรกและผ่านน้ำนมได้ ก่อพิษกับバランス ส่วนปลายของทารกได้ และยังไม่มีข้อมูลการใช้ในหญิงตั้งครรภ์และให้นมบุตร²

2.2 ข้อควรระวังเมื่อใช้ยาเมื่อไหร่ หากห้ามมีภาวะต่อไปนี้

- การใช้ยาเมื่อรุนแรงมาก อาจกระตุนและทำให้ไอมากขึ้น¹
- ควรระวังเมื่อใช้ครีมพริกร่วมกับยาในกลุ่มต่อไปนี้
 - กลุ่มยาแอนติโบทีนชัน-คอนเวอร์ตติงเอนไซม์¹
 - กลุ่มยาต้านเกล็ดเลือด กลุ่มยาต้านการแข็งตัวของเสื้อตัว หรือกลุ่มยาละลายลิมฟ์เลือด หากคุณกำลังได้รับยาฟาริน ให้ปรึกษาแพทย์ก่อนใช้ยาเมื่อ¹
 - กลุ่มยาบาร์บีทูเรต¹

- กลุ่มยาขยยายหลอดลมไข้รักษาโรคหอบหืด เช่น ท้ออฟลีนชนิดตอออกฤทธิ์นาน เพราะอาจมีผลต่อการรักษา หรือเกิดอันตรายได้¹ แต่หากท่านไม่แน่ใจว่าใช้ยาเหล่านี้อยู่ โปรดปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร
- การรักษาด้วยความร้อน เช่น ยาทาที่ทาให้ร้อนร้อน แผ่นแปะชนิดร้อน หรือรังสีอินฟราเรด อาจทำให้บริเวณที่ทายาร้อนจนเกินไป²

3. วิธีใช้ยา

3.1 ขนาดและวิธีใช้ ควรใช้ยาตามคำแนะนำของแพทย์หรือเภสัชกร

- ทายาวันละ 1 ครั้งบริเวณข้อหรือกล้ามเนื้อที่ปวด
- ทายางานๆ โดยไม่ต้องกวนดู
- ไม่ควรใช้ยาเมื่อติดต่อกันนานเกิน 3 สัปดาห์ ดองเว้นระยะอย่างน้อย 2 สัปดาห์สังจะหาใหม่ได้³

3.2 หากลิ้นหายาควรห่ออย่างไร

- หากนิ้กขึ้นได้รีบลิ้นหายา ท่านสามารถถ่ายยาบริเวณที่ยังมีอาการปวดได้ แต่ต้องไม่เกินวันละ 1 ครั้ง

3.3 ถ้ากินยาเมื่อกินขนาดที่แนะนำ ควรห่ออย่างไร

- หากหายานี้เกินขนาดอาจรู้สึกแสบร้อนมากกว่าปกติควรห้ามด้วยน้ำมัน ครีม หรือโลชั่น²
- หากมีอาการรุนแรงจนทนไม่ได้ให้ไปพบแพทย์

4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างใช้ยา

- หลังจากหายานึงติดกิจกรรมกลางแจ้ง หรือหลอกเลี้ยงการอยู่กลางแดดโดยตรง³
- เมื่อหายานี้แล้ว ให้รอสักพักเพื่อให้ยาออกฤทธิ์ ห้ามหายาข้ามพระอาทิตย์และร้อนร้อนเกินไปในบริเวณที่ทา³
- เมื่อหายาเสร็จแล้ว
 - กรณีหายานี้เริ่มอื้นก่อจากมือ ให้รีบล้างมือทันที
 - กรณีหายาที่มือ ให้ล้างมือหลังจากหายาไปแล้ว 30 นาที
- อย่าใช้ยาสัมผัสบริเวณดวงตา หรือเนื้อเยื่อผิวที่อ่อน เช่น บริเวณจมูก ปากและตา เป็นต้น
- ไม่ควรใช้ผ้าพันแผลรัดตรงบริเวณที่หายานี้
- หากใช้ยาเมื่อแล้วอาการยังคงร้อนหรือลับมาเป็นข้า ควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร

5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา

5.1 อาการที่ต้องหยุดยาแล้วรับไปพบแพทย์ทันที

- บวมที่ใบหน้า เปลือกดูด ริมฝีปาก ลมพิษ
- หน้ามืด เป็นลม แน่นหน้าอัก หายใจลำบาก
- ผื่นแดง ตุ่มพอง ผิวนองหลุดลอก มีจ้ำตามผิวนัง หรือเลือดออกผิดปกติ

5.2 อาการที่ไม่จำเป็นต้องหยุดยา แต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์

- ผิวนองแดง ปูดและแสบร้อน
- ไอ ระคายเคืองจมูก แสบตา น้ำตาไหล เนื่องจากไอระเหยของครีมพริก

6. ควรเก็บยาเมื่อย่างไร

- เก็บไว้ในภาชนะบรรจุเดิมตามที่ได้รับมา
- เก็บยาในที่แห้ง อย่าให้โดนแสงโดยตรง โดยที่ไว้ปีควรเก็บที่อุณหภูมิต่ำกว่า 25 องศาเซลเซียส ไม่เก็บยาในที่ร้อนหรือชื้น เช่น ในรถ ห้องน้ำ ห้องครัว
- ห้ามแช่แข็ง
- เก็บยาให้พ้นมือเด็ก

มูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาภักดีภูมิศิริ ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าคุณเรือเจ้าฟ้าพะรังษาราชสุда สิริไสวพัฒนาดี ออกสารบัญปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ 18 มกราคม 2561

เอกสารนี้เป็นข้อมูลโดยย่อ
หากมีข้อสงสัยสักวันใดวันหนึ่ง กรุณาปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร

¹ คณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่องบัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ.2558. กรุงเทพฯ, 2558.

² European Medicines Agency. Assessment report on *Capsicum annuum* L. var minimum (Miller) Heiser and small fruited varieties of *Capsicum frutescens* L., fructus. 2015.

³ รัชฎา สมวงศ์กุลศักดิ์, สภาครุ่น ปีดพิพ, ตั้อรัตน์ นลิกวงศ์, ประสิทธิศักดิ์ ครีมพริกสูตรทาวันเดือนผุ่งปีชื่อโรคร้ายเสื่อม. วารสารโรงพยาบาลมหาสารคาม 2551;3:63-9.