

ไอซาวูโคนาโซล

ชนิดผงสำหรับฉีด

ชื่อการค้า CRESEMBA™ (เครสเซมบา™)

1. ยานี้คืออะไร

1.1 ยานี้มีชื่อว่าอะไร

- ยานี้มีตัวยา คือ ไอซาวูโคนาโซล(isavuconazole) เป็นยาต้านเชื้อรา

1.2 ยานี้ใช้เพื่ออะไร

ใช้รักษาโรคติดเชื้อราบางชนิดในผู้ใหญ่ ได้แก่:

- การติดเชื้อรา aspergillosis แบบบลูกลามที่เกิดจากเชื้อราในกลุ่ม 'Aspergillus'
- การติดเชื้อรา mucormycosis ที่เกิดจากเชื้อราในกลุ่ม 'Mucorales' ในผู้ป่วยซึ่งไม่เหมาะสมที่จะได้รับการรักษาด้วยแอมโฟเทอริซิน บี (amphotericin B)

2. ข้อควรระวังก่อนใช้ยา

2.1 ห้ามใช้ยานี้เมื่อไร

- เคยแพ้ยานี้ หรือส่วนประกอบของยานี้
- เคยมีปัญหาเกี่ยวกับการเต้นของหัวใจ
- กำลังใช้ยาชนิดใดต่อไปนี้:

- คีโตโคนาโซล (ketoconazole)
- ริโดนาเวียร์ (ritonavir)
- ริแฟมพิซิน (rifampicin) ไรฟาบูติน (rifabutin)
- คาร์บามาเซพีน (carbamazepine) ซี
- ยาในกลุ่มบาร์บิทูเรต เช่น ฟีนobarbิทัล (phenobarbital)
- เฟนิโทอิน (phenytoin)
- ยาสมุนไพรร St John's wort
- เอฟฟาไวเรนซ์ (efavirenz) อีตราไวรีน (etravirine)
- นาฟซิลลิน (nafcillin)

2.2 ข้อควรระวังเมื่อใช้ยานี้

- แจ้งแพทย์หากเคยแพ้ยาต้านเชื้อราอื่น
- แจ้งแพทย์ถ้าเป็นโรคตับรุนแรง

3. วิธีใช้ยา

3.1 ขนาดและวิธีใช้

- ควรใช้ยาตามคำแนะนำของแพทย์หรือเภสัชกรเท่านั้น เพราะขนาดและระยะเวลาในการใช้ยานี้ขึ้นกับชนิดและความรุนแรงของโรค
- แพทย์หรือพยาบาลจะเป็นผู้ฉีดยาให้กับท่าน โดยหยดเข้าหลอดเลือดดำ

3.2 ถ้าลืมฉีดยาควรทำอย่างไร.

- หากสงสัยว่าท่านไม่ได้รับยาตามปกติ ให้แจ้งแพทย์ พยาบาล หรือเภสัชกรทันที

3.3 ถ้าหากได้รับยาเกินขนาดควรทำอย่างไร

- หากสงสัยว่าได้รับยาเกินขนาด ให้แจ้งแพทย์ พยาบาล หรือเภสัชกรทันที

4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างการใช้

- ยานี้อาจทำให้คุณรู้สึกสับสน เหนื่อย หรือง่วงนอน ทั้งยังสามารถทำให้คุณหมดสติได้ หากเกิดอาการเช่นนี้ขึ้น อย่าขับขียานพาหนะหรือใช้เครื่องจักรกล

5. อันตรายจากยา

5.1 อาการที่ต้องแจ้งแพทย์ พยาบาล หรือเภสัชกรทันที

- มีผื่น ริมฝีปาก ปาก ลิ้น หรือลำคอบวมร่วมกับหายใจลำบากรู้สึกเหนื่อย ตัวเหลือง ตาเหลือง
- มีตุ่มพองรุนแรงที่ผิวหนัง ปาก ตา หรืออวัยวะเพศ
- หายใจไม่ออกหรือหายใจลำบาก

"ให้แจ้งแพทย์ พยาบาล หรือเภสัชกรทันที"

5.2 อาการที่อาจเกิด เมื่อใช้ยา

- ปวดศีรษะ รู้สึกมึนงง กระสับกระส่าย ง่วงนอน
 - มีอาการเป็นเหน็บ ความรู้สึกสัมผัสหรือความรู้สึกในปากลดลง
 - ร้อนวูบวาบ วิดกกังวล ปวดข้อ
 - ปากแห้ง ท้องเสีย อาเจียน การรับรสชาติเปลี่ยนไป
 - อัตราการเต้นของหัวใจเร็วขึ้น ไวต่อแสงมากขึ้น
- "ให้รอดูอาการ แต่ถ้ามีอาการรุนแรง ให้แจ้งแพทย์ พยาบาล หรือเภสัชกร"**

6. ควรเก็บยานี้อย่างไร

- ยานี้เก็บที่อุณหภูมิ 2-8 องศาเซลเซียส
- ยานี้จะเก็บไว้ที่โรงพยาบาล ท่านจะไม่ได้รับกลับบ้าน

7. ลักษณะและส่วนประกอบของยานี้

- ขวดแก้วบรรจุผงยาสีขาวถึงขาวออกเหลือง
- ตัวยาสาคัญ ได้แก่
 - ไอซาวูโคนาโซล 200 มิลลิกรัมยานี้มีแมนนิทอลและกรดซัลฟิวริกเป็นส่วนประกอบ

ผู้นำเข้า บ. ไฟเซอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
เอกสารนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ 10 มีนาคม 2563

**ข้อมูลยานี้เป็นข้อมูลโดยย่อ
หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาแพทย์ หรือเภสัชกร**

PIL Revision no:1.1

PIL date: 10 MAR 2020

Country: Thailand