

โพลีเอทเธน 15 มิลลิกรัม ชนิดเม็ด โพลีเอทเธน 30 มิลลิกรัม ชนิดเม็ด ชื่อการค้า JINARC (จินาร์ค)

1. ยานี้คืออะไร

1.1 ยานี้มีชื่อว่าอะไร

- ยานี้มีชื่อว่าจินาร์ค (JINARC) มีตัวยาโพลีเอทเธน 15 และ 30 มิลลิกรัม เป็นยาในกลุ่ม ยาขับปัสสาวะ

1.2 ยานี้ใช้เพื่ออะไร

ยานี้ใช้เพื่อชะลอการพัฒนาของถุงน้ำและภาวะการทำงานของไตบกพร่องในผู้ป่วยโรคไตเป็นถุงน้ำชนิดที่มีการถ่ายเทของเหลวแบบลักษณะเด่นทางพันธุกรรม

2. ข้อควรระวังก่อนใช้ยา

2.1 ห้ามใช้ยานี้เมื่อไร

- เคยแพ้ยานี้ หรือส่วนประกอบของยานี้ (หรือยาอื่นในกลุ่มเบนซาซีพีน หรืออนุพันธ์ของเบนซาซีพีน เช่น เบนนาเซพริล, เมียร์ตาซาพีน)
- กำลังตั้งครรภ์หรือให้นมบุตร
- เอนไซม์ในตับเพิ่มขึ้น หรือมีอาการของตับอักเสบ เช่น ตาเหลือง ตัวเหลือง ก่อนใช้ยา
- ปัสสาวะไม่ออก
- มีภาวะเลือดออกหรือขาดน้ำอย่างรุนแรง
- ไม่มีความรู้สึกหิวน้ำเมื่อกะหายน้ำ
- มีภาวะโซเดียมในเลือดสูง

2.2 ข้อควรระวังเมื่อใช้ยานี้

- ให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร ในกรณีต่อไปนี้
 - เป็นโรคตับ หรืออาการตัวเหลือง ตาเหลือง
 - ดื่มน้ำไม่เพียงพอหรือถูกจำกัดน้ำ
 - มีปัญหาเกี่ยวกับการปัสสาวะ เช่น ต่อมลูกหมากโต
 - เป็นเบาหวาน
 - มียูริกในเลือดสูง หรือเป็นโรคเกาต์
 - เป็นโรคไต
 - แพ้น้ำตาลแลคโตส

เอกสารนี้เป็นข้อมูลโดยย่อ
หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร

- แจ้งแพทย์หรือเภสัชกรหากท่านต้องใช้ยานี้ร่วมกับยาบางชนิด เช่น ยาฆ่าเชื้อบางชนิด ยารักษาโรคหัวใจบางชนิด ยาแก้อักเสบบางชนิด และยาสมุนไพร บางชนิด เพราะอาจมีผลต่อการรักษา
- ไม่ควรใช้ยานี้ในเด็กอายุต่ำกว่า 18 เนื่องจากยังไม่มีการศึกษาประสิทธิภาพและความปลอดภัย

3. วิธีใช้ยา

3.1 ขนาดและวิธีใช้

- ควรใช้ยาตามคำแนะนำของแพทย์หรือเภสัชกรเท่านั้น เพราะขนาดและระยะเวลาในการใช้ยานี้ขึ้นกับชนิดและความรุนแรงของโรค
- ควรกลืนยาทั้งเม็ด ห้ามเคี้ยว หรือนำน้ำ
- ควรรับประทานก่อนอาหาร 30 นาที ในตอนเช้า
- มีข้อควรระวังในการรับประทานยาพร้อมอาหารหรือไม่พร้อมอาหารก็ได้

3.2 หากลืมกินยาควรทำอย่างไร

- กินยาทันทีที่นึกได้ แต่ถ้าข้ามวันแล้วให้รอกินยามื้อต่อไป
- ห้ามกินยาเป็นสองเท่า เพื่อชดเชยมื้อที่ลืม

3.3 ถ้ากินยานี้เกินขนาดที่แนะนำ ควรทำอย่างไร

- ให้สังเกตอาการอย่างใกล้ชิด หากมีอาการผิดปกติที่รุนแรงให้รีบนำส่งโรงพยาบาลทันที

4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างใช้ยา

- กินยาตรงเวลาตามแพทย์สั่ง
- ดื่มน้ำให้เพียงพอ
- ยานี้อาจทำให้หิว ง่วง ดังนั้นเลี่ยงขับรถหรือทำงานกับเครื่องจักร
- พบแพทย์ตามนัดอย่างสม่ำเสมอ เพื่อติดตามผลการรักษาหรืออันตรายจากยา

5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา

5.1 อาการที่ต้องหยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที

- ลมพิษ บวมที่ใบหน้า เปลือกตา ริมฝีปาก

- หน้ามืด เป็นลม แน่นหน้าอก หายใจลำบาก
- ผื่นแดง ตุ่มพอง ผื่นหนังหลุดลอก มีจุดตามผิวหนังหรือเลือดออกผิดปกติ
- ตัวเหลือง ตาเหลือง

“ให้หยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที”

5.2 อาการที่ไม่จำเป็นต้องหยุดยา แต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์

- กระหายน้ำบ่อย ปัสสาวะบ่อย
- ปวดหัว เวียนศีรษะ อ่อนเพลีย
- ท้องเสีย ปากแห้ง

“ไม่จำเป็นต้องหยุดยา แต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์”

6. ควรเก็บยานี้อย่างไร

- เก็บไว้ในบรรจุภัณฑ์เดิมตามที่ได้รับมา
- เก็บยาในที่แห้ง อบอุ่นโดยแสงโดยตรง โดยทั่วไปควรเก็บที่อุณหภูมิไม่เกิน 30 องศาเซลเซียส ไม่เก็บยาในที่ร้อนหรือชื้น เช่น ในรถ ห้องน้ำ ห้องครัว
- เก็บยาให้พ้นมือเด็ก

7. ลักษณะและส่วนประกอบของยานี้

- ลักษณะยานี้มีความแรงแต่ละความแรงมีสีและสัญลักษณ์ที่แตกต่างกัน ดังนี้
 - เม็ดยาสีฟ้า รูปสามเหลี่ยม ด้านหนึ่งมีรอยสลัก "OTSUKA" และ "15" อีกด้านหนึ่งเรียบ
 - เม็ดยาสีฟ้า รูปสามเหลี่ยม ด้านหนึ่งมีรอยสลัก "OTSUKA" และ "30" อีกด้านหนึ่งเรียบ
- ตัวยาสําคัญ โพลีเอทเธน
- ส่วนประกอบอื่น ๆ ได้แก่ Maize starch (แป้งข้าวโพด) Hydroxypropylcellulose (ไฮดรอกซีโพรพิลเซลลูโลส) Lactose monohydrate (แลคโตสโมโนไฮเดรต) Magnesium stearate (แมกนีเซียมสเตียเรต) Microcrystalline cellulose (ไมโครคริสตัลไลน์ เซลลูโลส) Indigo carmine aluminium lake (อินดิโก คาร์มิน อลูมิเนียม)

ผู้ผลิตผงยา บริษัท โอซูก้า ฟาร์มาซูติคอลล จำกัด,
โทคุชิมะ แพลคตอรี ประเทศ ญี่ปุ่น
ผู้ผลิตเม็ดยา บริษัท โอซูก้า ฟาร์มาซูติคอลล จำกัด,
โทคุชิมะ ไอดาโน แพลคตอรี ประเทศ ญี่ปุ่น
ผู้แบ่งบรรจุยา พีทีไอไอ โอซูก้า อินโดนีเซีย ประเทศ
อินโดนีเซีย
ผู้นำเข้า บริษัทไทยโอซูก้า จำกัด ประเทศไทย
ผู้แทนจำหน่าย บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด
ประเทศไทย

เอกสารนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ 5 มกราคม 2565

ศึกษาข้อมูลยาเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ของ อย.

- <http://www.fda.moph.go.th/sites/oss/Pages/Main.aspx>
- <http://ndi.fda.moph.go.th/>