

**ทีโมโซโลไมด์**  
**ความแรง 20 และ 100 มิลลิกรัม**  
**ชนิดแคปซูล**  
**ชื่อการค้า BIARUS (เบียริส)**

## 1. ยานี้คืออะไร

### 1.1 ยานี้มีชื่อสามัญว่าอะไร

- ยานี้มีชื่อว่าเบียริส (Biarus) มีตัวยา ทีโมโซโลไมด์ (Temozolomide) เป็นยาในกลุ่มยาเคมีบำบัด

### 1.2 ยานี้ใช้เพื่ออะไร

ยานี้ใช้รักษาเนื้องอกในสมองในเด็กหรือผู้ใหญ่ ที่แพทย์วินิจฉัยแล้วว่าเหมาะสม

## 2. ข้อควรระวังก่อนใช้ยา

### 2.1 ห้ามใช้ยานี้เมื่อไหร่

- เคยแพ้ยานี้ หรือยาตาคาร์บาซีน หรือส่วนประกอบอื่นๆของยานี้
- ห้ามใช้ในผู้มีเม็ดเลือดขาว หรือเกล็ดเลือดลดต่ำลงมากๆ

### 2.2 ข้อควรระวังเมื่อใช้ยานี้

- แจ้งแพทย์หากท่านอยู่ในกลุ่มต่อไปนี้
  - มีแนวโน้มจะติดเชื้อรุนแรงที่ปอด
  - เคยติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบี
  - มีปัญหาตับ หรือไตทำงานผิดปกติ
- ไม่ควรใช้ยานี้ในเด็กอายุต่ำกว่า 3 ปี เพราะยังไม่มีข้อมูลด้านประสิทธิภาพและความปลอดภัย
- แจ้งแพทย์หรือเภสัชกร**หากท่านตั้งครรภ์ มีแผนจะตั้งครรภ์หรือให้นมบุตร เพราะไม่มีข้อมูลความปลอดภัยของทารก
- แจ้งแพทย์และเภสัชกรเสมอว่ากำลังใช้ ยา หรือผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร หรือสมุนไพรชนิดใดอยู่บ้าง เนื่องจากอาจเกิดปฏิกิริยาต่อกันซึ่งมีผลต่อการรักษา หรือเกิดอันตรายได้
- ยานี้อาจทำให้ผู้ชายเป็นหมันถาวร จึงแนะนำให้ปรึกษาแพทย์เกี่ยวกับการเก็บสเปิร์มก่อนการรักษา และไม่ควรมีบุตรหลังจากหยุดการรักษาไปแล้วอย่างน้อย 6 เดือน

## 3. วิธีใช้ยา

### 3.1 ขนาดและวิธีใช้

- ควรใช้ยาตามคำแนะนำของแพทย์หรือเภสัชกรเท่านั้น เพราะขนาดและระยะเวลาในการใช้ยานี้ขึ้นกับชนิดและความรุนแรงของโรค
- กินยาวันละ 1 ครั้งก่อนอาหารอย่างน้อย 1 ชั่วโมง และควรกินยาในเวลาเดียวกันของทุกวัน
- ให้กลืนยาทั้งแคปซูล ห้ามเปิด บด หรือเคี้ยวแคปซูล
- หากแคปซูลแตก ห้ามให้ผงยาโดนผิวหนัง ตา หรือจมูก หากโดนผิวหนัง ตา หรือจมูก ให้รีบล้างด้วยน้ำสะอาด

### 3.2 ถ้าหากลืมกินยาควรทำอย่างไร

- ให้กินยาทันทีที่นึกได้ หากเลยวันไปแล้วให้ติดต่อกับแพทย์ ห้ามกินยาเพิ่มเป็น 2 เท่า

### 3.3 หากกินยาเกินขนาดที่แนะนำควรทำอย่างไร

- ให้รีบนำส่งโรงพยาบาลพร้อมนำยาไปด้วย

## 4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างใช้ยา

- พบแพทย์ตามนัดทุกครั้งเพื่อติดตามผลการรักษา หรืออันตรายจากยา
- ทั้งผู้ชายและผู้หญิงควรคุมกำเนิดระหว่างใช้ยานี้
- ระมัดระวังการขับขี่ยานพาหนะ หรือทำงานที่เกี่ยวข้องกับเครื่องจักร หรือทำงานที่เสี่ยงต่อการพลัดตกจากที่สูง

## 5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา

### 5.1 อาการที่ต้องหยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที

- บวมที่ใบหน้า เปลือกตา ริมฝีปาก ลมพิษ
- หน้ามืด เป็นลม แน่นหน้าอก หายใจลำบาก
- ผื่นแดง ตุ่มพอง ผิวหนังหลุดลอก มีฝ้าตามผิวหนัง หรือเลือดออกผิดปกติ
- ชัก มีไข้ หนาวสั่น
- ปวดหัวรุนแรง

**"ให้หยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที"**

### 5.2 อาการที่ไม่จำเป็นต้องหยุดยา แต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์ทันที

- คลื่นไส้ อาเจียน ท้องเสีย ท้องผูก เบื่ออาหาร
- ปวดหัว อ่อนเพลีย พุดลำบาก
- ผื่น ผื่นร่วง

**"ไม่จำเป็นต้องหยุดยา แต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์"**

## 6. ควรเก็บยานี้อย่างไร

- เก็บไว้ในบรรจุภัณฑ์เดิมตามที่ได้รับมา
- เก็บในที่แห้ง อย่าวางให้โดนแสงโดยตรง โดยทั่วไปควรเก็บที่อุณหภูมิต่ำกว่า 30 องศาเซลเซียส ไม่เก็บยาในที่ร้อนหรือชื้น เช่น ในรถ ห้องน้ำ ห้องครัว
- เก็บยาให้พ้นมือเด็ก

## 7. ลักษณะและส่วนประกอบของยานี้

### • ลักษณะยา

20 mg: แคปซูลเบอร์ 2 สีเหลือง-ขาว พิมพ์ตัวอักษร "TEMOZOLOMIDE" และ "20 mg" สีดำบนแคปซูล บรรจุผงยาสีเกือบขาวถึงชมพูอ่อน

100 mg: แคปซูลเบอร์ 2 สีชมพู-ขาว พิมพ์ตัวอักษร "TEMOZOLOMIDE" และ "100 mg" สีดำบนแคปซูล บรรจุผงยาสีเกือบขาวถึงชมพูอ่อน

### • **ตัวยาสำคัญ** ทีโมโซโลไมด์

• **ส่วนประกอบอื่นๆ** ได้แก่ แลคโตส แอนไฮดรัส, โซเดียม สตาเรช โกลโคเลท, ซิลิกา คอลลอยดอล, ทาทาร์ริก แอซิด, สเตียริก แอซิด

**คำเตือน:** ยานี้อาจทำให้เกิดอันตรายร้ายแรงได้ ต้องใช้ภายใต้การควบคุมของแพทย์เท่านั้น  
ผู้ผลิต Reliance Life Science Private Limited ประเทศ India

ผู้นำเข้า บริษัท เมต้า ฟาร์มาร์ (ประเทศไทย) จำกัด  
เอกสารนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ เมษายน 2564

**ศึกษาข้อมูลยาเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ของ อย.**

- <http://fda.moph.go.th/sites/oss/Pages/Main.a.spx>
- <http://ndi.fda.moph.go.th>

**เอกสารนี้เป็นข้อมูลโดยย่อ หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร**

