

ไอริโนทีแคน
4.3 มิลลิกรัม ต่อ มิลลิลิตร
ชนิดสารละลายเข้มข้น
สำหรับกระจายตัว
สำหรับหยดเข้าหลอดเลือดดำ
ชื่อการค้า ONIVYDE (ออนิวายด์)

1. ยานี้คืออะไร

1.1 ยานี้มีชื่อว่าอะไร

- ยานี้มีชื่อว่า ไอริโนทีแคน (irinotecan) มีตัวยา 4.3 มิลลิกรัม ต่อ มิลลิลิตร

1.2 ยานี้ใช้เพื่ออะไร

ยานี้ใช้ร่วมกับยาอื่น เพื่อรักษาโรคมะเร็งตับอ่อน ระยะแพร่กระจายในผู้ป่วยผู้ใหญ่ที่มี Eastern Co-operation Oncology Group (ECOG) performance status ตั้งแต่ 0 ถึง 2 ซึ่งแพทย์พิจารณาแล้วว่าจำเป็นต้องใช้ยานี้

2. ข้อควรระวังก่อนใช้ยา

2.1 ห้ามใช้ยานี้เมื่อไร

- เคยแพ้ยานี้ หรือส่วนประกอบของยานี้
- หญิงมีครรภ์ให้หลีกเลี่ยงการใช้ยานี้
- หญิงให้นมบุตรควรหลีกเลี่ยงการใช้ยานี้

2.2 ข้อควรระวังเมื่อใช้ยานี้

- ภาวะเม็ดเลือดขาวชนิดนิวโทรฟิลต่ำ
- ภาวะกตการทำงานของไขกระดูก
- หลีกเลี่ยงการให้วัคซีนเชื้อเป็นหรือเชื้อเป็นที่ทำให้อ่อนฤทธิ์ในผู้ป่วยที่มีภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่องจากการได้รับออนิวายด์
- ไม่ควรใช้ยานี้ร่วมกับยา อาหาร สมุนไพร หรือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบางชนิด เพราะมีผลต่อการรักษาหรือเกิดอันตรายได้
- มีประวัติเคยเข้ารับการตัดสวนหัวของตับอ่อน

- ภาวะลิ่มเลือดอุดตัน
- ความเป็นพิษต่อปอด
- ผู้ป่วยที่มีภาวะตับบกพร่องรุนแรง
- ผู้ป่วยที่มีภาวะไตบกพร่อง
- ผู้ป่วยที่มีน้ำหนักตัวน้อย (ดัชนีมวลกายน้อยกว่า 18.5 กิโลกรัม/ตารางเมตร)
- ต้องคุมกำเนิดอย่างมีประสิทธิภาพด้วยวิธีที่ไม่ใช่การกินยาคุมกำเนิดในระหว่างและหลังจากที่ได้รับยานี้

3. วิธีใช้ยา

3.1 ขนาดและวิธีใช้

- ควรใช้ยาตามคำแนะนำของแพทย์หรือเภสัชกรเท่านั้น เพราะขนาดและระยะเวลาในการใช้ยานี้ขึ้นกับชนิดและความรุนแรงของโรค

3.2 หากลืมนำยาดูควรทำอย่างไร

- ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรเมื่อลืมนำยาดู

4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างใช้ยา

- ผู้หญิงวัยเจริญพันธุ์ควรใช้วิธีคุมกำเนิดที่มีประสิทธิภาพระหว่างที่ได้รับการรักษาและอย่างน้อย 1 เดือนหลังจากหยุดใช้ยานี้
- ผู้ชายควรใช้ถุงยางอนามัยระหว่างที่ได้รับการรักษาและ 4 เดือนหลังจากหยุดใช้ยานี้
- ผู้หญิงที่กำลังให้นมลูก ต้องงดให้นมลูกตลอดระยะเวลาการรักษาจนถึง 1 เดือนหลังได้รับยาครั้งสุดท้าย
- ระมัดระวังการขับขี้นานยนต์หรือทำงานกับเครื่องจักรในระหว่างที่ได้รับยานี้

5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา

5.1 อาการที่ต้องหยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที

- ลมพิษ บวมที่ใบหน้า เปลือกตาริมฝีปาก
- หน้ามืด เป็นลม แน่นหน้าอก หายใจลำบาก
- ผื่นแดง ตุ่มพอง ผิวหนังหลุดลอก มีจ้ำตามผิวน้ำหรือเลือดออกผิดปกติ
- มีไข้สูง
- ภาวะช็อกเหตุพิษติดเชื้อ ติดเชื้อในกระแสเลือด
- ปอดอักเสบ
- มีอาการของภาวะลิ่มเลือดอุดตัน: อาการที่ควรสังเกต คือ
 - ปวดขา ขาบวมและกดเจ็บ
 - เหงื่อหอบ หายใจถี่ เจ็บหน้าอก และไอเป็นเลือด
 - ปวดศีรษะรุนแรงและต่อเนื่อง หน้าเบี้ยว ปากเบี้ยว พูดไม่ชัด

“หากมีอาการเหล่านี้ ให้หยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที”

5.2 อาการที่ไม่จำเป็นต้องหยุดยา แต่มีอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์

- ท้องเสีย คลื่นไส้ อาเจียน
- อ่อนเพลีย หดแรง วิงเวียน
- นอนไม่หลับ
- หายใจลำบาก ออกเสียงลำบาก
- เยื่อช่องปากอักเสบ ปวดท้อง ริดสีดวง
- ผมรั้ง
- บวมที่ปลายมือปลายเท้า
- น้ำหนักลด ความอยากอาหารลดลง

“ให้รอดูอาการไม่จำเป็นต้องหยุดยา แต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์”

6. ควรเก็บยานี้อย่างไร

- ยานี้เก็บไว้ที่โรงพยาบาล ท่านจะไม่ได้รับกลับบ้าน

- เก็บยาไว้ในบรรจุภัณฑ์เดิมตามที่ได้รับมา
- เก็บยาในที่แห้ง อย่าให้โดนแสงโดยตรง โดยทั่วไปควรเก็บที่อุณหภูมิ 2-8 องศาเซลเซียส ไม่เก็บยาในที่ร้อนหรือชื้น
- เก็บยานี้ไว้ในตู้เย็น ห้ามแช่แข็ง
- เก็บยาให้พ้นมือเด็ก

7. ลักษณะและส่วนประกอบของยานี้

- ไวแอลบรจซาร์ละลายที่มีการกระจายตัวของไลโปโซมแบบไอโซโทนิก สีขาวถึงสีเหลืองอ่อน และขุ่น ปริมาตร 10 มิลลิลิตร
- ตัวยาสำคัญ ไอร์โนทีแคน 43 มิลลิกรัม
- ส่วนประกอบอื่นๆ ได้แก่ ซูโครส ออกตาซัลเฟต, บัฟเฟอร์ HEPES, โซเดียมคลอไรด์, น้ำสำหรับยาฉีด

ผู้ผลิต: อีพเซ็น ไบโอไซน์,ไอ เอ็น ซี
ประเทศสหรัฐอเมริกา

ผู้นำเข้า: บริษัท เซอร์เวียร์ (ประเทศไทย) จำกัด
กรุงเทพฯ, ประเทศไทย

เอกสารนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ
22 พฤษภาคม 2565

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ของ อย.

- <http://www.fda.moph.go.th/sites/oss/Pages/Main.aspx>
- <http://ndi.fda.moph.go.th/>

เอกสารนี้เป็นข้อมูลโดยย่อ
หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร