

อีโพอีทิน-แอลฟา
2000 ใอายุ, 4000 ใอายุ
ชนิดสารละลายบรรจุหลอดยาพร้อมฉีดยา
ชื่อการค้า PANPOTIN (แพนโพทิน)

1. ยานี้คืออะไร

1.1 ยานี้มีชื่อว่าอะไร

- ยานี้มีชื่อว่า อีโพอีทิน-แอลฟา (epoetin-alfa) เป็นยากลุ่มกระตุ้นการสร้างเม็ดเลือดแดง

1.2 ยานี้ใช้เพื่ออะไร

- ยานี้ใช้เพื่อรักษาภาวะเลือดจางจากโรคไตเรื้อรัง

2. ข้อควรระวังก่อนใช้ยา

2.1 ห้ามใช้ยานี้เมื่อไร

- เคยแพ้ยานี้ ส่วนประกอบของยานี้
- ห้ามใช้ยานี้ในผู้ป่วยที่มีภาวะไขกระดูกไม่สร้างเม็ดเลือดแดง
- ห้ามใช้ยานี้ในผู้ป่วยความดันเลือดสูงที่ไม่สามารถควบคุมได้
- ห้ามใช้ยานี้ในผู้ป่วยที่ต้องรับการผ่าตัดและไม่สามารถใช้ยาต้านการแข็งตัวของเลือดได้
- ห้ามใช้ยานี้กับผู้ป่วยที่มีโรคเกี่ยวกับหลอดเลือดที่ไปเลี้ยงสมอง

2.2 ข้อควรระวังเมื่อใช้ยานี้

- ให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร ในกรณีต่อไปนี้
 - แจ้งแพทย์ ถ้ากำลังตั้งท้อง หรือให้นมบุตร
 - แจ้งแพทย์ ถ้าเป็นโรคความดันเลือดสูง
 - แจ้งแพทย์ ถ้ามีประวัติโรคลมชัก
 - แจ้งแพทย์ ถ้ามีภาวะหลอดเลือดตีบตัน
 - แจ้งแพทย์ ถ้ามีการทำงานของไตบกพร่อง
 - แจ้งแพทย์ ถ้าเคยใช้ยากกระตุ้นการสร้างเม็ดเลือดมาก่อน

3. วิธีใช้ยา

3.1 ขนาดและวิธีใช้

- ควรใช้ยาตามคำแนะนำของแพทย์หรือเภสัชกรเท่านั้น เพราะขนาดและระยะเวลาในการใช้ยานี้ขึ้นกับชนิดและความรุนแรงของโรค
- แพทย์จะให้ท่านมารับยา พร้อมกับรับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมในโรงพยาบาลหรือคลินิก โดยแพทย์หรือพยาบาลจะเป็นผู้ฉีดยาให้ท่าน เข้าทางสายต่อเครื่องไตเทียม

3.2 หากลืมฉีดยาควรทำอย่างไร

- ให้แจ้งโรงพยาบาลหรือคลินิกที่ท่านรักษา เพื่อเข้าไปฉีดยาทันทีที่นึกขึ้นได้

3.3 หากสงสัยว่าได้รับยาเกินขนาดควรทำอย่างไร

- ให้สังเกตอาการอย่างใกล้ชิด หากมีอาการผิดปกติที่รุนแรง ให้แจ้งแพทย์หรือพยาบาลทันที

4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างการใช้อยา

- พบแพทย์ตามนัดอย่างสม่ำเสมอ เพื่อติดตามผลการรักษาหรืออันตรายจากยา
- ระหว่างการใช้อยานี้ต้องตรวจวัดความดันเลือดอย่างสม่ำเสมอ
- ต้องแจ้งแพทย์ทราบก่อนผ่าตัด ว่าใช้ยานี้อยู่
- กินยาเสริมธาตุเหล็กหรือยาบำรุงเลือดอย่างต่อเนื่องตามคำแนะนำของแพทย์หรือเภสัชกร

5. อันตรายที่เกิดจากยา

5.1 อาการที่ต้องแจ้งแพทย์ เภสัชกร หรือพยาบาลทันที

- ลมพิษ บวมที่ใบหน้า เปลือกตา ริมฝีปาก
- หน้ามืด เป็นลม แน่นหน้าอก หายใจลำบาก
- ผื่นแดง ตุ่มพอง ผิวหนังหลุดลอก มีจ้ำตามผิวหนัง
- มีอาการของลิ่มเลือดอุดตัน เช่น หายใจลำบาก ปวดแน่นหน้าอก ปวดขา แขนขาซีดเย็น มึนงง พุดลำบาก พุดไม่ชัด

5.2 อาการที่อาจเกิดขึ้นได้และให้รอดูอาการ แต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้แจ้งแพทย์ เภสัชกร หรือพยาบาลทันที

- ท้องเสีย คลื่นไส้ อาเจียน
- ความดันเลือดเพิ่มขึ้นสูง ปวดหัว ปวดกระดูก และกล้ามเนื้อ มีอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่

“หากมีอาการรุนแรงหรือทนไม่ได้ให้ไปพบแพทย์”

6. ควรเก็บยานี้อย่างไร

- ยานี้เก็บไว้ที่โรงพยาบาลหรือคลินิกที่ท่านรักษา ท่านจะไม่ได้รับกลับบ้าน

7. ลักษณะและส่วนประกอบของยานี้

- ลักษณะยา** ยาฉีดชนิดน้ำใส ไม่มีสี บรรจุในหลอดยาพร้อมฉีดยา
- ตัวยาสําคัญ**
 - ความแรงของยาแพนโพทิน 2000 ใอายุ ประกอบด้วย อีโพอีทิน-แอลฟา 2000 ใอายุ/0.5 มิลลิลิตร
 - ความแรงของยาแพนโพทิน 4000 ใอายุ ประกอบด้วย อีโพอีทิน-แอลฟา 4000 ใอายุ/0.4 มิลลิลิตร

- **ส่วนประกอบอื่น ๆ ได้แก่**
Pi Thai
โชนเดียมฟอสเฟตโมโนเบสิกไดไฮเดรต,
โชนเดียมฟอสเฟตไดเบสิกไดไฮเดรต, ไกลซีน,
โพลีซอเบท 80, โชนเดียมคลอไรด์,
น้ำกลั่นสำหรับฉีด

ผู้ผลิต: PanGen Biotech Inc., South Korea

ผู้แบ่งบรรจุ: Korea Vaccine Co., Ltd., South Korea

ผู้นำเข้า/ผู้แทนจำหน่าย:

บริษัท ส.เจริญเภสัชเทรตติ้ง จำกัด, กรุงเทพมหานคร

เอกสารนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ 19 กรกฎาคม 2567

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ของ อย.

- <https://ndi.fda.moph.go.th/>

**เอกสารนี้เป็นข้อมูลโดยย่อ
หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร**