

ไอรอนซูโครส
ความแรง 20 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร
ชนิดสารละลายสำหรับฉีด
ชื่อการค้า IRON SUCROSE
MYLAN
(ไอรอน ซูโครส ไมแลน)

1. ยานี้คืออะไร

1.1 ยานี้มีชื่อว่าอะไร

ยานี้มีชื่อว่า ไอรอนซูโครส (Iron sucrose) มีตัวยา ไอรอน 20 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร เป็นยาในกลุ่ม ธาตุเหล็ก

1.2 ยานี้ใช้เพื่ออะไร

ยานี้ใช้รักษาภาวะขาดธาตุเหล็กที่แพทย์พิจารณาแล้วว่าต้องใช้นานี้

2. ข้อควรระวังก่อนใช้ยา

2.1 ห้ามใช้ยานี้เมื่อไร

- เคยแพ้ยานี้ หรือส่วนประกอบของ ยานี้ หรือธาตุเหล็กชนิดฉีดอื่นๆ
- ห้ามใช้ในโรคเลือดจางที่ไม่ได้ขาดธาตุเหล็ก หรือ เคยแพ้ธาตุเหล็กตัวอื่นๆ
- ห้ามใช้ในภาวะธาตุเหล็กเกิน หรือร่างกายใช้ธาตุ เหล็กไม่ได้

2.2 ข้อควรระวังเมื่อใช้ยานี้

ให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร ในกรณีต่อไปนี้

- เป็นโรคภูมิแพ้ หรือเคยแพ้ยาใดๆ
- เป็นโรคเอสแอลอี
- เป็นโรคข้ออักเสบรูมาตอยด์
- เป็นโรคหอบที่รุนแรง
- เป็นโรคผิวหนังอักเสบ
- เป็นโรคติดเชื้อ
- มีภาวะตับทำงานบกพร่อง
- กำลังตั้งท้องหรือให้นมบุตร

“ให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร หากมีภาวะดังกล่าว”

3. วิธีใช้ยา

3.1 ขนาดและวิธีใช้

- “ควรใช้ยาตามคำแนะนำของแพทย์หรือเภสัชกร เท่านั้น” เพราะขนาดและระยะเวลาในการใช้ยานี้ ขึ้นกับชนิดและความรุนแรงของโรค
- แพทย์หรือพยาบาลจะเป็นผู้ฉีดยาให้กับท่านโดยฉีด เข้าทางหลอดเลือดดำ
- หลังจากใช้ยานี้แล้วแพทย์หรือพยาบาลจะสังเกตเพื่อ ฝ้าระวังการแพ้ยาอย่างน้อย 30 นาที

3.2 ถ้าฉีดยานี้เกินขนาด ควรทำอย่างไร

- ถ้าสงสัยว่าได้รับยาเกินขนาด ให้แจ้งแพทย์พยาบาล หรือเภสัชกร

4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างใช้ยา

- ให้รับยานี้ตามคำแนะนำของแพทย์

5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา

5.1 อาการที่ต้องรีบแจ้งแพทย์ พยาบาล หรือเภสัชกรทันที

- ลมพิษ บวมที่ใบหน้า เปลือกตาริมฝีปาก
- หนมึด เป็นลม แน่นหน้าอก หายใจลำบาก หัวใจเต้น ผิดปกติ
- ผื่นแดง ตุ่มพอง ผิวหนังหลุดลอก มีจ้ำตามผิวหนัง หรือเลือดออกผิดปกติ
- ระคายเคืองบริเวณที่ฉีดหรือผิวเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาล **“หากมีอาการเหล่านี้ให้แจ้งแพทย์พยาบาล หรือเภสัชกรทันที”**

5.2 อาการที่อาจเกิดขึ้นได้

- คลื่นไส้ อาเจียน ปวดหัว เวียนหัว การรับรส เปลี่ยนไป มีอาการชา
- ร้อน วูบวาบ ปวดท้อง ท้องผูก ท้องร่วง
- ปวดบริเวณที่ฉีด ปวดแขน ปวดขา ตะคริว **“ให้รอดูอาการ แต่ถ้ามีอาการรุนแรง ให้แจ้งแพทย์ พยาบาล หรือเภสัชกร”**

6. ควรเก็บยานี้อย่างไร

- ยานี้เก็บไว้ที่โรงพยาบาล ท่านจะไม่ได้รับกลับบ้าน
- เก็บยาให้พ้นแสง เก็บที่อุณหภูมิต่ำกว่า 30 องศา เซลเซียส
- ห้ามแช่แข็ง

7. ลักษณะและส่วนประกอบของยานี้

ลักษณะและสีของยา สารละลายใส สีน้ำตาล บรรจุในขวดแก้ว ปิดด้วยจุกยางและครอบหีบด้วยฝาอะลูมิเนียม **ตัวยาสําคัญ ประกอบด้วย** ไอรอนซูโครส 20 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร

ส่วนประกอบอื่นๆ ได้แก่ น้ำสำหรับฉีด(water for injection) และโซเดียมไฮดรอกไซด์ (sodium hydroxide)

ผลิตโดย: ไมแลน แลบอราทอรีส์ ลิมิเตด (HSF) ประเทศอินเดีย

นำเข้าโดย: บริษัท เมต้า ฟามาร์ (ประเทศไทย) จำกัด เอกสารนี้ปรับปรุงครั้งสุดท้ายเมื่อ: 10 มีนาคม 2564

ศึกษาข้อมูลยาเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ของ อย.

- <http://www.fda.moph.go.th/sites/oss/Pages/Main.aspx>
- <http://ndi.fda.moph.go.th/>

เอกสารนี้เป็นข้อมูลโดยย่อ หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร