

pi-
ผงแห่งของเชื้อยีสต์
แซคคาโรมายเซส บิวลาดีอี 250 มิลลิกรัม
ชนิดแคปซูล
ชื่อการค้า NORMAPRO (นอร์มาโปร)

1. ยานี้คืออะไร

- 1.1 ยานี้มีชื่อว่าอะไร**
- ยานี้มีชื่อว่านอร์มาโปร (Normapro) มีตัวยา คือ ผงแห่งของเชื้อยีสต์แซคคาโรมายเซส บิวลาดีอี 250 มิลลิกรัม เป็นยาในกลุ่มจุลินทรีย์รักษาอาการท้องเสีย
- 1.2 ยานี้ใช้เพื่ออะไร**
- ปรับสมดุลของแบคทีเรียในลำไส้ให้ทำงานได้ปกติ
 - รักษาอาการท้องเสียเฉียบพลัน
 - ป้องกันอาการท้องเสียระหว่างเดินทาง
 - ป้องกันอาการท้องเสียจากการกินยาปฏิชีวนะ
 - รักษาโรคที่เกี่ยวข้องกับเชื้อแบคทีเรียคลอสตริเดียม ดิฟฟิไซล์ เช่น โรคลำไส้อักเสบจากการกินยาปฏิชีวนะ
 - ลดอาการไม่พึงประสงค์ของยาปฏิชีวนะที่ใช้ในการรักษาการติดเชื้อแบคทีเรียเฉียบพลัน เช่น อาการท้องเสียรักษาโรคลำไส้แปรปรวน

2. ข้อควรระวังก่อนใช้ยา

- 2.1 ห้ามใช้ยานี้เมื่อไร**
- ⊗ ผู้ที่แพ้ต่อเชื้อยีสต์ หรือส่วนประกอบของแคปซูล
 - ⊗ ผู้ที่มีอาการแพ้น้ำตาลแลคโตส
 - ⊗ ห้ามใช้ในผู้ป่วยดังต่อไปนี้
 - ผู้ป่วยที่มีระบบภูมิคุ้มกันบกพร่องอย่างหนัก เช่น ผู้ป่วยที่ติดเชื้อเอชไอวี ผู้ที่ได้รับการปลูกถ่ายอวัยวะ
 - ผู้ป่วยโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว ผู้ป่วยโรคมะเร็ง
 - ผู้ป่วยที่ได้รับการฉายรังสี ผู้ป่วยที่รับยากดภูมิคุ้มกัน หรือผู้ป่วยที่ได้รับคอร์ติโคสเตียรอยด์เป็นเวลานาน
 - ผู้ป่วยที่มีสายสวนทางหลอดเลือดดำส่วนกลาง
- 2.2 ข้อควรระวังเมื่อใช้ยานี้**
- ให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร ในกรณีต่อไปนี้
 - มีอาการท้องเสียนานกว่า 2 วันจากการใช้ยา
 - มีไข้ อาเจียน หรือมีเลือดหรือเมือกปนในอุจจาระ
 - ในกรณีที่ผู้ป่วยมีอาการท้องเสีย โดยเฉพาะในเด็ก ควรให้เกลือแร่สำหรับท้องเสียเพื่อป้องกันการขาดน้ำ
- “หากมีภาวะดังกล่าว ให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร”**

3. วิธีใช้ยา

- 3.1 ขนาดและวิธีใช้**
- ควรใช้ยาตามคำแนะนำของแพทย์หรือ เภสัชกรเท่านั้น เพราะขนาดและระยะเวลาในการใช้ยานี้ขึ้นกับชนิดและความรุนแรงของโรค
- **ผู้ใหญ่:** กินครั้งละ 1 แคปซูล วันละ 1 – 2 ครั้ง
 - **การรักษาอาการไม่พึงประสงค์จากยาปฏิชีวนะที่ใช้ในการรักษาการติดเชื้อแบคทีเรียเฉียบพลัน:** กินครั้งละ 1 แคปซูล วันละ 4 ครั้ง เป็นเวลา 2 สัปดาห์ ร่วมกับยาปฏิชีวนะที่ใช้ในการรักษาการติดเชื้อแบคทีเรียเฉียบพลัน
 - **การรักษาโรคที่เกี่ยวข้องกับเชื้อแบคทีเรีย คลอสตริเดียม ดิฟฟิไซล์ เช่น โรคลำไส้อักเสบ** เนื่องจากการกินยาปฏิชีวนะ: กินครั้งละ 1 แคปซูล วันละ 4 ครั้ง เป็นเวลา 2 สัปดาห์ ร่วมกับยาปฏิชีวนะเช่น แวนโคมายซิน หรือเมโททรินดาโซล ซึ่งใช้ในการรักษาการติดเชื้อแบคทีเรียคลอสตริเดียม ดิฟฟิไซล์
 - **การป้องกันอาการท้องเสียระหว่างเดินทาง:** กินครั้งละ 1 แคปซูล วันละ 1 – 2 ครั้ง หรือตามคำแนะนำของแพทย์ ให้เริ่มรับประทาน 5 วันก่อนเดินทาง ต่อเนื่องจนสิ้นสุดการเดินทาง
 - **เด็กอายุน้อยกว่า 2 ขวบ:** ควรใช้ยาภายใต้คำแนะนำของแพทย์
 - **เด็กอายุ 2 ขวบขึ้นไป:** รับประทานครั้งละ 1 แคปซูล วันละ 1 – 2 ครั้ง
 - **วิธีใช้ยาสำหรับเด็ก:** ถอดเปลือกแคปซูลออก แล้วเทผงยาที่บรรจุอยู่ในแคปซูลผสมกับน้ำหรือน้ำผลไม้ปริมาณ 5 – 10 มิลลิลิตร และไม่ผสมกับน้ำร้อน (เกิน 50 องศาเซลเซียส)
- 3.2 หากลืมกินยาควรทำอย่างไร**
- ให้กินทันทีที่นึกได้ แต่ถ้าใกล้มื้อถัดไปให้รอกินตามปกติ **ไม่ต้อง** กินเพิ่มเป็น 2 เท่า
- 3.3 ถ้ากินยานี้เกินขนาดที่แนะนำ ควรทำอย่างไร**
- ให้สังเกตอาการอย่างใกล้ชิด หากมีอาการผิดปกติที่รุนแรงให้รีบนำส่งโรงพยาบาลทันที

4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างใช้ยา

ไม่มีข้อมูล

5. อันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้

- 5.1 อาการที่ต้องหยุดใช้แล้วรีบไปพบแพทย์ทันที**
- ลมพิษ บวมที่ใบหน้า เปลือกตา ริมฝีปาก
 - หน้ามืด เป็นลม แน่นหน้าอก หายใจลำบาก
 - ผื่นแดง ตุ่มพอง ผิวหนังหลุดลอก มีจุดตามผิวหนังหรือเลือดออกผิดปกติ
- “ให้หยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที”**
- 5.2 อาการที่ไม่จำเป็นต้องหยุดใช้ แต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์**
- มีไข้ อาเจียน ท้องเสีย หรือ มีเลือดหรือเมือกปนในอุจจาระ

6. ควรเก็บยานี้อย่างไร

- เก็บไว้ในบรรจุภัณฑ์เดิมตามที่ได้รับมา
- เก็บยาในที่แห้ง อบอุ่นโดยตรง โดยทั่วไปควรเก็บที่อุณหภูมิต่ำกว่า 25 องศาเซลเซียส
- ไม่เก็บยาในที่ร้อนหรือชื้น เช่น ในรถ ห้องน้ำ ห้องครัว
- เก็บยาให้พ้นมือเด็ก

7. ลักษณะและส่วนประกอบ

- **ลักษณะยา:** แคปซูลจากพืช ทึบแสง สีขาว บรรจุแผงบลิสเตอร์ ซึ่งบรรจุอยู่ในกล่องกระดาษ
- **สารสำคัญ:** 1 แคปซูลประกอบด้วย ผงแห่งของเชื้อยีสต์แซคคาโรมายเซส บิวลาดีอี 250 มิลลิกรัม (ให้จุลินทรีย์มีชีวิต 20,000 ล้านเซลล์ต่อกรัม)
- **ส่วนประกอบอื่น ๆ ได้แก่** แลคโตส แมกนีเซียม สเตียเรท ไฮโปรมเมลโลส น้ำ และ ทีเทเนียม ไดออกไซด์

ผู้นำเข้าและผู้จัดจำหน่าย:
บริษัท เมก้า ไลฟ์ไซแอนซ์ จำกัด (มหาชน)
จังหวัดสมุทรปราการ 10280 ประเทศไทย

เอกสารนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ 31 กรกฎาคม 2563

- ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ของ อย.**
- <http://www.fda.moph.go.th/sites/oss/Pages/Main.aspx>
 - <http://ndi.fda.moph.go.th/>

เอกสารนี้เป็นข้อมูลโดยย่อ
หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร