

ไอซาโซมิบ

2.3, 3, 4 มิลลิกรัม

ชนิดแคปซูล

Ninlaro (นินลาโร)

1. ยานี้คืออะไร

1.1 ยานี้มีชื่อสามัญว่าอะไร

ยานี้มีชื่อสามัญว่าไอซาโซมิบ (Ixazomib)

1.2 ยานี้ใช้เพื่ออะไร

ยานี้ใช้รักษาโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดมัลติเพิล มัยอิโลมาในผู้ใหญ่

2. ข้อควรระวังก่อนใช้ยา

2.1 ห้ามใช้ยานี้เมื่อไร

- ห้ามใช้เมื่อเคยแพ้ยานี้ หรือส่วนประกอบอื่นๆ ในยานี้

2.2 ข้อควรระวังเมื่อใช้ยานี้

- **ควรหลีกเลี่ยงหรือปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อนใช้ยานี้ในกรณีต่อไปนี้**
 - มีประวัติเลือดออก
 - มีอาการคลื่นไส้ อาเจียน หรือท้องเสียเรื้อรัง
 - มีประวัติความผิดปกติของเส้นประสาท รวมถึง อาการเหน็บชา
 - มีประวัติบวม
 - มีผื่นเรื้อรัง
 - มีโรคตับหรือโรคไต
 - ท้องตั้งครรภ์ หรืออยู่ในระหว่างให้นมบุตร

- **ไม่ควรใช้ยานี้ร่วมกับยาต่อไปนี้** เพราะอาจมีผลต่อการรักษาหรือเกิดอันตรายได้เช่น ยาแก้อักเสบ (เพนิซิลิน คาร์บามาเซพีน) และยาต้านไวรัส (ไรแฟมพิซิน)

3. วิธีใช้ยา

3.1 ขนาดและวิธีใช้

- **ควรใช้ยาตามคำแนะนำของแพทย์หรือ เภสัชกรเท่านั้น** เพราะขนาดและระยะเวลาในการใช้ยานี้ขึ้นกับชนิดและความรุนแรงของโรค
- ควรกินยาก่อนอาหารอย่างน้อย 1 ชั่วโมงหรือ หลังอาหารอย่างน้อย 2 ชั่วโมง
- **กลืนแคปซูลทั้งเม็ดพร้อมน้ำ** ไม่ควรบด เคี้ยว หรือเปิดแคปซูลออกมา
- หลีกเลี่ยงการสัมผัสผงยาที่บรรจุภายในแคปซูลโดยตรงหากสัมผัสกับผงยาควรล้างให้สะอาดด้วยสบู่และน้ำ หากแคปซูลแตก ให้ระมัดระวังผงยาที่ฟุ้งกระจายระหว่างการทำความสะอาด

3.2 หากลืมกินยาควรทำอย่างไร

- ให้กินยาทันทีที่นึกได้ภายใน 4 วัน แต่ถ้าลืมกินยา เกิน 4 วัน ไม่ต้องกินยามื้อนั้น แต่ให้รอกินยามื้อต่อไป และห้ามกินยาเพิ่มเป็น 2 เท่า
- หากผู้ป่วยอาเจียนหลังกินยา ไม่ควรรับประทานยาซ้ำ

3.3 ถ้ากินยานี้เกินขนาดที่แนะนำ ควรทำอย่างไร

- ให้สังเกตอาการอย่างใกล้ชิด หากมีอาการผิดปกติที่รุนแรงให้รีบนำส่งโรงพยาบาลทันที

เอกสารนี้เป็นข้อมูลโดยย่อ

หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร

4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างใช้ยา

- ควรกินยาอย่างต่อเนื่อง จนแพทย์สั่งหยุดยา
- คุณก่าเฝ้าระวังระหว่างกินยานี้ และคุณก่าเฝ้าระวังหลังจากหยุดยาไปอีก 3 เดือน
- ควรระมัดระวังการขับรถหรือการทำงานที่ใช้เครื่องจักร เพราะอาจเกิดอาการง่วงซึมในขณะที่กินยานี้

5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา

5.1 อาการที่ต้องหยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที

- บวมที่ใบหน้า เปลือกตา ริมฝีปาก ลิ้น
- หน้ามืด เป็นลม แน่นหน้าอก หายใจลำบาก
- ผื่นแดง ตุ่มพอง ผิวหนังหลุดลอก มีจ้ำตามผิวหนัง หรือเลือดออก ผิดปกติ
- จำนวนเกร็ดเลือดต่ำ (ภาวะเกร็ดเลือดต่ำ) ซึ่งอาจเพิ่มความเสี่ยงของการเกิดเลือดออกในจมูกและรอยฟกช้ำได้ง่าย
- คลื่นไส้ อาเจียน และท้องเสีย
- อาการเหน็บชา หรือปวดแสบปวดร้อนที่มือและเท้า (โรคเส้นประสาทส่วนปลาย)
- มีอาการกล้ามเนื้ออ่อนแรง สูญเสียความรู้สึกที่เท้าและนิ้วเท้า หรือสูญเสียการเคลื่อนไหวของขา
- การมองเห็นที่เปลี่ยนแปลงไป
- มีภาวะลมชัก หรืออาการชัก
- ภาวะหายใจสั้น หรือการเต้นของหัวใจผิดปกติ
- มีเลือดออกในจมูก
- ปัสสาวะน้อยลง

“หากมีอาการเหล่านี้ ให้หยุดยา และรีบแจ้งแพทย์หรือพยาบาลทันที”

5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา

5.2 อาการที่ไม่จำเป็นต้องหยุดยา แต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์ทันที

- ท้องผูก ปวดหลัง อาการเหมือนเป็นหวัด
- รู้สึกเหนื่อยล้าและอ่อนเพลีย
- ความอยากอาหารลดลง
- หัวใจเต้นผิดปกติ
- มองไม่ชัด ตาแห้ง และตาแดง
- การเกิดอีสุกอีใสหรือโรคผิวหนังที่ เป็นสาเหตุของการเกิดผื่นที่ ผิวน้ำและอาการปวด
- ความดันโลหิตต่ำ
- หายใจสั้นๆ หรือไอเรื้อรังหรือมีอาการเสียงหวีด
- ตาเหลืองและผิวเหลือง

“ให้รอดูอาการก่อน แต่ถ้าทนไม่ไหว
หรือมีอาการรุนแรงให้รีบแจ้งแพทย์”

6. ควรเก็บยาได้อย่างไร

- เก็บไว้ในภาชนะบรรจุเดิมตามที่ได้รับมา เพื่อป้องกันความชื้น ไม่ควรเคลื่อนย้ายยาจนกว่าจะถึงเวลากินยา
- เก็บยาในที่แห้ง อย่าให้โดนแสงโดยตรง โดยทั่วไปควรเก็บที่อุณหภูมิไม่เกิน 30 องศาเซลเซียส ไม่เก็บยาในที่ร้อนหรือชื้น เช่น ในรถ ห้องน้ำ ห้องครัว
- ไม่ควรใช้ยาหมดอายุ โดยวันหมดอายุอยู่อยู่ที่แผงยาหลังคำว่า EXP ซึ่งอ้างถึงวันสุดท้ายของเดือนที่ระบุ
- ไม่ควรใช้ยาที่มีบรรจุภัณฑ์ที่เสียหายหรือบรรจุภัณฑ์มีร่องรอยการแกะยา
- ไม่ควรทิ้งยาในท่อน้ำเสียภายในบ้าน ถ้าไม่ใช่วางถังแล้ว ให้สอบถามเภสัชกรถึงวิธีการทิ้งยา เพื่อช่วยปกป้องสิ่งแวดล้อม
- เก็บยาให้พ้นมือเด็ก

ผู้ผลิต: Haupt Pharma Amareg GmbH สหพันธ์

สาธารณรัฐเยอรมนี

ผู้นำเข้า: บริษัท ทาเคดา (ประเทศไทย) จำกัด

กรุงเทพมหานคร

ผู้แทนจำหน่าย: บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด,

กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย

เอกสารนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ สิงหาคม 2564

7. ลักษณะและส่วนประกอบของยานี้

ลักษณะยา

- ยาไอซาโซมิบ 2.3 มิลลิกรัม
 - ใช้แคปซูลแข็งเบอร์ 4 สีชมพูอ่อน
 - มีอักษร “Takeda” บนฝาแคปซูล
 - มีอักษร “2.3 mg” สีดำบนตัวแคปซูล
- ยาไอซาโซมิบ 3 มิลลิกรัม
 - ใช้แคปซูลแข็งเบอร์ 4 สีเทาอ่อน
 - มีอักษร “Takeda” บนฝาแคปซูล
 - มีอักษร “3 mg” สีดำบนตัวแคปซูล
- ยาไอซาโซมิบ 4 มิลลิกรัม
 - ใช้แคปซูลแข็งเบอร์ 3 สีส้มอ่อน
 - มีอักษร “Takeda” บนฝาแคปซูล
 - มีอักษร “4 mg” สีดำบนตัวแคปซูล

ส่วนประกอบของยานี้

ไมโครคริสตอลีน เซลลูโลส ทาลค์ แมกนีเซียมสเตอเรส