

**คีโททิเฟน**  
**ความแรง 0.25 มิลลิกรัม ต่อ 1 มิลลิลิตร**  
**ชนิดยาหยอดตา**  
**ชื่อการค้า SOLIFEN (โซลิเฟิน)**

## 1. ยานี้คืออะไร

### 1.1 ยานี้มีชื่อว่าอะไร

- ยานี้มีชื่อว่าคีโททิเฟนฟูมาเรต(ketotifenfumarate) เป็นยาในกลุ่มยาแก้แพ้

### 1.2 ยานี้ใช้เพื่ออะไร

- ยานี้ใช้เพื่อบรรเทาอาการคันตาชั่วคราวที่มีสาเหตุจากภูมิแพ้

## 2. ข้อควรระวังก่อนใช้ยา

### 2.1 ห้ามใช้ยานี้เมื่อไร

- ⊗ เคยแพ้ยานี้ หรือส่วนประกอบของยานี้

### 2.2 ข้อควรระวังเมื่อใช้ยานี้

- ให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร ในกรณีต่อไปนี้
  - กำลังใช้ยาต่อไปนี้ อยู่ ยารักษาอาการซึมเศร้า วิตกกังวลนอนไม่หลับ ยาแก้แพ้
- ตั้งท้อง หรือวางแผนที่จะตั้งท้อง ยานี้มีส่วนประกอบของสารกันเสีย (benzalkonium chloride) อาจทำให้ระคายเคืองตา หรือคอนแทคเลนส์เปลี่ยนสีได้

## 3. วิธีใช้ยา

### 3.1 ขนาดและวิธีใช้

- ควรใช้ยาตามคำแนะนำของแพทย์หรือเภสัชกร เท่านั้น เพราะขนาดและระยะเวลาในการใช้ยานี้ ขึ้นกับชนิดและความรุนแรงของโรค
- ถอดคอนแทคเลนส์ก่อนใช้ยานี้ และใส่หลังจากหยอดตาไปแล้ว 15 นาที
- ถ้าต้องการใช้ยาอื่นร่วมด้วย ให้หยอดยาแต่ละชนิดห่างกัน 5 นาที
- ไม่ควรใช้ยานี้ ถ้าภาชนะบรรจุยาฉีกขาดก่อนที่จะเปิดใช้
- ล้างมือให้สะอาด ก่อนเปิดใช้หลอดยาทุกครั้ง
- ถือหลอดยาให้อยู่ในลักษณะคว่ำและเงยหน้าขึ้น
- ใช้นิ้วมืออีกข้างหนึ่งดึงเปลือกตาล่างลงมาให้เกิดร่องกระพุ้งตา
- หยอดยา 1 หยดลงในกระพุ้งตา ระวังอย่าให้ปลายหลอดสัมผัส ตา ขนตา เปลือกตา มือ และสิ่งอื่นใด
- ปล่อยมือจากเปลือกตาล่าง และหลับตาไว้ประมาณ 2 นาที
- หากต้องการหยอดตาอีกข้างหนึ่ง ทำซ้ำในขั้นตอนข้างต้น
- ไม่ควรใช้ยานี้หลังจากเปิดใช้แล้ว 30 วัน

### 3.2 หากลืมหยอดยาควรทำอย่างไร

- หยอดยาทันทีที่นึกขึ้นได้ ไม่หยอดเพิ่มเป็น 2 เท่า และหยอดยาครั้งต่อไปตามเวลาปกติ

### 3.3 ถ้าหยอดยานี้เกินขนาดที่แนะนำควรทำอย่างไร

- การหยอดยานี้มากกว่าหนึ่งหยดไม่ทำให้เกิดอันตราย หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร

## 4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างใช้ยา

- ยานี้อาจทำให้ง่วง หรือตาพร่าได้ หากมีอาการข้างต้นให้รอจนกว่าอาการจะหายไป จึงขับขี ยานพาหนะหรือใช้เครื่องจักร

## 5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา

### 5.1 อาการที่ต้องหยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที

- ลมพิษบวมที่ใบหน้าเปลือกตาริมฝีปาก
- หน้ามืดเป็นลม แน่นหน้าอกหายใจลำบาก
- ผื่นแดงตุ่มพองผิวหนังหลุดลอก มีฝ้าตามผิวหนังหรือเลือดออกผิวดก
- มองเห็นผิดปกติไปจากเดิม หรือไวต่อแสงเพิ่มขึ้น
- เลือดออกบริเวณตาขาว

“ให้หยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที”

### 5.2 อาการที่ไม่จำเป็นต้องหยุดยา แต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์

- ระคายเคืองหรือเจ็บตา
- ตาอักเสบ

“ไม่จำเป็นต้องหยุดยา แต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์”

## 6. ควรเก็บยานี้อย่างไร

- เก็บไว้ในบรรจุภัณฑ์เดิมตามที่ได้รับมา
- เก็บยาในที่แห้งอย่าให้โดนแสงโดยตรงโดยทั่วไป ควรเก็บที่อุณหภูมิห้องไม่เกิน 30 องศาเซลเซียส ไม่เก็บยาในที่ร้อนหรือชื้น เช่น ในรถ ห้องน้ำ ห้องครัว
- เก็บยาให้พ้นมือเด็ก

**เอกสารนี้เป็นข้อมูลโดยย่อ**  
**หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร**

## 7. ลักษณะและส่วนประกอบของยานี้

ลักษณะยาสารละลายปราศจากเชื้อ ใส ไม่มีสี

ตัวยาสำคัญคือโททิเฟนฟูมาเรต

(Ketotifenfumarate)

ส่วนประกอบอื่นๆได้แก่ Glycerin (กลีเซอริน)

Benzalkonium chloride (เบนแซลโคเนียมคลอไรด์)

Sodium hydroxide (โซเดียมไฮดรอกไซด์) Water for

Injection (น้ำสำหรับฉีด)

ผู้ผลิตบริษัท ฟาร์มา อินโนวา จำกัด

1738 หมู่ 4 ถนนเลียบคลองเจ็ด ต.บึงคำพร้อย

อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150

โทร. 02-9715335 แฟกซ์ 02-9715470

เอกสารนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อพฤศจิกายน2564

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ของ อย.

- <http://www.fda.moph.go.th/sites/oss/Pages/Main.aspx>
- <http://ndi.fda.moph.go.th/>