

**บอร์ทีโซมิบ**  
**3.5 มิลลิกรัม**  
**ชนิดผงละลายน้ำสำหรับฉีด**  
**Myzomib (มายโซมิบ)**

## 1. ยานี้คืออะไร

### 1.1 ยานี้มีชื่อสามัญว่าอะไร

- ยานี้มีชื่อว่า บอร์ทีโซมิบ (bortezomib) มีตัวยา บอร์ทีโซมิบ 3.5 มิลลิกรัม เป็นยาในกลุ่มยาต้านมะเร็งที่ออกฤทธิ์จำเพาะเจาะจงต่อเซลล์มะเร็ง

### 1.2 ยานี้ใช้เพื่ออะไร

- ยานี้ใช้รักษามะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดมัลพิวโลมา และรักษามะเร็งต่อมน้ำเหลืองชนิดแมนเทิลเซลล์

## 2. ข้อควรระวังก่อนใช้ยา

### 2.1 ห้ามใช้ยานี้เมื่อไหร่

- ⊗ ห้ามใช้เมื่อเคยแพ้ยานี้ หรือส่วนประกอบของยานี้
- ⊗ ห้ามใช้เมื่อมีความผิดปกติเกี่ยวกับปอด หรือหัวใจ

### 2.2 ข้อควรระวังเมื่อใช้ยานี้

- ให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรในกรณีต่อไปนี้
  - เป็นโรคหัวใจ ความดันเลือดสูง
  - ตับทำงานผิดปกติระดับปานกลาง หรือรุนแรง
  - มีอาการชา ปวดแปลบที่มือ หรือเท้า
  - เม็ดเลือดแดงหรือเม็ดเลือดขาวต่ำ
  - เลือดออกง่าย เกล็ดเลือดต่ำ
  - ไตทำงานผิดปกติ
  - มีประวัติโรคลมชัก
  - กำลังเป็นงูสวัด
  - กล้ามเนื้ออ่อนแรง เป็นตะคริว สับสน ตามัว ตาพร่า เห็นภาพเบลอ ภาพซ้อน
  - อาการของการติดเชื้อรุนแรงที่สมอง

- เคยได้รับยานี้แล้วมีอาการเป็นลม เวียนหัว
  - **แจ้งแพทย์หรือเภสัชกร**หากท่าน**ตั้งครรภ์ มีแผนจะตั้งครรภ์หรือให้นมบุตร** เพราะไม่มีข้อมูลความปลอดภัยของทารก
  - **ไม่ควรใช้ยานี้ในเด็กและวัยรุ่นอายุน้อยกว่า 18 ปี** เพราะยังไม่มีข้อมูลด้านประสิทธิภาพและความปลอดภัย
  - **ไม่ควรใช้ยานี้ร่วมกับยา อาหาร สมุนไพร หรือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบางชนิด** เพราะอาจมีผลต่อการรักษาหรือเกิดอันตรายได้ เช่น
    - ยาโคลิโคนาโซล ซึ่งใช้รักษาเชื้อรา
    - ยาริโทนาเวียร์ ซึ่งใช้รักษาโรคติดเชื้อเอชไอวี
    - ยาไรแฟมพิซิน ซึ่งใช้รักษาวัณโรค
    - ยารักษาโรคลมชัก
    - ยารักษาเบาหวาน
- “หากท่านไม่แน่ใจว่ากำลังใช้ยาเหล่านี้อยู่ โปรดปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร”**

## 3. วิธีใช้ยา

### 3.1 ขนาดและวิธีใช้

- ควรใช้ยาตามคำแนะนำของแพทย์หรือ เภสัชกร เท่านั้น เพราะขนาดและระยะเวลาในการใช้ยานี้ขึ้นกับชนิดและความรุนแรงของโรค
- แพทย์หรือพยาบาลจะเป็นผู้ฉีดยานี้ให้ท่าน โดยฉีดเข้าทางหลอดเลือดดำหรือใต้ผิวหนัง

### 3.2 ถ้าหากลืมมาฉีดยาควรทำอย่างไร

- แจ้งแพทย์ พยาบาล หรือเภสัชกร หากท่านลืมมาฉีดยา หรือไม่ได้ไปพบแพทย์ตามนัด

## 4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างใช้ยา

- พบแพทย์ตามนัดทุกครั้งเพื่อติดตามผลการรักษาหรืออันตรายจากยา
- ระมัดระวังการขับขีเยี่ยวปาทานะ ทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักร หรือทำงานที่เสี่ยงต่อการพลัดตกจากที่สูง

- ผู้ป่วยทั้งชายและหญิงต้องคุมกำเนิดตลอดระยะเวลาที่ใช้ยานี้ และหลังจากหยุดยานี้ไปแล้ว ต้องคุมกำเนิดต่อไปอีกอย่างน้อย 3 เดือน
- แจ้งแพทย์ทันทีหากตั้งครรภ์ หรือสงสัยว่าตั้งครรภ์ในระหว่างใช้ยานี้ หรือตั้งครรภ์ภายใน 3 เดือนหลังจากหยุดยาคั้งสุดท้าย

## 5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา

### 5.1 อาการที่ต้องแจ้งแพทย์ พยาบาล หรือเภสัชกรทันที

- ลมพิษ บวมที่ใบหน้า เปลือกตาริมฝีปาก
- หน้ามืด เป็นลม แน่นหน้าอก หายใจลำบาก
- ผื่นแดง ตุ่มพอง ผื่นหนังหลุดลอก มีจ้ำตามผิวหนัง หรือเลือดออกผิดปกติ
- ตัวเหลือง ตาเหลือง ปัสสาวะเหลืองเข้มผิดปกติ
- กล้ามเนื้อเป็นตะคริว กล้ามเนื้ออ่อนแรง ปวดกล้ามเนื้อ
- ชัก ปวดหัว สับสน ตาพร่า ตามัว เห็นภาพเบลอ ง่วงซึม เดินลำบาก

**“หากมีอาการเหล่านี้ ให้แจ้งแพทย์ พยาบาล หรือเภสัชกรทันที”**

### 5.2 อาการที่อาจเกิดได้และให้รอดูอาการ แต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้แจ้งแพทย์หรือพยาบาล

- คลื่นไส้ อาเจียน เบื่ออาหาร
- ท้องอืด ท้องผูก หรือท้องร่วง
- มีอาการชา ปวดแปลบที่มือ หรือเท้า
- มือ เท้า หัวเข่า หรือขาตื้อล้าบวม
- ผมรั้ง หรือผมมีลักษณะผิดปกติ
- ซีด อ่อนเพลีย เหนื่อยง่าย
- แผลในปาก
- หัวใจเต้นผิดปกติ ความดันเลือดต่ำ เป็นลม
- ติดเชื้อง่าย มีอาการคล้ายเป็นหวัด

**“ให้รอดูอาการ แต่ถ้ามีอาการรุนแรง ให้แจ้งแพทย์ พยาบาล หรือเภสัชกร”**

## 6. ควรเก็บยานี้อย่างไร

- ยานี้เก็บไว้ที่โรงพยาบาล ท่านจะไม่ได้รับกลับบ้าน
- หากท่านได้รับยากลับบ้าน อย่าแกะออกจากกล่องกระดาษที่มากับผลิตภัณฑ์
- เก็บยานี้อ่อนๆ ไม่เกิน 30 องศาเซลเซียส ไม่เก็บยาในที่ร้อนหรือชื้น เช่น ในรถ ห้องน้ำ ห้องครัว
- เก็บยาให้พ้นมือเด็ก

## 7. ลักษณะและส่วนประกอบของยานี้

- **ลักษณะยา** ผงยาสีขาวถึงสีขาวออกเหลือง ประกอบด้วยตัวยาบอร์โทโซมิบ และแมนนิทอล
- **ตัวยาสำคัญ** บอร์โทโซมิบ
- **ส่วนประกอบอื่นๆ** ได้แก่ แมนนิทอล

ผู้ผลิต Mylan Laboratories Limited [OTL]  
Plot no. 284 B, Bommasandra - Jigani Link Road,  
Industrial Area, Anekal Taluk, Bangalore – 560 105, India

ผู้นำเข้า บริษัท เมต้า ฟามาร์ (ประเทศไทย) จำกัด  
ผู้แทนจำหน่าย บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด  
คำเตือน: ยานี้อาจทำให้เกิดอันตรายร้ายแรงได้ ต้องใช้ภายใต้การควบคุมของแพทย์เท่านั้น

เอกสารนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ สิงหาคม 2563

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ของ อย.

- <http://www.fda.moph.go.th/sites/oss/Pages/Main.aspx>
- <http://ndi.fda.moph.go.th/>

**เอกสารนี้เป็นข้อมูลโดยย่อ หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร**