

วาลซาแทน

ความแรง 80 มิลลิกรัม และ 160 มิลลิกรัม
ชนิดเม็ดเคลือบฟิล์ม
ชื่อการค้า Viotan (ไวโอแทน)

1. ยานี้คืออะไร**1.1 ยานี้มีชื่อว่าอะไร**

- ยานี้มีชื่อว่าวาลซาแทน (valsartan)
- เป็นยาในกลุ่มยาลดความดันโลหิต

1.2 ยานี้ใช้เพื่ออะไร

ยานี้ใช้เพื่อ รักษาโรคความดันโลหิตสูง ภาวะหัวใจล้มเหลว และ ภาวะหลังจากกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด

2. ข้อควรระวังก่อนใช้ยา**2.1 ห้ามใช้ยานี้เมื่อไร**

- เคยแพ้ยานี้ หรือส่วนประกอบของยานี้
- ตั้งท้อง หรือให้นมลูก
- โรคตับขั้นรุนแรง
- เป็นโรคเบาหวานหรือโรคไตและกำลังใช้ยาออลิสไคเรน

2.2 ข้อควรระวังเมื่อใช้ยานี้ หากท่านมีภาวะต่อไปนี้ แจ้งแพทย์หากมีโรคประจำตัวหรือมีอาการต่อไปนี้

- โรคตับหรือไต
- อยู่ระหว่างฟอกไตหรือเพิ่งเปลี่ยนถ่ายไต
- มีภาวะหัวใจวายหรือหัวใจล้มเหลวหรือโรคหัวใจรุนแรง
- มีภาวะต่อมหมวกไตทำงานมากผิดปกติ
- สงสัยว่าจะตั้งท้อง
- เสียน้ำหนักจากท้องเสีย อาเจียน กินยาขับปัสสาวะ
- เคยมีอาการหน้าและลิ้นบวมหลังจากกินยาอื่นๆ
- กินยาหรือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่เพิ่มปริมาณโพแทสเซียมในเลือด
- คุ้กินยาลดความดันกลุ่มอื่นอยู่

“หากท่านไม่แน่ใจว่ามีอาการหรือกินยาใดอยู่โปรดแจ้งแพทย์หรือเภสัชกร”

3. วิธีใช้ยา**3.1 ขนาดและวิธีใช้**

- **ควรใช้ยาตามคำแนะนำของแพทย์หรือ เภสัชกร** เท่านั้น เพราะขนาดและระยะเวลาในการใช้ยานี้ขึ้นกับชนิดและความรุนแรงของโรค

3.2 หากลืมกินยาควรทำอย่างไร

- ให้กินยาทันทีที่นึกได้ แต่ถ้าใกล้เวลาของมื้อต่อไปให้รอกินยาของมื้อต่อไป และห้ามกินยาเพิ่มเป็น 2 เท่า

3.3 ถ้ากินยานี้เกินขนาดที่แนะนำ ควรทำอย่างไร

- ให้สังเกตอาการอย่างใกล้ชิด หากมีอาการผิดปกติที่รุนแรง เช่น มึนงง เวียนศีรษะ หน้ามืด เป็นลม ให้รีบนำส่งโรงพยาบาลทันที

4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างใช้ยา

- ห้ามหยุดยาเอง และให้กินยานี้อย่างต่อเนื่องตามคำแนะนำของแพทย์หรือเภสัชกร
- พบแพทย์ตามนัดอย่างสม่ำเสมอ เพื่อติดตามผลการรักษาหรืออันตรายจากยา
- หลีกเลี่ยงการขับ ขี่ยานยนต์หรือทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักรกล หรือทำงานที่เสี่ยงต่อการพลัดตก

5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา**5.1 อาการที่ต้องหยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที**

- บวมที่ใบหน้า เปลือกตา ริมฝีปาก ลิ้นบวม
 - หน้ามืด เป็นลม แขนหน้าอก หายใจลำบาก
 - ผื่นแดง ตุ่มพอง ผื่นหนังหลุดลอก มีจ้ำตามผิวหนัง
- “ให้หยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที”

5.2 อาการที่ไม่จำเป็นต้องหยุดยา แต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์

- อ่อนเพลีย มึนงง วิงเวียนเมื่อเปลี่ยนท่า
- เวียนหัว บ้านหมุน
- กล้ามเนื้อเกร็ง หัวใจเต้นผิดปกติ
- แขนบวม ขาบวม
- ไอ ปวดหัว คลื่นไส้ ปวดท้อง ท้องเสีย

“ไม่จำเป็นต้องหยุดยา แต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์”

6. ควรเก็บยานี้อย่างไร

- เก็บไว้ในภาชนะบรรจุเดิมตามที่ได้รับมา
- เก็บยาในที่แห้ง อบอุ่นให้โดนแสงโดยตรง โดยทั่วไป ควรเก็บที่อุณหภูมิไม่เกิน 30 องศาเซลเซียส ไม่เก็บยาในที่ร้อนหรือชื้น เช่น ในรถ ห้องน้ำ ห้องครัว
- แยกออกจากแผงเมื่อกินในแต่ละครั้งเท่านั้น
- เก็บยาให้พ้นมือเด็ก

7. ลักษณะและส่วนประกอบของยานี้

- **ลักษณะยา** เป็นเม็ดเคลือบฟิล์ม ด้านหนึ่งมีอักษร “BL” และอีกด้านหนึ่งมีขีดคั่นระหว่างอักษร “V” และ “T” มีตัวยาสำคัญคือ วาลซาแทน มี 2 ความแรง แต่ละความแรงมีสีและลักษณะต่างกัน ดังนี้
 - **ความแรง 80 มิลลิกรัม:** เป็นเม็ดกลม สีชมพู
 - **ความแรง 160 มิลลิกรัม:** เป็นเม็ดรูปยาว ปลายมนนูน สีส้ม

- **ส่วนประกอบอื่นๆ** ได้แก่ ไมโครคริสตัลลินเซลลูโลส, คอสโพรโอดิน, แมกนีเซียมสเตียเรต, คอลลอยด์ซิลิโคน ไดออกไซด์, ไฮโปรมेलโลสอี 5, ไฮโปรมेलโลสอี 15, โพลีเอทิลีนไกลคอล 6000, ไทเทเนียมไดออกไซด์, ทัลคัม, เรดโอเอิร์นออกไซด์, เยลโลโอเอิร์นออกไซด์ และน้ำ

ผู้ผลิต บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี จำกัด
 จังหวัดกรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
 เอกสารนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ 27 เมษายน 2564

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ของ อย.

- <http://www.fda.moph.go.th/sites/oss/Pages/Main.aspx>
- <http://ndi.fda.moph.go.th>

เอกสารนี้เป็นข้อมูลโดยย่อ
หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร