

โพวิโดน ไอโอดีน
ความแรง 10 % W/V
ชนิดสารละลายทาผิวหนัง
ชื่อการค้า ยาใส่แผล 888

1. ยานี้คืออะไร

1.1 ยานี้มีชื่อว่าอะไร

- ยานี้มีชื่อว่าโพวิโดน ไอโอดีน (Povidone Iodine)

1.2 ยานี้ใช้เพื่ออะไร

- ยานี้ใช้เพื่อรักษาแผลสด

2. ข้อควรระวังก่อนใช้ยา

2.1 ห้ามใช้ยานี้เมื่อไร

- ⊗ เคยแพ้ยานี้ หรือส่วนประกอบของยานี้

2.2 ข้อควรระวังเมื่อใช้ยานี้

- ให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร ในกรณีต่อไปนี้
 - มีแผลไฟไหม้มากกว่าร้อยละ 20 ของพื้นผิวง่าย
 - แผลเปิดขนาดใหญ่
 - ไตวาย
 - ตั้งครรภ์หรือให้นมบุตร
 - ผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาด้วยยาลิเทียม

3. วิธีใช้ยา

3.1 ขนาดและวิธีใช้

- ควรใช้ยาตามคำแนะนำของแพทย์หรือ เภสัชกร เท่านั้น เพราะขนาดและระยะเวลาในการใช้ยานี้ขึ้นกับชนิดและความรุนแรงของโรค
- ใช้สำลีสะอาดชุบยาทาที่แผล

3.2 ถ้าใช้ยานี้เกินขนาดที่แนะนำ ควรทำอย่างไร

- ให้สังเกตอาการอย่างใกล้ชิด หากมีอาการผิดปกติที่รุนแรง หรือหากรับประทานยานี้เข้าไป ให้รีบนำส่งโรงพยาบาลทันที

4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างใช้ยา

- ยาใช้ภายนอก ห้ามรับประทาน
- ไม่ทาบริเวณกว้าง ติดต่อกันเป็นเวลานาน

5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา

5.1 อาการที่ต้องหยุดยาแล้วไปพบแพทย์ทันที

- ลมพิษ บวมที่ใบหน้า เปลือกตา ริมฝีปาก
- หน้ามืด เป็นลม แน่นหน้าอก หายใจลำบาก
- ผื่นแดง ตุ่มพอง ผิวหนังหลุดลอก มีจ้ำตามผิวหนัง หรือ เลือดออกผิดปกติ

“ให้หยุดยาแล้วไปพบแพทย์ทันที”

5.2 อาการที่ไม่จำเป็นต้องหยุดยา แต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์ทันที

- ระคายเคืองผิว

6. ควรเก็บยานี้อย่างไร

- เก็บไว้ในภาชนะบรรจุเดิมตามที่ได้รับมา ปิดฝาให้สนิทหลังเปิดใช้
- เก็บยาในที่แห้ง อย่าให้โดนแสงโดยตรง โดยทั่วไป ควรเก็บที่อุณหภูมิห้องไม่เกิน 30 องศาเซลเซียส ไม่เก็บยาในที่ร้อนหรือชื้น เช่น ในรถ ห้องนำห้องครัว
- เก็บยาให้พ้นมือเด็ก

7. ลักษณะและส่วนประกอบของยานี้

- **ลักษณะของยา** ยาน้ำสีน้ำตาลเข้ม
 - **ตัวยาสําคัญ** 10 กรัม เทียบเท่ากับ ระยะเวลาเบิล ไอโอดีน 1 กรัม ในสารละลาย 100 มิลลิลิตร
 - **ส่วนประกอบอื่น ๆ** ได้แก่ กลีเซอริน, นอนออกซิน นอล-9, โซเดียมไฮดรอกไซด์, ซิตรีกแอซิดแอนไฮดริส, ไดโซเดียมไฮโดรเจนฟอสเฟตแอนไฮดริส, น้ำ
- ผู้ผลิตและผู้แทนจำหน่าย :** บริษัท มิลลิเมต จำกัด, จังหวัดสมุทรปราการ ประเทศไทย

เอกสารนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ 28 พฤษภาคม 2565

ศึกษาข้อมูลยาเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ของ อย.

- <http://www.fda.moph.go.th/sites/oss/Pages/Main.aspx>
- <http://ndi.fda.moph.go.th>

เอกสารนี้เป็นข้อมูลโดยย่อ
หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร

คำเตือนตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข

1. หากมีอาการระคายเคืองหรือผื่นแดงเกิดขึ้น ให้หยุดใช้ยา
2. หลีกเลี่ยงอย่าให้ยาเข้าตา