

โดเนเพซิล**ความแรง 5 และ 10 มิลลิกรัม****ชนิดเม็ด****ชื่อการค้า Aricept (อารีเซพท์)****1. ยานี้คืออะไร****1.1 ยานี้มีชื่อว่าอะไร**

- ยานี้มีชื่อว่า โดเนเพซิล (donepezil) มีตัวยา 5 มิลลิกรัม และ 10 มิลลิกรัม

1.2 ยานี้ใช้เพื่ออะไร

- ยานี้ใช้รักษาในผู้ใหญ่ที่ป่วยเป็นโรค
 - ภาวะสมองเสื่อมชนิดโรคอัลไซเมอร์
 - ภาวะสมองเสื่อมจากโรคหลอดเลือดสมอง
 - ภาวะสมองเสื่อมที่มีเลวิซอด

2. ข้อควรระวังก่อนใช้ยา**2.1 ห้ามใช้ยานี้เมื่อไร**

• เคยแพ้ยานี้ หรืออนุพันธ์ของพิเพอริดีน หรือ ส่วนประกอบของยานี้

2.2 ข้อควรระวังเมื่อใช้ยานี้

- ให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร ในกรณีต่อไปนี้
 - เป็นโรคหัวใจ
 - เป็นโรคกระเพาะ
 - เป็นโรคไต หรือถ่ายปัสสาวะยาก
 - เป็นโรคตับ
 - เป็นโรคลมชัก
 - เป็นโรคหอบหืด หรือโรคปอด
 - กำลังตั้งท้อง วางแผนจะตั้งท้อง หรือให้นมลูก
 - กำลังใช้อาหารเสริม สมุนไพร หรือยาอื่น เช่น ยาแก้ปวดกลุ่มเอ็นเสด

“หากไม่แน่ใจให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร”

3. วิธีใช้ยา**3.1 ขนาดและวิธีใช้**

- ควรใช้ยาตามคำแนะนำของแพทย์หรือเภสัชกร เท่านั้น เพราะขนาดและระยะเวลาในการใช้ยานี้ ขึ้นกับชนิดและความรุนแรงของโรค

3.2 หากลืมกินยาควรทำอย่างไร

- ให้ข้ามมื้อที่ลืม แล้วรอกินยาในวันถัดไปตามขนาดเดิม และไม่ต้องเพิ่มขนาดยาเป็นสองเท่า

3.3 ถ้ากินยานี้กินขนาดที่แนะนำ ควรทำอย่างไร

- ให้สังเกตอาการอย่างใกล้ชิดและพบแพทย์ทันที รวมถึงมีอาการคลื่นไส้ อาเจียน น้ำลายไหล เหงื่อออก หัวใจเต้นช้า ความดันโลหิตต่ำ เวียนศีรษะ หายใจติดขัด หมดสติ ชัก

4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างใช้ยา

- พบแพทย์ตามนัดอย่างสม่ำเสมอ เพื่อติดตามผลการรักษาหรืออันตรายจากยา
- ห้ามหยุดยาเอง และให้กินยาน้อย่างต่อเนื่องตามคำแนะนำของแพทย์ หรือเภสัชกร
- ระมัดระวังการขับชยานยนต์ หรือทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักร หรือทำงานที่เสี่ยงต่อการพลัดตกจากที่สูง เพราะยานี้อาจทำให้เวียนหัวหรือวังงวม

5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา**5.1 อาการที่ต้องหยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที**

- ลมพิษ บวมที่ใบหน้า เปลือกตา ริมฝีปาก
- หน้ามืด เป็นลม แน่นหน้าอก หายใจลำบาก
- ผื่นแดง ตุ่มพอง ผิวหนังหลุดลอก มีจ้ำตามผิวหนังหรือเลือดออกผิปกติ
- ปวดท้อง อาเจียนเป็นเลือด อุจจาระสีดำ ชัก ขับถ่ายปัสสาวะผิดปกติ

“ให้หยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที”

5.2 อาการที่ไม่จำเป็นต้องหยุดยา แต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์

- เป็นหวัด เบื่ออาหาร หลอน ผื่นร้าย เวียนหัว นอนไม่หลับ ท้องเสีย คลื่นไส้ อาเจียน คัน เป็นตะคริว ปวดหัว อ่อนแรง หกล้ม

“ไม่จำเป็นต้องหยุดยา แต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์”

6. ควรเก็บยานี้อย่างไร

- เก็บไว้ในบรรจุภัณฑ์เดิมตามที่ไดรับมา
- เก็บยาในที่แห้ง อบอุ่นให้โดนแสงโดยตรง โดยทั่วไป ควรเก็บที่อุณหภูมิไม่เกิน 30 องศาเซลเซียส ไม่เก็บยาในที่ร้อนหรือชื้น เช่น ในรถ ห้องน้ำ ห้องครัว

- ควรแกะยาจากแผงเมื่อกินในแต่ละครั้งเท่านั้น ห้ามแกะยาออกจากแผงก่อน เพราะยาอาจเสียได้
- เก็บยาให้พ้นมือเด็ก

7. ลักษณะและส่วนประกอบของยานี้**• ลักษณะยา**

- อารีเซพท์ 5 มิลลิกรัม เป็นเม็ดเคลือบฟิล์ม รูปกลมมนทั้งสองด้าน สีขาว มีตัวอักษร “ARICEPT” อยู่บนด้านหนึ่ง และตัวเลข “5” อยู่บนอีกด้านหนึ่งของเม็ดยา
- อารีเซพท์ 10 มิลลิกรัม เป็นเม็ดเคลือบฟิล์ม รูปกลมมนทั้งสองด้าน สีเหลืองมีตัวอักษร “ARICEPT” อยู่บนด้านหนึ่ง และตัวเลข “10” อยู่บนอีกด้านหนึ่งของเม็ดยา

• ตัวยาสำคัญ โดเนเพซิล

- ส่วนประกอบอื่น ๆ ได้แก่ lactose monohydrate (แลคโตสโมโนไฮเดรต), microcrystalline cellulose (ไมโครคริสตัลไลน์เซลลูโลส), corn starch (คอร์นสตาร์ช), hydroxypropyl cellulose (ไฮดรอกซีโพรพิลเซลลูโลส), magnesium stearate (แมกนีเซียมสเตียเรต), hydroxypropylmethyl cellulose (ไฮดรอกซีโพรพิลเมทิลเซลลูโลส), talc (ทัลค), polyethylene glycol (โพลีเอทิลีนไกลคอล) และ titanium dioxide (ไททาเนียมไดออกไซด์) นอกจากนี้ เม็ดยาขนาด 10 มิลลิกรัมประกอบด้วย iron oxide yellow (ไอเอิร์นออกไซด์สีเหลือง)

**เอกสารนี้เป็นข้อมูลโดยย่อ
หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร**

1 ผลิต Eisai Pharmaceuticals India Pvt. Ltd.,
India

ผู้เข้า บริษัท เอไซ (ประเทศไทย) มาร์เก็ตติ้ง
จำกัด กรุงเทพฯ

ผู้แทนจำหน่าย บริษัท เอไซ (ประเทศไทย) มาร์เก็ต
ติ้ง จำกัด กรุงเทพฯ

เอกสารนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ

ศึกษาข้อมูลยาเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ของ อย.

▪ <http://www.fda.moph.go.th/sites/oss/Pages/Main.aspx>

▪ <http://ndi.fda.moph.go.th/>

ราคาเดือน:

ยานี้ให้ส่งใช้โดยประสาทแพทย์ จิตแพทย์ หรือ
อายุรแพทย์ผู้ดูแลรักษาผู้ป่วยในคลินิกผู้สูงอายุ

ART(IN)/10.22T
_clean