

**เทเนลิกลิปติน**  
**ความแรง 20 มิลลิกรัม**  
**ชนิดเม็ดเคลือบฟิล์ม**  
**ชื่อการค้า Tenelia® (เทเนเลีย)**

**1. ยานี้คืออะไร**

**1.1 ยานี้มีชื่อว่าอะไร**

- ยานี้มีชื่อว่าเทเนลิกลิปติน (teneligliptin) เป็นยาในกลุ่มลดระดับน้ำตาลในเลือด

**1.2 ยานี้ใช้เพื่ออะไร**

- ยานี้ใช้เพื่อรักษาโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ในผู้ใหญ่

**2. ข้อควรระวังก่อนใช้ยา**

**2.1 ห้ามใช้ยานี้เมื่อไร**

- เคยแพ้ยานี้หรือส่วนประกอบของยานี้
- มีอาการคลื่นไส้ร่วมกับหายใจมีกลิ่นผลไม้และหายใจหอบลึก
- กำลังหมดสติหรืออยู่ในภาวะโคม่า
- เป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 1
- ติดเชื้อรุนแรง
- กำลังจะได้รับการผ่าตัดหรือเพิ่งได้รับการผ่าตัดมาใหม่ๆ
- ได้รับความผิดปกติของตับ

**2.2 ข้อควรระวังเมื่อใช้ยานี้**

- ให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร ในกรณีที่ท่านมีภาวะดังต่อไปนี้
  - เป็นโรคตับระยะรุนแรง
  - เป็นโรคหัวใจ หัวใจเต้นเสียจังหวะ หัวใจเต้นช้า หัวใจล้มเหลว
  - มีความผิดปกติเกี่ยวกับต่อมไทรอยด์หรือต่อมหมวกไต
  - มีภาวะขาดสารอาหาร อดอาหาร ควบคุมอาหาร กินอาหารไม่เพียงพอ อ่อนเพลียผิดปกติ
  - ออกกำลังกายอย่างหนัก
  - ติดเหล้าหรือแอลกอฮอล์
  - เคยผ่าตัดช่องท้องหรือลำไส้อุดตัน
  - กำลังตั้งท้องหรือให้นมลูก เพราะไม่มีข้อมูลยืนยันความปลอดภัย
  - กินยานี้แล้วเกิดอาการเจ็บข้ออย่างรุนแรง
- **ปรึกษาแพทย์และเภสัชกร** ถ้ากำลังใช้ยาดังต่อไปนี้
  - ยารักษาเบาหวานชนิดอื่น
  - ยาโรคหัวใจ ยาหลอดเลือด
  - ยารักษาโรคไตหรือยาลดไขมัน

**3. วิธีใช้ยา**

**3.1 ขนาดและวิธีใช้**

- **ควรใช้ยาตามคำแนะนำของแพทย์หรือ เภสัชกร** เท่านั้น เพราะขนาดและระยะเวลาในการใช้ยานี้ขึ้นกับชนิดและความรุนแรงของโรค
- กินยานี้วันละ 1 ครั้ง โดยกินก่อนหรือหลังอาหารก็ได้

**3.2 หากลืมกินยาควรทำอย่างไร**

- ให้กินยาทันทีที่นึกได้ แต่ถ้านึกได้เมื่อข้ามวันมาแล้วให้รอกินยาของมื้อต่อไป และห้ามกินยาเพิ่มเป็น 2 เท่า

**3.3 ถ้ากินยานี้เกินขนาดที่แนะนำ ควรทำอย่างไร**

- ให้สังเกตอาการอย่างใกล้ชิด หากมีอาการผิดปกติที่รุนแรง เช่น หัวใจเต้นผิดปกติ ให้รีบนำส่งโรงพยาบาล

**4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างใช้ยา**

- พบแพทย์ตามนัดอย่างสม่ำเสมอ เพื่อติดตามผลการรักษาหรืออันตรายจากยา
- ห้ามหยุดยาเอง และให้กินยานี้อย่างต่อเนื่องตามคำแนะนำของแพทย์ หรือเภสัชกร
- แจ้งคนในบ้านและคนใกล้ชิดว่าหากพบว่าตนเองหมดสติ ใจสั่น แขนขาอ่อนแรง เหงื่อออกตัวเย็น ให้รีบนำส่งโรงพยาบาลทันที เพราะกินยานี้แล้วอาจทำให้น้ำตาลในเลือดต่ำ
- หากมีอาการน้ำตาลในเลือดต่ำ เช่น หิวมาก ใจสั่น ให้กิน ลูกอม หรือ น้ำหวาน แต่ถ้ายังไม่หายหรือมีอาการรุนแรงขึ้น ให้ผู้อื่นพาไปส่งที่โรงพยาบาล
- หากมีอาการน้ำตาลในเลือดต่ำ **อย่าขับซิ่ง** ทำงานกับเครื่องจักรกล หรืองานที่เสี่ยงต่อการพลัดตกจากที่สูง
- **อย่ากินยานี้พร้อมเหล้าหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์**

**5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา**

**5.1 อาการที่ต้องรีบไปพบแพทย์ทันที**

- ลมพิษ บวมที่ใบหน้า เปลือกตา ริมฝีปาก
  - หน้ามืด เป็นลม แน่นหน้าอก หายใจลำบาก
  - ผื่นแดง ตุ่มพอง ผื่นหนังหลุดลอก มีจุดตามผิวหนัง หรือเลือดออกผิดปกติ
  - ตัวเหลือง ตาเหลือง เบื่ออาหาร ปัสสาวะสีเข้ม
  - มีอาการ**ท้องบวม** ร่วมกับ อาเจียน คลื่นไส้ ปวดท้อง ท้องผูก
  - ปัสสาวะเลือดปน
  - มีไข้ร่วมกับไอแห้ง หายใจลำบาก
  - มีไข้ร่วมกับปวดท้องอย่างรุนแรง และปวดหลัง
- “ให้หยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที”**

**5.2 อาการที่ไม่จำเป็นต้องไปพบแพทย์ทันที แต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์**

- เป็นแผลในปาก ท้องอืด ท้องเสีย

**6. ควรเก็บยานี้อย่างไร**

- เก็บยาไว้ในภาชนะบรรจุเดิมตามที่ได้รับมา
- เก็บยาในที่แห้ง อบอุ่นโดยตรง โดยทั่วไปควรเก็บที่อุณหภูมิไม่เกิน 30 องศาเซลเซียส ไม่เก็บยาในที่ร้อนหรือชื้น เช่น ในรถ ห้องน้ำ ห้องครัว
- ควรแกะยาออกจากแผงเมื่อจะกินในแต่ละครั้งเท่านั้น ห้ามแกะยาออกจากแผงทิ้งไว้เป็นเวลานาน เพราะยาอาจเสียได้
- เก็บยาให้พ้นมือเด็ก

**7. ลักษณะและส่วนประกอบของยานี้**

- **ลักษณะยา** เม็ดกลมเคลือบฟิล์มสีแดงอ่อน
- **ตัวยาสําคัญ** เทเนลิกลิปติน 20 มิลลิกรัม
- **ส่วนประกอบอื่น ๆ** ได้แก่ ดี-แมนนิทอล, แป้งข้าวโพด, ไฮดรอกซีโพรพิลเซลลูโลส, กรดซิลลิซิค, แมกนีเซียมสเตียเรต, ไฮโปรมีลโลส, แมโครกอล 400, ไททาเนียมไดออกไซด์, ไอออนออกไซด์, น้ำมันที่ผ่านการเติมไฮโดรเจน

**ผู้ผลิต** บริษัท มิตรชุบิชิ ทานาเบะ ฟาร์มา แพคทอรี ประเทศญี่ปุ่น

**ผู้นำเข้า** บริษัท มิตรชุบิชิ ทานาเบะ ฟาร์มา (ไทยแลนด์) จำกัด ประเทศไทย

**ผู้แทนจำหน่าย** บริษัท มิตรชุบิชิ ทานาเบะ ฟาร์มา (ไทยแลนด์) จำกัด ประเทศไทย

**เอกสารนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ** 19 พฤษภาคม 2563

**ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ของ อย.**

- <http://www.fda.moph.go.th/sites/oss/Pages/Main.aspx>
- <http://ndi.fda.moph.go.th/>

**เอกสารนี้เป็นข้อมูลโดยย่อ หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร**