

อัลฟูโซซิน
ความแรง 10 มิลลิกรัม
ชนิดเม็ดแบบออกฤทธิ์ยาวนาน
ชื่อการค้า FUZOSIN 10
(ฟูโซซิน 10)

1. ยานี้คืออะไร

1.1 ยานี้มีชื่อว่าอะไร

- ยานี้มีชื่อว่า อัลฟูโซซิน (alfuzosin) เป็นยาในกลุ่ม อัลฟา-บล็อกเกอร์

1.2 ยานี้ใช้เพื่ออะไร

- รักษาอาการของโรคต่อมลูกหมากโต
- รักษาภาวะปัสสาวะคั่งชนิดเฉียบพลันที่เกิดจากต่อมลูกหมากโต โดยใช้ร่วมกับการใช้ยาอื่น

2. ข้อควรระวังก่อนใช้ยา

2.1 ห้ามใช้ยานี้เมื่อไร

- ⊗ เคยแพ้ยานี้ หรือส่วนประกอบของยานี้
- ⊗ เคยมีอาการหน้ามืดหรือจะเป็นลม ขณะลุกขึ้นยืน
- ⊗ กำลังใช้ยาอื่นๆ ในกลุ่ม อัลฟา-บล็อกเกอร์
- ⊗ ดับทำงานผิดปกติ

2.2 ข้อควรระวังเมื่อใช้ยานี้

- ให้แจ้งแพทย์หรือเภสัชกรทุกครั้ง ในกรณีต่อไปนี้
 - มีอาการเจ็บแน่นหน้าอก
 - มีปัญหาเกี่ยวกับการทำงานของไต
 - มีปัญหาโรคหัวใจ
 - ผู้ที่อายุมากกว่า 65 ปี
 - มีอาการปวดเมื่ออวัยวะเพศแข็งตัว
 - กำลังใช้ยาบางชนิด เช่น ยาฆ่าเชื้อ ยารักษาเอชไอวี

3. วิธีใช้ยา

3.1 ขนาดและวิธีใช้

- ควรใช้ยาตามคำแนะนำของแพทย์หรือเภสัชกรเท่านั้น เพราะขนาดและระยะเวลาในการใช้ยานี้ขึ้นกับชนิดและความรุนแรงของโรค
- กลืนยาทั้งเม็ด ไม่หัก บด หรือ เคี้ยว
- กินยารวันละ 1 ครั้ง หลังอาหาร

3.2 หากลืมกินยาควรทำอย่างไร

- ให้เว้นยามื้อนั้น แล้วเริ่มกินมื้อถัดไปเลย ไม่ต้องกินยาเพิ่มเป็น 2 เท่า

3.3 ถ้ากินยานี้เกินขนาดที่แนะนำ ควรทำอย่างไร

- หากกินยานี้เกินขนาด ให้สังเกตอาการอย่างใกล้ชิด หากมีอาการผิดปกติรุนแรง เช่น ความดันเลือดต่ำจนหน้ามืดจะเป็นลม ให้อนหนายและแจ้งญาติ หรือคนใกล้ชิดพาส่งโรงพยาบาลทันที

4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างใช้ยา

- หากกินยานี้แล้วมีอาการง่วงนอนและอ่อนแรง ควรหลีกเลี่ยงการขับรถหรือการทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักร
- หากเริ่มต้นกินยาแล้วมีอาการหน้ามืดหรือจะเป็นลม ให้อนลง
- แจ้งแพทย์ว่ากำลังใช้ยานี้ หากจะมีการผ่าตัดต่อกระดูก

5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา

5.1 อาการที่ต้องหยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที

- ลมพิษ บวมที่ใบหน้า เปลือกตา ริมฝีปาก
- หน้ามืด เป็นลม แน่นหน้าอก หายใจลำบาก
- ผื่นแดง ตุ่มพอง ผิวหนังหลุดลอก มีจ้ำตามผิวหนังหรือเลือดออกผิดปกติ
- เจ็บหน้าอก
- ปวดขณะอวัยวะเพศแข็งตัว

“ให้หยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที”

5.2 อาการที่ไม่จำเป็นต้องหยุดยา แต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์

- วิงเวียน หน้ามืด ปวดศีรษะ
- คลื่นไส้ ปวดท้อง อาเจียน
- อ่อนแรง

“ไม่จำเป็นต้องหยุดยา แต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์”

6. ควรเก็บยานี้อย่างไร

- เก็บไว้ในบรรจุภัณฑ์เดิมตามที่ได้รับมา
- เก็บยาในที่แห้ง อบอุ่นโดยตรง โดยทั่วไป ควรเก็บที่อุณหภูมิไม่เกิน 30 องศาเซลเซียส ไม่เก็บยาในที่ร้อนชื้น เช่น ในรถ ห้องน้ำ ห้องครัว
- เก็บยาให้พ้นมือเด็ก

7. ลักษณะและส่วนประกอบของยานี้

- **ลักษณะยา** เม็ดรูปกลมมน สามชั้น ชั้นบนและชั้นล่าง สีเหลือง ชั้นกลางสีขาว
- **ตัวยาสําคัญ** อัลฟูโซซิน
- **ส่วนประกอบอื่น ๆ** ได้แก่ ไฮโพรเมลโลส 2208 (Hypromellose 2208), ไฮโดรจีนเตตาคาสเตอร์ออยล์ (Hydrogenated castor oil), เฟอริกออกไซด์ (Ferric oxide), เอทิลเซลลูโลส (Ethylcellulose), คอลลอยด์ซิลิกอน ไดออกไซด์ (Colloidal silicon dioxide), แมกนีเซียมสเตียเรท (Magnesium stearate), 95% เอทิลแอลกอฮอล์ (95% Ethyl alcohol), แมนนิทอล (Mannitol), โปวีโดน เค 30 (Povidone K30), ไมโครคริสตัลไลน์เซลลูโลส พีเอช 101 (Microcrystalline cellulose PH 101), ไฮโพรเมลโลส 2910 (Hypromellose 2910)

ผู้ผลิต บริษัท พอนด์ เคมีคอล จำกัด จังหวัดปทุมธานี ประเทศไทย

โทร. 0-2157-1111 แฟกซ์ 0-2943-5038

เอกสารนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ กรกฎาคม 2565

ศึกษาข้อมูลยาเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ของ อย.

- <http://www.fda.moph.go.th/sites/oss/Pages/Main.aspx>
- <http://ndi.fda.moph.go.th/>

เอกสารนี้เป็นข้อมูลโดยย่อ หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร