

# ดาราทุมูแมบ

ความแรง 20 มิลลิกรัม ต่อ 1 มิลลิลิตร  
ชนิดฉีด

ชื่อการค้า Darzalex™ (ดาร์ซะเล็กซ์)

## 1. ยานี้คืออะไร

### 1.1 ยานี้มีชื่อว่าอะไร

- ยานี้มีชื่อว่า ดา-รา-ทุมู-แมบ (daratumumab)
- เป็นยาเพิ่มการทำลายเซลล์มะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดมัลพิวโลมา

### 1.2 ยานี้ใช้เพื่ออะไร

- ยานี้ใช้ร่วมกับยาอื่นในการรักษาโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดมัลพิวโลมาในผู้ที่เพิ่งได้รับการตรวจว่าเป็นโรคนั้น
- ยานี้ใช้รักษาโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดมัลพิวโลมา ที่กลับมาเป็นซ้ำหรือไม่ตอบสนองต่อการรักษาอื่น

## 2. ข้อควรรู้ก่อนใช้ยา

### 2.1 ห้ามใช้ยานี้เมื่อไร

- เมื่อเคยแพ้ยานี้ หรือส่วนประกอบของยานี้

### 2.2 ข้อควรระวังเมื่อใช้ยานี้ หากท่านมีภาวะต่อไปนี้

- ไม่ควรใช้ยานี้ในเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี เพราะยังไม่มีการศึกษายืนยันความปลอดภัย
- ระมัดระวังการใช้ยานี้ในหญิงมีครรภ์หรือให้นมบุตร เนื่องจากไม่มีข้อมูลยืนยันความปลอดภัย
- ระมัดระวังการใช้ยานี้ในคนที่ต้องจำกัดการกินเกลือโซเดียม เนื่องจากยานี้มีเกลือโซเดียมเป็นส่วนประกอบ

## 3. วิธีใช้ยา

### 3.1 ขนาดและวิธีใช้ ควรใช้ยาตามคำแนะนำของแพทย์หรือ เภสัชกร เพราะขนาดและระยะเวลาในการใช้ยานี้ขึ้นกับชนิดและความรุนแรงของโรค

- ยานี้จะฉีดเข้าสู่เส้นเลือดดำอย่างช้า ๆ อาจใช้เวลาหลายชั่วโมง เพื่อลดอาการข้างเคียงที่อาจเกิดจากการฉีดยาเร็วเกินไป
- ก่อนจะเริ่มฉีดยานี้ แพทย์อาจจะให้ท่านฉีดหรือกินยาป้องกันอาการไม่พึงประสงค์ที่อาจเกิดขึ้นจากยานี้

### 3.2 หากลืมมาฉีดยาตามนัดควรทำอย่างไร

- รีบไปพบแพทย์เพื่อฉีดยาทันทีที่นึกได้

## 4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างใช้ยา

### 4.1 ขณะกำลังฉีดยานี้ หากมีอาการ

- หนาวสั่น เจ็บคอ ไอ
- คลื่นไส้ อาเจียน
- คัน
- หายใจลำบาก แน่นหน้าอก

“ให้แจ้งอาการกับแพทย์หรือพยาบาลทันที”

### 4.2 ข้อควรปฏิบัติหลังฉีดยานี้

- มาฉีดยาตามวันที่แพทย์นัด
- หลังฉีดยาเสร็จ ท่านอาจจะได้ยาป้องกันอาการไม่พึงประสงค์ ให้ใช้นั้นตามคำแนะนำของแพทย์และเภสัชกร
- หลีกเลี่ยงการตั้งครรภ์ ระหว่างใช้ยานี้ และหลังหยุดใช้ยานี้ไปอีก 3 เดือน
- ระมัดระวังการขับถ่ายยานยนต์หรือทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักรกล หรือทำงานที่เสี่ยงต่อการพลัดตกจากที่สูง

## 5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา

### 5.1 อาการที่ต้องรีบไปพบแพทย์ทันทีคือ

- ลมพิษ บวมที่ใบหน้า เปลือกตา ริมฝีปาก

- หน้ามืด เป็นลม แน่นหน้าอก หายใจลำบาก
- ผื่นแดง ตุ่มพอง ผื่นหนังหลุดลอก มีจ้ำตามผิวหนังหรือเลือดออกผิปกติ
- ปวดบวม มีไข้สูง หายใจหอบ ไอรุนแรง มีเสมหะมาก
- หัวใจเต้นไม่เป็นจังหวะ ใจสั่น
- ตัวเหลืองตาเหลือง เบื่ออาหาร รู้สึกเหนื่อยเมื่อยล้า
- ดื่บอ่อนอึกเสบ

“เป็นอาการที่ต้องรีบไปพบแพทย์ทันที”

### 5.2 อาการที่อาจเกิดขึ้น ไม่ต้องไปพบแพทย์ทันที แต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์ทันที

- อ่อนเพลีย
- คลื่นไส้ ท้องเสีย
- ปวดเกร็งที่กล้ามเนื้อ
- ปวดหัว
- มือบวม เท้าบวม
- รู้สึกเจ็บหรือชา ตามปลายมือ ปลายเท้า

“เป็นอาการที่ไม่จำเป็นต้องไปพบแพทย์ทันที แต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์ทันที”

## 6. ควรเก็บยานี้อย่างไร

- ท่านจะไม่ได้รับยานี้กลับบ้าน เนื่องจากเป็นยาที่ใช้ในโรงพยาบาลเท่านั้น

## 7. ลักษณะและส่วนประกอบของยา

- ของเหลวไม่มีสีถึงสีเหลือง บรรจุยากล่องละ 1 ขวดแก้ว (glass vial)
- สารเข้มข้น 1 มิลลิลิตรประกอบด้วยดาราทุมูแมบ 20 มิลลิกรัม แต่ละขวด (vial) ของสารเข้มข้นขนาด 5 มิลลิลิตรประกอบด้วยดาราทุมูแมบ 100 มิลลิกรัม แต่ละขวด (vial) ของสารเข้มข้นขนาด 20 มิลลิลิตรประกอบด้วยดาราทุมูแมบ 400 มิลลิกรัม
- สารประกอบอื่นๆ: กรดกลูตาซีลอะซิติก (glacial acetic acid) แมนนิทอล (mannitol)

พอลิซอร์เบต 20 (polysorbate 20)  
โซเดียมอะซิเตตไตรไฮเดรต (sodium acetate trihydrate) โซเดียมคลอไรด์ (sodium chloride) และน้ำสำหรับยาฉีด (water for injection)

**คำเตือนตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข**  
ยานี้อาจทำให้เกิดอันตรายร้ายแรงได้ ต้องใช้ภายใต้  
การควบคุมของแพทย์เท่านั้น

**เอกสารนี้เป็นข้อมูลโดยย่อ  
หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร**

โปรดอ่านเอกสารกำกับยาสำหรับแพทย์ฉบับเต็มได้  
ทางเว็บไซต์ของ อย.

<http://www.fda.moph.go.th/sites/oss/Pages/Main.aspx>  
<http://ndi.fda.moph.go.th/>

เอกสารนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ 30 มีนาคม 2563

นำเข้าโดยบริษัท แจนเซน-ซีแลก จำกัด  
106 หมู่ 4 นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง ถนนฉลอง  
กรุง แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ  
10520

โทรศัพท์: 02-792-7200 โทรสาร: 02-792-7222

**เอกสารกำกับยาภาษาไทยสำหรับผู้ป่วย**  
**ข้อมูลสำหรับผู้ป่วย**  
**ดาร์ซุเซเล็กซ์™ (ดาร์-ซุ-เล็กซ์)**  
**(ดาราทุมแมบ (INN: Daratumumab))**  
**ยาฉีด สำหรับฉีดเข้าหลอดเลือดดำ**

### **ดาร์ซุเซเล็กซ์คืออะไร?**

ดาร์ซุเซเล็กซ์ คือยาที่สั่งใช้โดยแพทย์เพื่อรักษาผู้ใหญ่ที่เป็นมะเร็งชนิดมัลติเพิล มัยอิโกลมา (multiple myeloma) โดย:

- ใช้ร่วมกับเลนาโดไมด์ (lenalidomide) และเด็คซาเมทาโซน (dexamethasone) ในผู้ที่เพิ่งได้รับการวินิจฉัยใหม่ว่าเป็นมะเร็งชนิดมัลติเพิล มัยอิโกลมา (multiple myeloma) ซึ่งไม่สามารถรับการปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดชนิดที่ใช้เซลล์ต้นกำเนิดของตนเอง (autologous stem cell transplantation) ได้และในผู้ที่เคยได้รับการรักษาด้วยมะเร็งชนิดมัลติเพิล มัยอิโกลมา (multiple myeloma) มาก่อน อย่างน้อย 1 ชนิด
- ใช้ร่วมกับบอร์โทซอมีบ (bortezomib), เมลฟาแลน (melphalan) และเพรดนิโซน (prednisone) ในผู้ที่เพิ่งได้รับการวินิจฉัยใหม่ว่าเป็นมะเร็งชนิดมัลติเพิล มัยอิโกลมา (multiple myeloma) ซึ่งไม่สามารถรับการปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดที่ใช้เซลล์ต้นกำเนิดของตนเอง (autologous stem cell transplantation) ได้
- ใช้ร่วมกับบอร์โทซอมีบ (bortezomib), ทาไลโดไมด์ (thalidomide) และเด็คซาเมทาโซน (dexamethasone) ในผู้ที่เพิ่งได้รับการวินิจฉัยใหม่ ซึ่งมีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะรับการปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดชนิดที่ใช้เซลล์ต้นกำเนิดของตนเอง (autologous stem cell transplantation) ได้
- ใช้ร่วมกับบอร์โทซอมีบ (bortezomib) และเด็คซาเมทาโซน (dexamethasone) ในผู้ที่เคยได้รับการรักษาด้วยมะเร็งชนิดมัลติเพิล มัยอิโกลมา (multiple myeloma) มาก่อน อย่างน้อย 1 ชนิด
- ใช้ร่วมกับโพมาลิดไมด์ (pomalidomide) และเด็คซาเมทาโซน (dexamethasone) ในผู้ที่เคยได้รับการรักษาด้วยมะเร็งชนิดมัลติเพิล มัยอิโกลมา (multiple myeloma) มาก่อน อย่างน้อย 2 ชนิด ประกอบด้วยเลนาลิดโดไมด์ (lenalidomide) และยาที่ยับยั้งโปรทีเอสโชม (proteasome inhibitor)
- ใช้เป็นยาเดี่ยวในผู้ที่เคยได้รับยามาก่อนอย่างน้อย 3 ชนิด ประกอบด้วยยาที่ยับยั้งโปรทีเอสโชม (proteasome inhibitor) และยาปรับภูมิคุ้มกันของร่างกาย (immunomodulatory agent) หรือ ผู้ที่ไม่ตอบสนองต่อยาที่ยับยั้งโปรทีเอสโชม (proteasome inhibitor) และยาปรับภูมิคุ้มกันของร่างกาย (immunomodulatory agent)

ความปลอดภัยและประสิทธิภาพของดาร์ซุเซเล็กซ์ในเด็กยังไม่เป็นที่ทราบแน่ชัด

#### **ห้ามใช้ดาร์ซุเซเล็กซ์:**

- หากท่านมีประวัติการเกิดปฏิกิริยาการแพ้อย่างรุนแรงต่อดาราทุมแมบหรือส่วนประกอบใดๆ ในดาร์ซุเซเล็กซ์ ส่วนประกอบทั้งหมดในดาร์ซุเซเล็กซ์ดูได้จากส่วนท้ายของเอกสารกำกับยา

ก่อนที่ท่านจะได้รับการฉีดดาร์ซุเซเล็กซ์ ให้แจ้งข้อมูลด้านสุขภาพทั้งหมดของท่านแก่แพทย์ผู้รักษา รวมถึงถ้าท่าน:

- เคยมีประวัติเกี่ยวกับปัญหาตาจากการหายใจ
  - เคยเป็นโรคงูสวัด (herpes zoster)
  - เคยเป็นหรือกำลังติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบี (hepatitis B) เนื่องจากตาติดเชื้อสามารถทำให้เชื้อไวรัสตับอักเสบบีกลับมาก่อโรคได้อีก แพทย์ผู้รักษาของท่านจะตรวจจากการแสดงของการติดเชื้อก่อนรักษา ระหว่างการรักษาและหลังการรักษาด้วยยาต้านไวรัสตับอักเสบบี ให้ท่านแจ้งแพทย์ผู้รักษาที่ท่านหากมีอาการเหนื่อยมาก หรือสับสนหรือบริเวณตาขาวกลายเป็นสีเหลือง
  - กำลังตั้งครรภ์ หรือวางแผนจะตั้งครรภ์ ตาติดเชื้ออาจเป็นอันตรายต่อทารกในครรภ์ได้
    - หญิงที่มีโอกาสตั้งครรภ์ที่ใช้วิธีคุมกำเนิดที่มีประสิทธิภาพ ในระหว่างที่รับการรักษา และเป็นเวลาอย่างน้อย 3 เดือนหลังจากได้รับยาต้านไวรัสตับอักเสบบีครั้งสุดท้าย ให้ปรึกษาแพทย์เกี่ยวกับวิธีการคุมกำเนิดที่ท่านสามารถใช้ได้ในการรักษา
  - อยู่ในระหว่างให้นมบุตร หรือวางแผนจะให้หมมนบุตร เนื่องจากยังไม่ชัดเจนว่าตาติดเชื้อซึมออกทางน้ำนมได้หรือไม่
- ให้แจ้งแพทย์เกี่ยวกับยาทุกชนิดที่ท่านใช้ รวมถึงยาที่ถูกส่งขายโดยแพทย์และยาที่สามารถหาซื้อได้เอง วิตามิน และผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากสมุนไพร

## ฉันจะได้รับตาเชื้ออะไร?

- ตาเชื้อเซลล์อาจให้เดี่ยวๆ หรือให้ร่วมกับยาอื่นที่ใช้รักษามะเร็งชนิดมัลติเพิล มัยอิโกลมา (multiple myeloma)
- แพทย์จะเป็นผู้ให้ตาเชื้อเซลล์แก่ท่านโดยการหยดเข้าหลอดเลือดดำอย่างช้า ๆ (intravenous (IV) infusion)
- แพทย์จะเป็นผู้กำหนดช่วงเวลาระหว่างการให้ยาในแต่ละครั้ง รวมถึงจำนวนครั้งในการรักษาที่ท่านจะได้รับ
- แพทย์จะให้ยาก่อนการให้ตาเชื้อเซลล์แต่ละครั้ง และหลังจากการให้ตาเชื้อเซลล์แต่ละครั้ง เพื่อช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดปฏิกิริยาจากการหยดยาเข้าหลอดเลือดดำ (infusion reactions)
- หากท่านไม่ไปพบแพทย์ตามนัด ให้โทรแจ้งแพทย์โดยเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้เพื่อทำการนัดครั้งใหม่

## ผลข้างเคียงที่อาจขึ้นได้จากตาเชื้ออะไรบ้าง?

ตาเชื้อเซลล์อาจก่อให้เกิดปฏิกิริยาที่ร้ายแรง รวมถึง:

- **ปฏิกิริยาจากการหยดยาเข้าหลอดเลือดดำ (infusion reaction)** ปฏิกิริยาจากการหยดยาเข้าหลอดเลือดดำ (infusion reaction) พบได้บ่อยจากการได้รับตาเชื้อเซลล์ และอาจมีความรุนแรงหรือร้ายแรงได้ หากเกิดปฏิกิริยาจากการหยดยาเข้าหลอดเลือดดำ (infusion reactions) ขึ้นกับท่าน แพทย์อาจหยุดการหยดตาเชื้อเซลล์ชั่วคราว หรืออาจหยุดการรักษาด้วยตาเชื้อเซลล์อย่างถาวร ให้เข้ารับการรักษาทางการแพทย์ทันทีถ้าท่านมีอาการใดๆ ดังต่อไปนี้:
 

<ul style="list-style-type: none"> <li>• หายใจหอบหรือหายใจลำบาก</li> <li>• เวียนศีรษะ หรือรู้สึกหน้ามืด เป็นลม</li> <li>• (ความดันโลหิตต่ำ)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• จุกแน่นในลำคอ</li> <li>• น้ำมูกไหล หรือคัดจมูก</li> <li>• ปวดศีรษะ</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• อ่อนเพลีย</li> <li>• อาเจียน</li> <li>• หนาวสั่น</li> </ul>	

- ไอ
- มีอาการคัน
- หายใจมีเสียงหวีด
- มีไข้

- **ผลการตรวจเลือดมีการเปลี่ยนแปลง** ดาร์ชเชลิกซ์สามารถส่งผลต่อการตรวจความเข้ากันได้ของชนิดเลือดของท่าน การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้สามารถกินเวลานานถึง 6 เดือนหลังจากที่ท่านได้รับดาร์ชเชลิกซ์ครั้งสุดท้าย แพทย์จะตรวจความเข้ากันได้ของชนิดเลือดของท่านก่อนเริ่มการรักษาด้วยดาร์ชเชลิกซ์ **ก่อนรับการถ่ายเลือด** ให้แจ้งแพทย์ทุกคนว่าท่านอยู่ระหว่างการรักษาด้วยดาร์ชเชลิกซ์
- **การลดลงของจำนวนเม็ดเลือด** ดาร์ชเชลิกซ์มีผลลดจำนวนเม็ดเลือดขาวที่ช่วยในการต่อสู้กับการติดเชื้อ และมีเม็ดเลือดที่เรียกว่าเกล็ดเลือดซึ่งช่วยให้เลือดแข็งตัว แพทย์จะตรวจจำนวนเม็ดเลือดขาวของท่านในระหว่างที่ได้รับการรักษาด้วยดาร์ชเชลิกซ์ ให้แจ้งแพทย์หากมีไข้ หรือมีอาการพukup้ำ หรือเลือดออก

#### ผลข้างเคียงที่พบบ่อยที่สุดจากการได้รับดาร์ชเชลิกซ์ ได้แก่:

- |                         |                     |  |
|-------------------------|---------------------|--|
| • รู้สึกเหนื่อย         | • มีไข้             | • มีอาการคล้ายไข้หวัด (ติดเชื้อระบบทางเดินหายใจส่วนบน) |
| • คลื่นไส้              | • ไอ                |  |
| • ท้องเสีย              | • กล้ามเนื้อหดเกร็ง | • เส้นประสาทถูกทำลายทำให้เกิดอาการเหน็บชา หรือปวด      |
| • หายใจหอบ              | • ปวดหลัง           | • มีข้อเท้า หรือเท้าบวม                                |
| • มีปัญหาด้านการนอนหลับ | • ปวดข้อ            | • ท้องผูก  |
| • รู้สึกอ่อนแอ          | • อาเจียน           | • หนาวสั่น   |
| • ความอยากอาหารลดลง     | • หลอดลมอักเสบ      | • เวียนศีรษะ   |
|                         |                     | • การติดเชื้อในปอด (โรคปอดบวม)                         |

แจ้งแพทย์ถ้าท่านได้รับผลข้างเคียงที่ก่อให้เกิดความรำคาญ หรืออาการยังคงอยู่ไม่หายไป อาการเหล่านี้ไม่ใช่ผลข้างเคียงทั้งหมดที่สามารถเกิดขึ้นได้จากดาร์ชเชลิกซ์ ให้โทรสอบถามแพทย์เพื่อขอรับคำแนะนำเกี่ยวกับผลข้างเคียง ท่านสามารถรายงานผลข้างเคียงได้ที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

#### ฉันควรเก็บรักษาตำรับยาอย่างไร?

เก็บในตู้เย็นที่อุณหภูมิ 2 องศาเซลเซียส ถึง 8 องศาเซลเซียส (36 องศาฟาเรนไฮต์ ถึง 46 องศาฟาเรนไฮต์)

ห้ามแช่แข็งหรือเขย่า เก็บให้พ้นแสง ยานี้ไม่มีวัตถุกันเสีย

เก็บยาให้พ้นจากสายตาและมือเด็ก

#### ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับการใช้ตำรับยาเชลิกซ์อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ

ในบางกรณีอาจมีการสั่งจ่ายยาเพื่อวัตถุประสงค์ที่นอกเหนือจากที่มียาระบุไว้ในเอกสารกำกับยาสำหรับผู้ป่วย ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับตำรับยาเชลิกซ์ซึ่งจัดทำขึ้นสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ได้จากแพทย์หรือเภสัชกร

#### ส่วนประกอบในตำรับยาเชลิกซ์มีอะไรบ้าง?

**ตัวยาสําคัญ:** ดาราพูนแมบ

สารเข้มข้น 1 มิลลิลิตรประกอบด้วยดาราทามูแมนบ 20 มิลลิลิตร แต่ละขวด (vial) ของสารเข้มข้นขนาด 5 มิลลิลิตรประกอบด้วยดาราทามูแมนบ 100 มิลลิลิตร แต่ละขวด (vial) ของสารเข้มข้นขนาด 20 มิลลิลิตร ประกอบด้วยดาราทามูแมนบ 400 มิลลิลิตร

**สารประกอบอื่นๆ:** กรดกลูตาซีลอะซิติก (glacial acetic acid) แมนนิทอล (mannitol) พอลิซอร์เบต 20 (polyorbate 20) โซเดียมอะซิเตตไตรไฮเดรต (sodium acetate trihydrate) โซเดียมคลอไรด์ (sodium chloride) และน้ำสำหรับยาฉีด (water for injection)

**รูปแบบยาและขนาดบรรจุ:** ดาร์ชอะเล็กซ์เป็นสารเข้มข้นสำหรับเตรียมเป็นสารละลายเพื่อหยดเข้าหลอดเลือดดำ และเป็นซองเหลวไม่มีสีถึงสีเหลือง ดาร์ชอะเล็กซ์จะถูกจัดส่งในกล่องกระดาษ ซึ่งบรรจุยาซองละ 1 ขวดแก้ว (glass vial)

### คำเตือนตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข

ยานี้อาจทำให้เกิดอันตรายร้ายแรงได้ ต้องใช้ภายใต้การควบคุมของแพทย์เท่านั้น

### เลขทะเบียนตำรับยาและวันที่ได้รับอนุมัติทะเบียนตำรับยา

ผลิตโดย	เลขทะเบียนตำรับยา	วันที่ได้รับอนุมัติทะเบียนตำรับยา
Cilag AG, Schaffhausen ประเทศสวิตเซอร์แลนด์	1C 30/60 (NBC)	3 สิงหาคม 2560
Vetter Pharma Fertigung GmbH & Co. KG, Ravensburg ประเทศเยอรมนี	1C 31/60 (NBC)	3 สิงหาคม 2560
Baxter Pharmaceutical Solutions, LLC ประเทศสหรัฐอเมริกา	1C XX/XX (NBC)	Day-Month-Year

### วันที่แก้ไขเอกสารกำกับยาล่าสุด

4 มกราคม 2564 (US PIL เวอร์ชัน กันยายน 2562)

### นำเข้าโดย

บริษัท แจนเซน-ซิลแลก จำกัด  
106 หมู่ 4 นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง  
ถนนฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง  
กรุงเทพฯ 10520  
โทรศัพท์: 02-792-7200  
โทรสาร: 02-792-7222

โปรดอ่านเอกสารกำกับยาสำหรับแพทย์ฉบับเต็มใต้ทางเว็บไซต์  
<http://www.fda.moph.go.th/sites/oss/Pages/Main.aspx>



<http://ndi.fda.moph.go.th/>