

# ยาสุดพ่น ชื่อการค้า BREZTRI (เบริส-ทรี)

## 1. ยานี้คืออะไร

### 1.1 ยานี้มีชื่อว่าอะไร

- ยานี้เป็นยาสูตรผสม มีชื่อว่า BREZTRI (เบริส-ทรี) ซึ่งมีตัวยาสำคัญและส่วนประกอบตามที่ระบุในข้อ 7. ลักษณะและส่วนประกอบของยานี้

### 1.2 ยานี้ใช้เพื่ออะไร

- ยานี้ใช้ในผู้ใหญ่สำหรับรักษาโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังที่แพทย์ตรวจแล้วว่าจำเป็นต้องใช้ยานี้

## 2. ข้อควรระวังก่อนใช้ยา

### 2.1 ห้ามใช้ยานี้เมื่อไร

- ห้ามใช้ในผู้ที่เคยแพ้ยานี้ หรือส่วนประกอบของยานี้
- ห้ามใช้ในเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี

### 2.2 ข้อควรระวังเมื่อใช้ยานี้

- ให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรในกรณีต่อไปนี้
  - มีภาวะความดันโลหิตสูง หรือเป็นโรคหัวใจ
  - เป็นโรคเบาหวาน
  - ติดเชื้อมด
  - เป็นโรคเกี่ยวกับต่อมไทรอยด์
  - มีภาวะเกี่ยวกับต่อมลูกหมาก หรือมีปัญหาในการปัสสาวะ
  - เป็นโรคต่อหีน
  - เป็นโรคตับ หรือโรคไต
  - กำลังตั้งท้อง หรือวางแผนที่จะมีลูก
  - กำลังให้นมลูก
  - ใช้ยา สมุนไพร หรือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารอื่นอยู่

สอบถามแพทย์หรือเภสัชกรก่อนใช้ยานี้  
หากไม่แน่ใจว่ามีอาการดังกล่าวหรือไม่

### คำเตือน:

- ห้ามใช้ในผู้ที่แพ้ยานี้
- ห้ามใช้ในผู้ที่ติดเชื้อมดแบบแพร่กระจาย เว้นแต่ในกรณีจำเป็น
- ระมัดระวังการใช้ในผู้ป่วยโรคแผลในกระเพาะอาหารหรือลำไส้ โรคเบาหวาน วัณโรค โรคติดเชื้อไวรัส

## 3. วิธีใช้ยา

### 3.1 ขนาดและวิธีใช้

- ควรใช้ยาตามคำแนะนำของแพทย์หรือ เภสัชกรเท่านั้น เพราะขนาดและระยะเวลาในการใช้ยานี้ขึ้นกับชนิดและความรุนแรงของโรค

### 3.2 หากลืมสุดยาควรทำอย่างไร

- ให้ใช้ยาทันทีที่นึกได้ แต่ถ้าใกล้เวลาของครั้งถัดไปให้รอใช้ยาของครั้งถัดไป ห้ามใช้ยาเพิ่มเป็น 2 เท่า

### 3.3 ถ้าใช้ยานี้เกินขนาดที่แนะนำ ควรทำอย่างไร

- ให้สังเกตอาการอย่างใกล้ชิด หากมีอาการผิดปกติที่รุนแรง เช่น หัวใจเต้นเร็วกว่าปกติ มีอาการสั่น มีปัญหาเกี่ยวกับการมองเห็น ปากแห้ง ปวดหัว หรือคลื่นไส้ ให้รีบนำส่งโรงพยาบาลทันที

## 4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างใช้ยา

- ห้ามหยุดยาเอง และให้ใช้ยานี้อย่างต่อเนื่องตามคำแนะนำของแพทย์ หรือเภสัชกร
- หลังจากใช้ยาให้บ้วนปากด้วยน้ำสะอาดทุกครั้ง
- ระมัดระวังการขับขีเยี่ยว นอน หรือทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักรกล หรือการทำงานที่เสี่ยงต่อการพลัดตกจากที่สูงเพราะยานี้อาจทำให้มึนงงได้

## 5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา

### 5.1 อาการที่ต้องหยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที

- ลมพิษ บวมที่ใบหน้า เปลือกตา ริมฝีปาก
  - หน้ามืด เป็นลม
  - ผื่นแดง ตุ่มพอง ผื่นหนังหลุดลอก มีจ้ำตามผื่นหรือเลือดออกผิดปกติ
  - แน่นหน้าอก ไอ หายใจมีเสียงหวีด หายใจไม่ออก
  - ไข้ หนาวสั่น มีเสมหะมากในลำคอและสีเสมหะผิดปกติ
- “ให้หยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที”**

### 5.2 อาการที่ไม่จำเป็นต้องหยุดยา แต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์

- มีฝ้าสีขาวในช่องปาก
- รู้สึกวิดกกังวล นอนไม่หลับ ปวดหัว
- รู้สึกไม่สบาย คลื่นไส้
- ไอ เสียงแหบ
- กล้ามเนื้อเป็นตะคริว
- ปัสสาวะบ่อยและเจ็บขณะปัสสาวะ

**“ไม่จำเป็นต้องหยุดยา  
แต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์”**

## 6. ควรเก็บยานี้อย่างไร

- เก็บไว้ในบรรจุภัณฑ์เดิมตามที่ได้รับมา
- เก็บยาในที่แห้ง อบอุ่นโดยแสงโดยตรง โดยทั่วไปควรเก็บที่อุณหภูมิต่ำกว่า 30 องศาเซลเซียส ไม่เก็บยาในที่ร้อนหรือชื้น เช่น ในรถ ห้องน้ำ ห้องครัว
- เก็บยาให้พ้นมือเด็ก
- หลังการเปิดซองฟอยล์บรรจุยา ต้องใช้ยาภายใน 3 เดือน

## 7. ลักษณะและส่วนประกอบของยานี้

- ลักษณะยา น້ายาขาวนตะกอนสีขาว บรรจุในกระป๋องอลูมิเนียมพร้อมตัวระบุปริมาณยา ตัวกระบอกสีเหลืองปากกระบอกฟอสฟอรัส ฝาครอบกันฝุ่นสีเทา
- ตัวยาสำคัญ ได้แก่
  - บูเดโซนิด์ 160 ไมโครกรัม
  - ไกลโคโพรนิล 7.2 ไมโครกรัม
  - ฟอร์มิเทอรอลฟูมาเรตไดไฮเดรต 5 ไมโครกรัม
- ส่วนประกอบอื่นๆ ได้แก่
  - ไฮโดรฟลูออโรอัลเคน 134 เอ (HFA 134a)
  - 1,2 ไดสเตียโรอิล-sn-กลีเซอ-3-ฟอสโฟโคลีน (1,2-distearoyl-sn-glycero-3-phosphocholine)
  - แคลเซียมคลอไรด์ไดไฮเดรต (calcium chloride dihydrate)

ผู้ผลิต: แอสตราเซนเนกา ดันเคิร์ก โปรตักซ์, ประเทศฝรั่งเศส

ผู้นำเข้า: บริษัท แอสตราเซนเนกา (ประเทศไทย) จำกัด กรุงเทพมหานคร

ผู้แทนจำหน่าย: บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด กรุงเทพมหานคร

เอกสารนี้ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 6 มีนาคม 2567

**ศึกษาข้อมูลยาเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ของ อย.**

- <http://www.fda.moph.go.th/sites/oss/Pages/Main.aspx>
- <http://ndi.fda.moph.go.th/>

**เอกสารนี้เป็นข้อมูลโดยย่อ  
หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร**