

พราลเซทีนิบ

ความแรง 100 มิลลิกรัม

ชนิดแคปซูล

ชื่อการค้า Gavreto (เกฟเร็ดโต)

1. ยานี้คืออะไร

1.1 ยานี้มีชื่อว่าอะไร

- ยานี้มีชื่อว่า พราลเซทีนิบ (Pralsetinib)

1.2 ยานี้ใช้เพื่ออะไร

ยานี้ใช้เพื่อรักษา

- โรคมะเร็งปอดในผู้ใหญ่ ซึ่งแพทย์ตรวจแล้วว่าต้องใช้อย่างนี้
- โรคมะเร็งไทรอยด์ในผู้ใหญ่และเด็กอายุ 12 ปีขึ้นไป ซึ่งแพทย์ตรวจแล้วว่าต้องใช้อย่างนี้

2. ข้อควรระวังก่อนใช้ยา

2.1 ห้ามใช้ยานี้เมื่อไร

X ห้ามใช้ในผู้ที่แพ้ยานี้ หรือส่วนประกอบของยานี้

2.2 ข้อควรระวังเมื่อใช้ยานี้

- ให้ปรึกษาแพทย์ หรือเภสัชกรในกรณีต่อไปนี้
 - เป็นผู้ป่วยโรคปอดหรือมีปัญหาการหายใจ
 - เป็นผู้ป่วยโรคตับ
 - มีภาวะความดันโลหิตสูง
 - มีภาวะเลือดออก
 - กำลังจะเข้ารับการผ่าตัด
 - กำลังตั้งท้อง หรือวางแผนที่จะมีลูก
 - ใช้ยา สมุนไพร หรือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารอื่นอยู่

สอบถามแพทย์หรือเภสัชกรก่อนใช้ยานี้
หากไม่แน่ใจว่ามีอาการดังกล่าวหรือไม่

คำเตือน: ยานี้อาจทำให้เกิดอันตรายร้ายแรงได้
ต้องใช้ภายใต้การควบคุมของแพทย์เท่านั้น

3. วิธีใช้ยา

3.1 ขนาดและวิธีใช้

- ควรใช้ยาตามคำแนะนำของแพทย์หรือ เภสัชกร
เท่านั้น เพราะขนาดและระยะเวลาในการใช้ยานี้
ขึ้นกับชนิดและความรุนแรงของโรค
- กินยานี้เมื่อท้องว่างเท่านั้น
- หากอาเจียนหลังกินยา ให้รอกินยาของมื้อต่อไป

3.2 หากลืมกินยาควรทำอย่างไร

- ให้กินยาทันทีที่นึกได้ แต่ถ้าลืมกินยามากกว่า 12 ชั่วโมง
ให้รอกินยาของมื้อต่อไป ห้ามกินยาเพิ่มเป็น 2 เท่า

3.3 ถ้ากินยานี้เกินขนาดที่แนะนำ ควรทำอย่างไร

- ให้รีบไปพบแพทย์ทันที

4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างใช้ยา

- พบแพทย์ตามนัดอย่างสม่ำเสมอ เพื่อติดตาม
ผลการรักษาหรืออันตรายจากยา
- ห้ามหยุดยาเอง และให้กินยานี้อย่างต่อเนื่องตาม
คำแนะนำของแพทย์ หรือเภสัชกร
- หมั่นตรวจวัดความดันเลือดเป็นประจำ
- อย่าดื่มน้ำเกรปฟรุตหรือกินผลส้มเขียวหวานที่ใช้ยานี้
เพราะอาจเกิดอันตรายเพิ่มขึ้นจากยาได้
- ผู้หญิงวัยเจริญพันธุ์
 - ต้องคุมกำเนิดด้วยวิธีอื่นที่ไม่ใช่การใช้ฮอร์โมน
คุมกำเนิด ตลอดระยะเวลาการรักษาและต้อง
ต่อไปอีก 2 สัปดาห์หลังจากหยุดใช้ยานี้
 - หากประจำเดือนผิดปกติ หรือประจำเดือนขาด
ต้องตรวจการตั้งครรภ์และปรึกษาแพทย์ทันที
- ผู้ชายที่ได้รับยานี้ ต้องใช้ถุงยางอนามัยเมื่อมี
เพศสัมพันธ์ทุกครั้ง ตลอดระยะเวลาการรักษาและต้อง
ใช้ต่อไปอีก 1 สัปดาห์หลังจากหยุดใช้ยานี้
- ผู้หญิงที่กำลังให้นมลูก ต้องงดให้นมลูกตลอด
ระยะเวลาการรักษาและต้องงดต่อไปอีก 1 สัปดาห์
หลังจากหยุดใช้ยานี้
- ระมัดระวังการขับชี่ยานยนต์ หรือทำงานเกี่ยวกับ
เครื่องจักรกล หรือการทำงานที่เสี่ยงต่อการพลัดตก
จากที่สูงเพราะยานี้อาจทำให้อ่อนเพลีย

5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา

5.1 อาการที่ต้องหยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที

- ลมพิษ บวมที่ใบหน้า เปลือกตา ริมฝีปาก
- หน้ามืด เป็นลม แน่นหน้าอก หายใจลำบาก
- ผื่นแดง ตุ่มพอง ผิวน้ำเหลือง ลมพิษ มีจ้ำตามผิวหนัง
หรือเลือดออกผิดปกติ
- หายใจสั้น ไอมีหรือไม่มีเสมหะ มีไข้
- ตัวเหลืองหรือตาเหลือง เจ็บท้องด้านขวา ปัสสาวะสีเข้ม
คันผิวหนัง ไม่อยากอาหาร คลื่นไส้หรืออาเจียน
- อาเจียนเป็นเลือดหรือสีน้ำตาล ปัสสาวะสีชมพูหรือสี
น้ำตาล อุจจาระสีแดงสดหรือดำ ไอเป็นเลือด
ประจำเดือนมากกว่าปกติ เลือดกำเดาไหล
- บวม กล้ามเนื้อเป็นตะคริว ชัก
- ปวดศีรษะ มึนงง สับสน
- เวียนศีรษะ ใจสั่น

“ให้หยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที”

5.2 อาการที่ไม่จำเป็นต้องหยุดยา แต่ถ้ามีอาการ รุนแรงให้ไปพบแพทย์

- อ่อนเพลีย
- เป็นแผลหรือเจ็บในปาก การรับรสเปลี่ยนไป
- ท้องผูกหรือท้องร่วง
- ปวดกล้ามเนื้อและข้อ

**“ไม่จำเป็นต้องหยุดยา
แต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์”**

6. ควรเก็บยานี้อย่างไร

- เก็บไว้ในบรรจุภัณฑ์เดิมตามที่ได้รับมา
- เก็บยาในที่แห้ง ปล่อยให้โดนแสงโดยตรง โดยทั่วไป
ควรเก็บที่อุณหภูมิต่ำกว่า 30 องศาเซลเซียส ไม่เก็บ
ยาในที่ร้อนหรือชื้น เช่น ในรถ ห้องน้ำ ห้องครัว
- เก็บยาให้พ้นมือเด็ก

7. ลักษณะและส่วนประกอบของยานี้

- **ลักษณะยา** เป็นแคปซูลสีฟ้าอ่อน
มีตัวอักษรสีขาวคำว่า BLU-667 และ 100 mg
- **ตัวยาสำคัญ** พรอลเซทีนิบ 100 มิลลิกรัม
- **ส่วนประกอบอื่นๆ**
ไฮดรอกซีโพรพิลเมทิลเซลลูโลส,
ไมโครคริสตัลลินเซลลูโลส, โซเดียมไบคาร์บอเนต,
กรดซิตริก, ปริเจลาตินไนซ์สตาร์ช, แมกนีเซียมสเตียเรต

ผู้ผลิต บริษัท คาดาเลนท์ ซีทีเอส จำกัด สหรัฐอเมริกา

ผู้นำเข้า บริษัท โรช ไทยแลนด์ จำกัด, กรุงเทพมหานคร

ผู้แทนจำหน่าย บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด

เอกสารนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ 11 มีนาคม 2565

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ของ อย.

- <http://www.fda.moph.go.th/sites/oss/Pages/Main.aspx>
- <http://ndi.fda.moph.go.th/>

**เอกสารนี้เป็นข้อมูลโดยย่อ
หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร**