

คาร์โบซิสเตอีน
ความแรง 250 มิลลิกรัม ต่อ 5 มิลลิลิตร
ชนิด น้ำเชื่อมเข้มข้น
CARBOSOL SYRUP
(คาร์โบโซล ไซรัป)

1. ยานี้คืออะไร

1.1 ยานี้มีชื่อว่าอะไร

ยานี้มีชื่อว่า คาร์โบซิสเตอีน (Carbocisteine) มี
ตัวยา 250 มิลลิกรัม ต่อ 5 มิลลิลิตร เป็นยาใน
กลุ่มยาละลายเสมหะ

1.2 ยานี้ใช้เพื่ออะไร

ยานี้ใช้เพื่อละลายเสมหะ มีส่วนช่วยในการ
รักษาโรคระบบทางเดินหายใจที่มีเสมหะมาก
เสมหะเหนียวข้น รวมถึงโรคหลอดลมอุดกั้น
เรื้อรัง

2. ข้อควรระวังก่อนใช้ยา

2.1 ห้ามใช้ยานี้เมื่อไร

- ⊗ เคยแพ้ยานี้ หรือส่วนประกอบของยานี้
- ⊗ ห้ามใช้ในผู้ที่มีแผลในเยื่อบุทางเดินอาหาร

2.2 ข้อควรระวังเมื่อใช้ยานี้

“ระมัดระวังการใช้ยานี้ในหญิงตั้งครรภ์หรือ
ให้นมลูก เพราะไม่มีข้อมูลยืนยันความปลอดภัย”

3. วิธีใช้ยา

3.1 ขนาดและวิธีใช้

ควรใช้ยาตามคำแนะนำของแพทย์หรือ
เภสัชกรเท่านั้น เพราะขนาดและระยะเวลาใน
การใช้ยานี้ขึ้นกับชนิดและความรุนแรงของโรค

- เด็ก 2-5 ปี: 1.25 – 2.5 มล. วันละ 4 ครั้ง

- เด็ก 5-12 ปี: 5 มล. วันละ 3 ครั้ง
- ผู้ใหญ่: 15 มล. วันละ 3 ครั้ง ลดขนาดยา
ลงเป็น 10 มล. วันละ 3 ครั้งเมื่อ
อาการดีขึ้น

3.2 หากลืมกินยาควรทำอย่างไร

กรณีลืมกินยา สามารถกินทันทีที่นึกได้ แต่หาก
ใกล้กับมื้อถัดไป ให้ข้ามมื้อนั้นและกินมื้อถัดไป
ตามปกติ และหากไม่มีอาการแล้ว ให้หยุดกินยา
ได้เลย

**3.3 ถ้ากินยานี้เกินขนาดที่แนะนำ ควรทำ
อย่างไร**

ให้สังเกตอาการอย่างใกล้ชิด หากมีอาการ
ผิดปกติเช่น เลือดออกในทางเดินอาหาร ให้รีบ
นำส่งโรงพยาบาลทันที

4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างใช้ยา

- ใช้โดยการรับประทานและรับประทานตามขนาด
ที่แนะนำ
- หากมีข้อสงสัยควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร
ก่อนใช้ยา

5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา

**5.1 อาการที่ต้องหยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์
ทันที**

- ลมพิษ บวมที่ใบหน้า เปลือกตา ริมฝีปาก
 - หน้ามืด เป็นลม แน่นหน้าอก หายใจลำบาก
 - ผื่นแดง ตุ่มพอง ผิวหนังหลุดลอก มีจ้ำตาม
ผิวหนัง หรือเลือดออกผิดปกติ
- “ให้หยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที”

**5.2 อาการที่ไม่จำเป็นต้องหยุดยา แต่ถ้ามี
อาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์**

- คลื่นไส้, อาเจียน, ท้องเสีย

“ไม่จำเป็นต้องหยุดยา
แต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์”

6. ควรเก็บยานี้อย่างไร

- เก็บไว้ในบรรจุภัณฑ์เดิมตามที่ได้รับมา
- เก็บในภาชนะที่ปิดสนิท ป้องกันแสงและความ
ร้อน อุณหภูมิไม่เกิน 30 องศาเซลเซียส
- เก็บยาให้พ้นมือเด็ก
- หลังเปิดขวด หากใช้ไม่หมดในระยะเวลา 14 วัน
แนะนำให้ทิ้งยาที่เหลือ

7. ลักษณะและส่วนประกอบของยานี้

- ลักษณะยา ยาน้ำเชื่อม สีส้ม
 - **ตัวยาสำคัญ** คาร์โบซิสเตอีน (Carbocisteine)
250 มิลลิกรัม ต่อ 5 มิลลิลิตร
 - **ส่วนประกอบอื่น ๆ** ได้แก่ กลีเซอริน, ซอร์บิทอล,
น้ำตาลซูโครส, แซ็กคารินโซเดียม, เมทิลพาราเบน,
โพรพิลพาราเบน, โซเดียมไฮดรอกไซด์, กลิ่นราสปี้
เบอร์รี่, เมนทอล, ปองโซ 4 อาร์, ทาร์ทราซีน,
แอลกอฮอล์, น้ำ
- ผู้ผลิต บริษัท ห้างขายยาตราเจ็ดดาว จำกัด
เอกสารนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ 13 มี.ค. 2567

- ศึกษาข้อมูลยาเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ของ อย.**
- <http://www.fda.moph.go.th/sites/oss/Pages/Main.aspx>
 - <http://ndi.fda.moph.go.th/>

**เอกสารนี้เป็นข้อมูลโดยย่อ
หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร**